



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

HN 242.

HN 272



UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT



900000000187

Digitized by Google

GUALTERI CHARLETONI
EXERCITATIONES

DE

Differentiis & Nominibus ANIMALIUM.

Quibus accedunt


MANTISSA ANATOMICA,

Et quædam

De variis FOSSILIUM generibus,

Deque differentiis & nominibus COLORUM.

Editio secunda, duplo fere auctior priori, novisque iconibus ornata.



OXONIÆ,

E THEATRO SHELDONIANO, An. Dom. 1677.



P R Æ F A T I O.

A U C T O R

L E C T O R I C A N D I D O

Ευπερίταν, καὶ ἀνδράως ζῆν.

Qui *HISTORIÆ NATURALIS* Sacrarium (quo sane, in amplissimo & πολυορέφῳ *Sophiæ* templo, nil magnificentius, liberalis ingenii scrutinio dignius nil existit; five jucunditatem ejus spectes, five communem in usibus vitæ utilitatem) jam ingressuri sunt; his duo imprimis consideranda, imo & conjunctim perdiscenda, se ipso in limine offerunt; **R E S** scilicet, & **N O M I N A**.

R E S; ut, quemadmodum infinitam pene rerum varietatem *Sensibus* nostris visendam ac contemplandam, in hoc Mundi theatro inferiori, exposuit alma *Natura* benignitas; ita & nos *Homines* vicissim in earum inquisitione *Animos* attente, & cum uniuscujusque interfectione specifica, quoad facultates nostræ tulerint, exerceamus. Idque ne aut ingrati simus erga tantam largitatem; aut fictitias longeque à vero abhorrentes rerum imagines, genuinarum loco, in mentem admittentes; deplorandum illud, nec per totam deinde vitam facile eradicandum *Præjudicii* cacoethes improvide induamus. Quo certe nil magis obstat *Scientiæ*; quæ non ex tralatitiis inque nihilum mox regressuris *Opinionum* præ-

c

con-

P R Æ F A T I O.

conceptarum umbris, aut perfimilibus rerum ipsarum ideis sive notionibus extrahitur.

NOMINA vero, ut & quibus vocibus, tanquam characteribus propriis, Antecessores nostri varia rerum genera ab invicem discriminant, ediscamus; & examinemus simul, quatenus unumquodque ex nominibus istis cum natura & proprietatibus rei, cui assignatum est, conveniat. Quod ut aditus omnes semper præcludit *Confusioni*, ita sapissime etiam faciliori rerum inquisitionum *Cognitioni*, eisdemque animo altius imprimendis haud parum conducit. Quotus enim quisque est, qui vel ingenio sit tam obtuso, ut certi nil quicquam expiscari possit ex æquabili *Nominis* alicujus cum *Nominato* collatione; adeoque infelicitis memoriz, ut quod exinde semel collegerit, sibi ex animo elabi unquam patiatur? O. & *quæque ad rem res nescimus, qui nomina, etiam res intelligit, est Platonis effatum: & nomina si nescis, perit cognitio rerum, Isidori.*

MEDIA autem, quibus cuique utendum est, ne in horum alterutro decipiatur, sed ad exoptatum in utroque certitudinis finem tandem perveniat; pariter sunt duo: *OBSERVATIO* nimirum sive autopsia; & eorum autorum, qui Animalium, Vegetabilium, Fossilium, cæterorumque hujusmodi, quorum est adeo jucunda cognitu varietas, *Historias* maxima cum fide conscripserunt, *LECTIO* assidua.

Quoad *PRIUS*; tantum certe abest ab ea, quam nonnulli, præ incuria, segnitie, sibi sunt imaginati, *Difficultate*; ut insignem potius sibi conjunctam habeat *Voluptatem*. Sapientissimus enim mundi conditor, maiestatem suam ubique exerens, homini (operum suorum quasi syn-

P R Æ F A T I O.

syntagmati & complemento) indidit sicut facultates percipiendi, ita & desiderium quoddam sive aviditatem penitus inspicendi, serioque contemplandi: quicquid varietatis in hac rerum universitate occurreret. Hæc vero aviditas (Græcis φιλοθεαμοσύνη) dum inspicendo ac perscrutando expletur, & *Scientiam* parit, & individuum scientiæ comitem, *Voluptatem*. Hincque fit proculdubio, ut nemo non impense delectetur novis; utque denso agmine convolet populus ad quævis antea non visa Naturæ spectacula: nec quemquam vel ex infima plebe invenias, qui eo, ubi publice spectanda exhiberi solent animalia *Exotica*, vento velocius accurrere nolit. Adeo nos exercet urgetque congenitus iste, nec ulla morum barbarie unquam extinguendus *Curiositatis* igniculus, quo omnes ad rariora Naturæ lustranda perpetuo accendimur. Hæc res ad spectacula populos contrahit, hæc cogit præclusa rimari, secretiora exquirere antiquitates evolovere. Curiosum nobis natura ingenium dedit, & artis sibi ac pulcritudinis suæ conscia, spectatores nos tantis rerum spectaculis genuit, perditura fructum sui, si tam magna, tam clara, tam subtiliter ducta, tam nitida, & non uno genere formosa, solitudini ostenderet, &c.

• •

Seneca, de otio Sapientis.

At vero, tam dispari reguntur fato mortalium fortes ut isthanc visendi curiositatem omnes pari aut observationum felicitate, aut observandorum multitudine satiari nequeant. Etenim Naturæ visum est, varia rerum genera in diversas orbis partes, in totidem veluti classes, disponere; & æthera, terras, maria, singula suis incolis exornare: nec adeo cum operibus suis improvide egit, ut ubique omnia indiscriminatim nascerentur; sed

P R Æ F A T I O.

alia in his , alia in aliis globi hujus terraquei regionibus, prout singulorum genio esset convenientissimum. Hominum vero pars maxima domi confidit iners , nec transgredi unquam audet angustos patriæ fines ;

*Sua quisque piger littora tangens,
Patrioque senex factus in arvo.*

Unde perpauci sunt, quibus ea contigit felicitas, ut perlustratis regionibus exteris , propriis conspexerint oculis quicquid Animalium, Plantarum, Mineralium in unaquaque earum extiterit. Cæterum vix ullam mihi dabis utrovis in orbe partem adeo sterilem atque incultam, quin hujusmodi observationibus possit materiam sat copiosam suppeditare. Messis quidem ubique locorum perampla est ; sed desiderantur passim Messores , qui non patiantur etiam in patria sua ignorari, quæ, ut omnium oculis versarentur , ibi fata fuere ; quorumque apud externos ignoratio in causa sit, ut *Historia Naturalis* diutius adhuc manca permaneat & jejuna. Veri ac assidui Naturæ investigatores desunt ut plurimum : hinc ergo ea se tam angustam continet , tam ægram exhibet , tam novercam simulat. Accedit, quod ad quæ noscenda iter ingredi , transmittere maria solemus , ea sub oculis posita negligimus : seu quia ita natura comparatum est, ut proximorum incuriosi, longinqua sectemur ; seu quod omnium rerum cupido languescit, cum facilis occasio est, seu quod differimus tanquam sæpe visuri , quod datur videre, quoties velis cernere. Multi scilicet aperta transeunt, condita & abstrusa rimantur : & cum solita & familiaria nobis perpendenda veniunt, magnitudinem eorum atque admirationem consuetudo imminuit ; ubi
vero

P R Æ F A T I O.

vero res minoris momenti, sed infuetæ magis offeruntur, mirabiliores multo eæ statim præ novitate videntur. Ad-
eo verum est illud *Senecæ*, *haud raro quæ maxime patent, minime discernuntur*. Magnopere tamen expedit, ne cui-
vis indigenæ etiam neglectui habeantur. Siquidem in
rerum Naturalium speculatione, haud minus quam in de-
cisione Forensium, testibus opus est *oculatis*: & qui ex
Libris solum ac peregrinantium *Relationibus* res dignosce-
re satagunt, similes censeantur Præconibus, qui formam
quidem & notas fugitivi mancipii, licet ipsi viderint
nunquam, Stentoria voce publicare solent; at, si forte
quem præconio aliis indicant, prope assisterent, agnoscere
eum non valerent; ut olim facete adnotatum à *Galeno*.
Qui enim Autorum verba legentes, rerum ipsarum ima-
gines (æorum verbis comprehensas) sensibus propriis
non abstrahunt, sed falsa idola & phantasmata inania
mente concipiunt; hi umbras quasdam & Chimæras sibi
fingunt, totaque eorum theoria siue cōtemplatio (quam
tamen scientiam arbitrantur) vigilantium insomnia, aut
ægotantis animi deliria repræsentat; ut *Harvæus* acu-
tissime, in *Præfat. ad lib. de Generat. Animal.*

Quoad *POSTERIUS*, *Lectionem* scilicet assiduam;
nec opus est profecto, nec Præfatunculæ finit angustia,
ut hic expendendo immoremur, quantum & delectatio-
nis, & emolumenti exinde colligi possit: maxime quum
id ex se satis jam innōtuerit vel leviter in hoc genere ar-
gumenti versatis. Et loci hujus magis interest, ut paucis
atingamus, quid *Difficultatis* in ea occurrere soleat *Ju-
ventuti* Historiæ Naturalis studiosæ.

Extant quidem (fateor, nec sine grata mēoria re-
cōrdor) haud pauca super eo, in quo nunc versamur,
d subjecto

P R Æ F A T I O.

subjecto Volumina ; eaque à viris summo cum eruditione, tum industria, fideque conspicuis, partim ex suis, partim aliorum observationibus, condita. In his tamen (quod serio dolendum) tanta *Lectores* premit ac remoratur sententiarum discordia, non solum circa descriptiones, sed de ipsis quoque *Nominibus* quorundam *Animalium & Fossilium* (ut Vegetabilia, quibus nullum in hoc Libro locum consignavimus, silentio prætereamus) ut eas sibi invicem conciliare, plane videatur impossibile ; summe vero arduum, decernere, cuñam ex Animalibus aut Fossilibus in specie descriptiones istæ ac nomina rectius possint debeantque accommodari. Eorum enim, quæ ab *Aristotele, Theophrasto, Dioscoride, Eliano*, cæterisque *Græcis* descripta sunt, haud exigua pars vel nobis hodie prorsus ignota videtur ; vel tanta dissimilitudine à *Modernis* depicta, ut legendo solum ne hæriolari quidem liceat, cujus *Ætyma* Prototypis magis similia censeantur, cujusve auctoritati tutius sit acquiescendum.

Plinius etiam ipse (quem tamen inter *Latinos* par est hac in re omnium instar agnoscamus) quæ ex *Græcorum* scriptis hauserat, tanta vocum de novo effictarum licentia, pro arbitratu suo, plerumque mutavit, ut haud raro non eadem cum Exemplaribus, quæ ad amissim sequi debuit ; alia, longeque ab istis diversa indigitaſſe eum credas. Deinde, si quis *Lexicographus, Veterumve Interpretes* (sic enim audire amant) super ejusmodi dubiis, ex appellationum sive multitudine, sive incertitudine oriundis, consultum iverit ; spe sua identidem frustrabitur. Hi quippe nullibi magis cæcutiunt, quam in propriis *Animalium* nominibus ex mente Veterum reddendis. Unde uſus venit, ut in *Lexicis & Dictionariis* vulgaribus,

P R Æ F A T I O.

garibus, voculæ unius, quam ad proprie designandum genus quoddam Animantium prudenter excogitavit, posterisque servandam reliquit Antiquitas, alicubi reperias decem interpretamenta: & si variis textus alicujus græci *Versiones* inter se contuleris, & istas quoque videbis haud minori discordia laborare. Qua tamen in re istiusmodi autores eo minus culpandi videntur, quod multiplex *Linguarum* varietas perpetuas hujusmodi studiis tenebras offuderit; quodque aliis atque aliis nominibus, non solum diverſi terrarum mariumque tractus, sed & *Provinciae* etiam finitimæ eadem animalia appellarent.

His equidem modis haud leviter irretitum anxioque remoratum inter legendum cum meipsum olim sensissem, & πάλιν τὰς λέξεις ἀνὰ καὶ κατὰ μέλητος καὶ ἰσχυροῦς (ut verbis utar *Platonis*) diu mecum considerassem, qui ab istis dem facilius tandem liberari possem: veniebat forte in mentem, commodissimum fore, si à *Zoographis* traditas Animalium descriptiones cum vivis Naturæ exemplaribus, quotquot saltem mihi oculis propriis inspicere & contemplari daretur, accurate conferendo examinarem. Sperabam nempe, hoc pacto me & singulorum notas genuinas ab adulteratis distinguere, & haud parca ad proprias sibi Familias reducere posse. Ex eo igitur tempore, hac vera vereque regia inquirendi via multos annos insistens, nil intentatum reliqui, quo tam laudabili instituto, quatenus liceret, satisfacerem. Eustratis scilicet quibuscunque Animalium, perfectiorum saltem, generibus, quæ *Britanniam* nostram, quæ *Galliam*, quæ *Germaniam* superiorem, inferioremve, aut perenni ter incolunt, aut ingruente hyeme quotannis invisere ac frequentare

P R Æ F A T I O.

solent ; quæ item *Novus Orbis* Emporiis nostris, quandoque raritatis causa, immittere gaudet : pleraque eorum & cum descriptionibus, quas in *Gesnero, Wottono, Rondeletio, Mouffeto, Salviano, Bellonio, Aldrovando, Johnsono*, cæterisque id gen us autoribus legissem, qua potui fide ac diligentia, contuli ; & propriis insignita nominibus in *Tabulas* conjeci, juxta methodum ab *Aldrovando* observatam.

Quo in opere haud exiguo mihi adjumento fuit, tum Augustissimi Potentissimiq; CAROLI II. nostri, Regis instructissimum Ζωοπορεῖον five Vivarium, tum inclytissimæ SOCIETATIS REGIÆ, ab eodem ad Naturalem Scientiam promovendam fundatæ, Musæum. Hic enim tantus ostenditur rerum naturalium cumulus, ut vix dies sufficere possit ad immensam earum varietatem vel perfunctorie visendum ; ad singulatim dignoscendum, vix annus. Illic vero, ad pascendos curiosorum oculos, aluntur quamplurima Ferarum Volucrumq; rariorum genera, à remotissimis etiam Orbis Terrarum regionibus eo allata. Quæ si Tute ibi semel aspiceres, Arcam *Noemicam* secundo jam ingressuris Animantium omnium paribus interesse Te, haud immerito crederes. Auxilii insuper nonnihil mihi ipse comparabam ex *Aucupio* ; cui à prima usque pueritia acriter addictus (ὁ μάλιστα Θεῶ ἱππᾶ, ut *Hippocrati Democritus* ; sed dissectionum amans) quoties *Avem* aliquam, vel antea mihi non satis perspectam, vel oris *Britannicis* novam, forte videre contigit ; eam mox insequi, & in aere volantem Sclopeto conficere solitus sum ; tum ita confectam modo dictis *Tabulis* inferere, habita prius cum *Aldrovando & Johnsono*, circa nomen ejus & naturam, consultatione.

Non

P R Æ F A T I O.

*Non vidisse quidem satis est, juvat usque morari,
Et conferre manus, partesque agnoscere & usus.*

In *Piscium* denique inquisitione, auxiliares mihi manus subinde commodare dignati sunt; Ornatissimi Collegæ mei, D. D. *Ent*, Eques Auratus (qui æternis ingenii sui monumentis, quæ jam lucem aspiciunt, quantum solida doctrina erudit, tantum per amœno scribendi genere & styli elegantia Lectorum animos allicit imbuirque;) & D. D. *Merret*, Vir omnigena eruditione clarus, qui quæ in dignoscendis *Piscium* differentiis singulatam accuratè consecutus est. Et his equidem adjutus subsidiis, pro virili mea, in hoc pulvere desudavi.

Jam vero, cum Adversariorum meorum rudera in *Ορογραφία Ζωική* (molis profecto, ut vides, exigua, nec Libri nomine dignum) redegissem, quidquid nostratium quibusdam, in Eruditorum comitiis non capite tantum censis, commonstrassem, ut quæ minus placèrent, obelo suo libere transfoderent: Hi mox, nugis meis nimium indulgentes, quæ hortatu, quæ precibus, me urgebant, ut quod in privatum memoriæ meæ subsidium, calambæque volante conscripseram, *Tyronum* gratia, publicæ lucæ donarem. Gravati ego primo, atque inter alia Tabulas has, omittis plerorumque Animalium tum descriptionibus tum Iconibus, mancas obscurasque fote causabar. Quid plura? Impetrant tandem, ipseque consilio eorum imperioque obsequens Schedulas has, de *Animalium Differentiis & Nominibus*, postliminio revisas, omnium Naturæ cupidorum oculis exponere constitui. Crimen nempe levius esse duxi, honoris mei vel gloriolæ, si qua ingenuis studiis parta est, jacturam plane facere, quam

c

P R Æ F A T I O.

quam incivili pertinacia obluſtari honeſtiſſimo Amicorum deſiderio.

Cæterum huic Tractatui & jam *Alium* ſubjunxi, de variis FOSSILUM Generibus, quem ex Analectis ſelectionibus, aliquot ante annos, in meum ſolummodo uſum, conſimili methodo, compoſueram. Hocque eod quidem nomine feci potiffimum, ut haud paucos *Dictionariorum* noſtrorum *Errones*, circa Mineralium nomina *Vernacula* oſtenderem, poſitiſque reſtoribus è medio tollerem.

His dictis de ſcriptionis hujus occasione, aliud nil afferam inſitam præcoels Edicidnia excuſationem, præter *Ciceronianum* illud *intemperantis eſſe arbitror ſcribere, quod obſcure velis*. Hoc unicum addam tamen, ne Tu, *Leſtor* candide, conſilii mei ignarus ſis; *Onomaſticon* hoc à me & ſcriptum fuiſſe, & in dias luminis oras (ut cum *Læſtione* loquar) emiſſum, non ut novi multum adderem, ſed ut ea, quæ in re diſperſa, atque infinita prope viderantur, ratione & diſtributione ſub uno adſpectu ponerentur, idque in juventutis, præſortim *Britannicæ*, gratiam à me factum eſt.

Proinde quum hoc vel illud legis (*Plinii ſecundi* notam recito) ſuccincte nimis traditum, ita ſingulis veniam, ut non ſingulis dabis. An cæteris artibus excuſatio in numero; litteris clarior lex, in quibus difficiliſſior effectus eſt? Quid autem ego de venia, quaſi ingratus? nam ſi ea facilitate hæc proxima acceperis, quæ priora, laus potius ſperanda, quam venia obſecranda eſt; mihi tamen venia ſufficit. Tantum abeſt, ut ſcribi contra nos nolimus, ut id etiam maxime optemus; in ipſa enim *Græcia* *Philofophia* tanto in honore nunquam fuiſſet

P R Æ F A T I O.

fuiſſet, niſi doctiſſimorum contentionibus diſſenſionibusque vighiſſet. *Cicero Tuſculan. 2.* Quin libentius illud dico; adnota quæ putaveris corrigenda. Ita enim magis credam cætera tibi placere; ſi quædam diſplicuiſſe cognovero. Interim bene vale, *Leſtor benevole*, & dicti illius, *μηδὲν ἀμείψων, ἵνα Θεῶν, καὶ πάντων κατὰ φύσιν*, memor eſto.

*Ex Muſæo noſtro, Idibus Junii,
Anno reparate Salutis humane,
M DC LXVII.*

Οὐ πάντες ἐπὶ ὄνομα δίδωσι, ἀλλ' ὀνομαστέον.

Non est cuiusvis nomina imponere, sed nominum Artificis.
Plato in Cratyl.

Animalium Nomina sunt egregium Antiquitatis Monumentum.
Bechertus in Præfat. Hierozoici.

ANIMALIUM QUADRUPEDEM.

Differentiæ & Nomina.

ANIMAL (Græce Ζῷον, & ubi plantæ, cui etiam inesse *vitam* agnoscunt omnes, opponitur, Εμψυχον, *Animatum* : & Hebraice *Chaja*, ratione vitæ) est (1) λογικόν, *Rationale*, (2) ἄλογον, *Irrationale*.

RATIONALE nullum est præter *Hominem*, cui Deus in creatione imaginem suam indidit, & inspiravit halitum vitæ duplicis, *mortalis* & *immortalis*. Hebræis *Animal loquens*, quia ratio est sermo mentis; sapientissimis *Ægyptiorum* Sacerdotibus, *Animal* admirandum & adorandum; *Mercurio* illi *Trismegisto*, *Animal* Deo simillimum, & Deorum interpres; *Pythagoræ*, Μέντορος ἀπαύλων; *Platoni*, Ζαῶντος Ζαυμότητων; *Theophrasto*, Ἀντίμμου ὡδιδωγμῆς; *Aristoteli*, *Animal Politicum*; *Ciceroni*, divinum *Animal*, plenum rationis & consilii; *Plinio*, *Mundi epitome*, & *Naturæ delicia*; omnibus, Μικροκοσμός. Nam in eo *Natura* vim & maiestatem suam omnem velut in contracto compendio exseruit, siue partes ejus totum animo complectamur. Unde *Regius* ille *Propheta* celesti Numine plenus, hominis dignitatem extollens, *Ministi cum inquit, paulo minus ab Angelis, gloria & benedictione coronasti cum, & constitisti cum super opera manuum tuarum*. Anglicè *Dan* dicitur, forte ab Anglo-saxonico *Menan*, sentire, opinari, cogitare : cui felicissime alludit Græc. μῆν, *animus*, à quo & Latin. *mens* deflexum videtur. *Meric. Casaub.* *Dan* pro *serve* declinat à μέν.

IRRATIONALE, siue *Brutum*, Hebræi dividunt in quatuor summa Genera; nempe (1) *Animal Quadrupes*, (2) *Avem*, (3) *Reptile*, & (4) *Pisces*: ex sacro illo textu, *Timor vestri sit super omnes quadrupedes terræ, & super omnes volacres cæli, & super omnia quæ repant in terram, & super omnes maris pisces*.

Philosophi vero communiter dividunt *Animantia Bruta* in *Terrestria*, *Aquatilia*, *Aeria*.

TERRESTRIA subdividuntur in $\left\{ \begin{array}{l} \text{Quadrupeda.} \\ \text{Multipeda.} \\ \text{Apeda.} \end{array} \right.$

QUADRUPEDA rursus in

1. Μονόπυχα, *Solidipeda*, seu *solipeda*, quasi una tantum ungula prædita: Anglicè *whole hoofed beasts*.

A

2. Διπύχα

2. Δίχνηλα, *Bisulca*, quorum pedes binis fissuris utrinque, hoc est, à parte anteriori & posteriori, diducuntur: **Cloben-footed.**
3. Πολυδάκτυλα, *Multifida*, & multipliciter *digitata*; quod pedes, manuum nostrarum instar, multifidos habeant: **Claw-footed.**

II. Dividuntur omnia ratione diversorum modorum *Generationis*, in *Vivipara* & *Ovipara*; quod nempe in *Viviparis*, uterus sive locus in quo foetus formatur, sit intra animal ipsum, cujus calore fovetur & perficitur: in *Oviparis* vero, uterus, i. e. ovum, extra animal exponitur; quod tamen illud non minus incubando fovet, quam si adhuc intra corpus suum amplecteretur.

Rationi consentaneum videtur, omnium animalium perfectiorum Generationem fieri per viam *ecstatica impressionis* ideæ, in ipso actu coitus maris & fœminæ. Quod in *Oviparis*, demonstratur ex ovis subventaneis; in *viviparis*, ex eo quod fœminæ nunquam pariant absque fœcunditate maris. Et, ut immortalis nostro *Glissonio* videtur, in *Oviparis* Spiritus ovi regens ecstatico quodam modo idea pulli formandi imprægnatur; & ab eo ipso totum ovum fœcundatur: in *Viviparis* vero, Spiritus quidam, in ecstasi coitus, idea prolis concipiendæ afflatus, in ea parte uteri cui postea adnascitur placenta excitatur; ibidemque suo tempore pronascitur vesicula quædam aquosa materia repleta, quæ indies aucta, apparet tandem instar ovi, in quo foetus formatur. Ratio cur credamus, in *Oviparis*, excitari ideam formatricem primo in Spiritu regente ovi; at paulo aliter in *Viviparis*, ipsum uterum primo Spiritu ideam formandi afflato imprægnari, est quod ovum, ex historiis *Harvaei*, jam formatum, sed nondum exclusum, admissio gallo fœcundum fiat: at in *Viviparis* tempus conceptus, ut & tempus gestationis, à coitu computetur. Ad hæc, *Harvæus* ipse in damis & cervis post coitum nihil in uteri cavitate comparere asserit; sed in utero ipso manifestas alterationes ab initio deprehendit. Constat itaque ex dictis, hunc modum Generandi manifeste procedere per excitationem ideæ prolis, quam seminalis materia recipiens approbat eligitque, & conformiter foetum format. De hoc mysterio solertissime omnium conscripsisse videtur modo laudatus *Glissonius*, lib. de *ventriculo & Intestinis* cap. 20. quo lectorem remittimus.

Cæterum ne ipsum vocum istarum, *materia* nimirum *seminalis*, *virtutis plastica*, & *ecstatica impressionis* ideæ, obscuritate impeditum ac hærentem dimittamus; æquum est, quid per unamquamque earum velimus, strictim hic interpretemur. Per *materiam* igitur *seminalis* intelligimus, proprium subjectum alicujus virtutis seminalis, quæ aliquam naturam seu effectum seminalem producit. *Virtutis plastica* nomine indicatur, vis illa formatrix, quæ resultat à natura

feminali, quatenus ea idea futuri partus imprægnatur, cujusque virtus duplex est, *Similaris* nempe, quæ materias feminales ad organa construenda requisitas præparat; *Organica*, quæ ipsa organa totius & singularum partium juxta ideam in se conceptam fabricat. Per *impressionem* denique *ecstaticam* intelligimus, ideam ipsam formandi foetus, appetitu primum naturali, dein etiam animali in genitalibus, concurrente phantasia, conceptam, & Spiritui materiam seminalem regenti, in ardore coitus (quo potissimum tempore Phantasia per uteri desiderium ac inquietos motus, ad concursum suum in opere generationis præstando præbendum impense sollicitata, & à sensuum omnium ministerio pro tempore abstracta, *ecstasin* patitur) impressam, & cujus ad exemplar foetus demum ab eodem spiritu formandus est.

III. Ratione *Respirationis*, dividuntur in ea (1) quæ branchias habent numerosas, ac per totum corpus dispersas, ut pleraque *insecta*: (2) quæ branchias habent prope collum utrinque dispositas; ut *pisces* fere omnes, Cetaceis tantum exceptis: (3) quæ pulmonibus dotantur, ut *perfectiora* omnia. De his vero sigillatim in sequentibus.

SOLIDIPEDUM Classis.

INter SOLIPEDA censentur

I. EQUUS (vel quasi *Equus*, quia Equi, quando quadrigis jungebantur, æquabantur, paresque forma & similes cursu, copulabantur; ut *Isodoro* placuit: vel ab ὄχος, *veho*; ita dicatur, quasi *ocbus* *velecbus*, ut *Martinio* & *Vossio*) a *Horse*.

Quæ est vel

Admissarius, a <i>Stallion</i>	}	<i>Horse.</i>
Cursorius, a <i>Running</i>		
Veredarius, a <i>Post</i>		
Desultorius, a <i>Light</i>		
Plaustrarius, a <i>Cart</i>		
Vectarius, a <i>Waggon</i>		
Molarius, a <i>Mill</i>		
Succussarius, a <i>Trotting</i>		
Tollutarius, a <i>Ambling</i>		
Cataphractus, a <i>Barb'd</i>		
Sellarius, a <i>Saddle</i>		
Mannus, a <i>little</i> <i>Hagg</i> .		
Caballus, a <i>Walfrey</i> , or <i>bad</i> <i>Hag</i> .		

A 2

Hinnus

Hinnus } a Ginnet.
 Ginnus }
 Canterius, a Gelding.

Partes ejus nonnullæ vocabulis propriis insigniuntur : ut

Ungula (ὄπλαι) Hoofs.

Chelidan, seu Hirundo, ungularum concavitas, nidum Hirundinis specie referens, the Hollow of the Hoof.

Rana (βάρραχος) the frog of the Hoof.

Corona (αφάρη; Hippocrati ῥόρυς, ἀρμωμία) commissura ungulæ cum pede; the Circle at the top of the Hoof.

Suffrago (καμί) the Hough or Pastern.

Girri, subcirri, fetlocks.

Cauda, caules, the Dock.

Muscerium, Setæ, Longiones, quibus muscas abigunt equi; the Tail.

Juba (χατρί) the Man.

Caprona (μεγρόμιον) the Fore-lock.

Crista; the Crest.

II. ASINUS (quasi ἄσινος, qua voce Homerus & Æschylus usi pro innocuo; ut ingeniose Helias in erudita & festiva laude Asini) ὄνος, an Ass. Cujus species sunt,

Onager (ὄναγρος) the wild Ass.

Asinus Monoceros Indicus, the unicorn Ass of India. De quo Plin. lib. 11. Cap. 37.

Asinus domesticus, the tame Ass.

III. MULUS (ἀμύλας, hoc est, labor; quia est animal viribus in labore eximium: & ἡμίονος, semiasinus) a Mule aut Mopl. qui vocatur

Hinnus, si ex equa & asino nascatur:

Mulus vero, si ex equo & asina.

Hoc ζῷον ἡμιζῷον, ex diversis semine natum, sterile esse tradunt omnes antiqui, Varrone excepto, qui affirmare ausus est, Mularum foetus regionibus Africae adeo non prodigiosos haberi, ut tam familiares sint incolis parturientum, quam sint nobis Equarum.

IV. ZEBRA Indica, Mulo per omnia similis, nisi quod fecunda sit, & fimbriatis lineatisque pilis miro aspectu videatur. Descriptionem ejus videas apud Pegasotam in hist. regn. Congo.

V. ELEPHAS (vel ab Hebræo Alaph, discere; quod docilitate reliqua animalia superet: vel ab Eleph. Bos, quia magnum est animal, & βῆ augendi vocabulum,) an Elephant.

Partes

Partes ejus notabiles sunt { Proboscis, ~~Trunk~~.
Cutis cancellata, ~~wrinkled skin~~.
Dentes, Ebur, ~~Ivory~~.

De admirando hujus ingenio, ingeniosis: *Lipsius* singularem scripsit Epistolam.

BISULCORUM non RUMINANTIVM Classis.

BISULCA sunt vel non *Ruminantia*, vel *Ruminantia*. Prioris generis censentur

I. MONOCEROS, Unicornu, ~~the Unicorn~~. An in rerum natura sit, vel fuerit, merito dubitatur

II. ASINUS CORNUTUS bifidus, ~~the horned and cloven-footed Ass~~; quem reperiri scribunt in India, Scythia, & Africa.

RUMINANTIVM Classis.

RUMINANTIA dicuntur, quæ pabulum semel deglutitum mox ad os regurgitant, seu potius regeſtum revolvunt, iterumque dentibus comminunt. Unde ruminationis actum, *Apuleius* rumigare, *Quintilianus* & *Plinius* remandere, Græci ~~μῆναι, μῆναι, ὡς τὸ μῆναι~~, quod est *revolvere*, dixerunt.

Hujusmodi animalibus natura (quæ miras formationum varietates tentare solet) tres omnino proprietates videtur indulſiſſe. Prima est, quod dum in utero gerunt, succus alimentaris ab utero ad foetum transferendus, priusquam carunculas Chorio accrescentes ingrediatur, in glandulosa corpora extuberat; quæ loculamentis quibusdam, quasi favorum alveolis, ubique perforata, furculos & digitulos à placentulis Chorii exporrectos recipiunt, iisque se mulgeri sinunt: observatore *Cl. D. Needhamo, Disquisit. Anatomic. de format. Fœtu, cap. 2.* ubi satis probabilem hujus Phænomeni affert rationem: nempe quod ruminantium lac multo densius crassiusque sit quam placentiferorum: id quod evidentissimum est in vacca, ove, & capra; si lac eorum uberibus recens emulctum, cum illo mulieris, asinæ, vel equæ conferatur. Sed & liquor quoque in Amnio ruminantium contentus densior est; & in vacca posterioribus mensibus adeo incrassatur, ut gelatinæ instar concretus vi-

B

deatur

deatur. Liquor vero adeo pinguis, tamque ad vias sibi præcludendas aptus, haud facile per uteri membranas transmitti posset, nisi familiarem, suæque naturæ accommodatam obtineret substantiam, cui jungeretur, & per cujus poros sive meatus (eum in finem patentes factos) transiret.

Secunda proprietas in hoc consistit, quod dentibus in superiore maxilla destituantur: iis tamen non tam deficere dentes videntur, quam transponi. Plures enim incisores habent in inferiore mandibula, quam utrinque dentatis conceduntur. Unde sagacissimus naturæ interpres, *Glissonius* noster (*de ventriculo & intestinis cap. 2. num. 10.*) existimat, abesse tantum dentes, non deficere: iisque incisores in superiore maxilla non fuisse ex usu. Scopus enim naturæ videtur, ut hæc animalia quasi manipulatum cibum carperent. Incisores ergo inferioris maxillæ loco falcis sunt, & callosæ gingivæ superioris cum lingua loco manus apprehendentis. Quare satis instructa sunt, cum cibum primo integrum deglutiant. Recte itaque natura iis

Tertiam dicavit proprietatem, quatuor nempe ventriculos: *Primum*, seu potius (*Glissonio* iudice) *secundum*, ventrem, rumen, *μυαλάω χειλίας*, *the Cud* (forsan quasi *chewed*, quia cibus ruminando quasi bis masticatur: nec dubitat *Skinnerus* quin Anglo-Saxonicum *Cud* ortum sit à verbo *Cropan*, mandere) quasi lebetem, in quo cibus collectus maceretur & quasi elixetur, priusquam in ore manducetur: *Secundum*, reticulum, *καρύφαλον*, *the paunch* (forte à Franco-Gallico *Pance*, *Panse*, quod deflexum videtur à Lat. *Pantex*, venter) qui duplici officio defungitur, & quatenus transmittit cibum in *μυαλάω χειλίας*, dicitur *primus*; quatenus vero eundem commansum transfert in tertium, dicitur *secundum*: *Tertium*, *Omasum*, *ἰχθύν* (ob rugas & asperitatem echino similem) *the Tripe*, (à Fr. Gall. *Tripe*, intestinum, quod *Covarruvius* deflectit à Gr. *τέτρω*, à convolutionibus scil. intestinorum) qui cibum jam maceratum probeque commansum è reticulo excipit: *Quartum*, *Abomasum*, *ἄνυσρον* *the Hony tripe* (quasi gustui gratissimum) qui cibum inteneratum tantum, & in chylum fere percoctum excipit, exceptumque perficit. Plura de horum ventriculorum structura, actionibus, usibusque sive officiis, &c. sciendi avidum lectorem dirigo ad accuratissimum *Glissonii lib. de ventriculo & Intestinis* modo laudatum. Unde pauca neminem apud alium inveniendâ, proindeque recensione dignissima, huc transcribere visum est; ut ruminandi modus, ab excellentissimo isto Anatomico primum detectus, clareque descriptus, etiam in re Anatomica peregrinis innotescat.

“Modus quo tota *Ruminationis* actio perficitur, sic se habet. Collecta

"lecta bona cibi portione, & aliquandiu in *μεγάλης χοιλίας* penū co-
 "acervata, latatur animalis phantasia, & de fruitione bonorum
 "partorum cogitare incipit. Hinc paulo fortius solito tensis mu-
 "sculis abdominis & una diaphragmate, magno ventri dat ansam
 "se quoque conformiter comprimendi: adeoque motus peristal-
 "ticus ab infra sursum excitatur, qui ascendens in Reticulum,
 "& inde in Gulam, cibum in os refundit. Eo enim quod orifi-
 "cium ē magno ventre in Reticulum continuo sit apertum, por-
 "tio cibi in eodem contenti virtute ejus arctioris amplexus in Re-
 "ticulum expuitur, & continuato motu peristaltico sursum ē Re-
 "ticulo in Gulam, & ē Gula in os, ut dictum, refunditur. Suffi-
 "ciente autem quantitate cibi pro vice hoc modo in os regesta,
 "phantasia imperat remissionem istius motus diaphragmati & mu-
 "sculorum Abdominis: unde minus comprimitur magnus venter;
 "& conformiter ejus peristalticus sursum, donec nova compres-
 "sione facta idem denuo concitetur, una cessat. Jam vero hunc
 "motum in *μεγάλη χοιλία* primo excitari ad nutum phantasiæ, ex
 "eo innotescit, quod animalia, quamdiu duris laboribus aut curis
 "distingantur, à ruminatione abstineant, simul ac vero placidam
 "quietem & spem securitatis nansciscantur, ad ruminandum se
 "denuo convertant. Imo testantur agricolæ boves sub jugum mis-
 "sos, si tantillum à laboribus cessa verint, ruminationi se compone-
 "re, simul ac vero à jugario acius increpantur aut stimulantur,
 "statim à ruminatione desistere. Unde clare constat, ascensum
 "cibi in ruminatione non esse motum pure naturalem, sed *mixtum*,
 "ansamque arripere ordiendi à phantasia libere contrahente dia-
 "phragma musculosque Abdominis, adeoque excitante peristalti-
 "cum *ἀνω* in *μεγάλη χοιλία*. Hoc confirmatur, quod hic motus
 "sursum nunquam immoderatus cernatur, quodque pro arbitrio
 "animalis constanter regatur. Neque enim venter eructat plus una
 "vice in os, quam quod animal commodè sua lingua in ore versa-
 "re, ac dentibus remandere queat; neque novam materiam e-
 "ructat, antequam prior commansa sit & deglutita. Certum ita-
 "que est hunc motum, quanquam respectu *magni ventris* sit na-
 "turalis, respectu tamen *phantasiæ* eundem excitantis, & ex parte re-
 "gentis, quodammodo revocari ad *animalem*. Addo neque minus
 "certum esse, eundem cibi motum in Gula *Organicum* esse, & ni-
 "hil aliud nisi inversam quandam deglutitionem oriundam ab e-
 "jus motu peristaltico ab infra sursum concitatam.

Ruminantia dividuntur in {Cornigera;
 {Non Cornigera.

E CORNIGERIS sunt.

I. **B O S** *domesticus*, qui pro varia ætate ac sexu, diversa nomina fortitur, viz.

Bos, an **Ox** (ab Anglo-Saxonico **Oxa**; quod *Skinnerus* deducit à Lat. *occare*, quia scilicet hoc animal ad labores & patientiam natum, tum pedibus, tum aratro quod trahit, terram frangit & proscindit) quo nobis *Bos* castratus tantum intelligitur.

Taurus, *bos* non castratus, a **Bull** (à Belgic. **Boll**; idque forsitan à *boatu* proprio & naturali ejus sono, qui *mugitus* dicitur, **bellowing**.

Vacca, a **Cow**, quod si Græculus essem, derivarem à *Kúw*, *concipio*; sc. ab animalis fœcunditate.

Juvenca, a **Haifer**; vel, ut *Minsbeo* placuit, ab **Hay**, & **fare**, scil. quæ tæno velci incipit: vel, quod *Skinnero* rectius videtur, ab Anglo-Sax. *Heah*, altus, & *Fope*, gressus; utpote quæ altum graditur, i. e. superbe incedit, toto jam corpore & cornibus adulta.

Junix, à **Stier** aut **Steer**, ab A. S. *Stýpe*, *Steoþ*, *Juvenus*: *Merio. Casaub.* deflectit à Gr. *Σνίγα*, βῆς *Σνίγα*, vacca sterilis, quæ taurum admittit quidem, nec tamen inde concipit.

Vitulus, a **Calf**, proculdubio ab A. S. *Calþ*, foetus.

II. **B O S** *Silvestris*, cujus plures dantur species,

Urus { *Jubatus*, the **Owze**.
Lybicus, sive *Catoblepa*.

Bison { *Magnus*,
Jubatus.

Bonafus, the **Bugle**.

Bubalus Africanus.

Oryx, animal ferum *Bubalo* paulo minus, *Afris Duncæ* dictum.

Buffelus, the **Buffle**.

Bos strepsiceros, the wild **Ox** with wreathed horns.¹

Bos Scythicus gibbosus, the little **Scythian Ox** with a **bunch-back**; qualis ante pauculos annos vilebatur in Augustiss. Regis nostri vivario, **St. James's Park** dicto.

III. **OVIS** (ab *ovis*; ita enim antiquiores Græci dicebant, non, ut nunc, *περίλαβον*) a **Sheep**, ab A. S. **Scrap**, quod idem designat, cuique alludit Gr. *Σνίγω*, *tego*; quia scilicet multa lana tegitur, & lana sua etiam nos tegit. Ovium vero diversa apud Latinos nomina sunt: pro varietate ætatis & sexus, viz.

Aries

Aries, a **Ram** aut **Cupp**.

Ovis, an **Em**, à Lat. *Ovis*, Gr. ὄvis, interjecto Digamma Æolico.

Vervex, a **weather**, ab A. S. apud Ælfricum Wæcep, aries castratus.

Agnus a **Lamb**, (ab A. S. Belg. & Teut. **Lamb**: cui parum alludit Gr. ἄμμος) subrumis, **sucking**; abrumis, **weaned**.

Bidens, a **young sheep with two teeth**.

Adasia, an old **Em** that hath newly year'd.

Mina, **sheep wanting wool on their bellies**.

Apica, **sheep of little bodies and less wool**.

Lanata, **sheep rich in wool**.

Species Ovium magis notabiles sunt.

Anglica {
Hispanica } ob lanæ molliem.

Æthiopica, quæ lanam non habet.

Turcica, cauda tam ampla, ut eam sine vehiculo vix sustineat.

Lybica, quæ aselli magnitudinem æquat.

Chilensis, non lanata, sed prolixis admodum villis vestita, & quæ sputum ejaculatur in vexantes. Hujus descriptionem ac iconem videre est apud Georg. Marcgravium in appendice ad *Histor. rer. natur. Brasiliæ*.

Pernana, quæ quinquaginta oneris pondo sustinere valet, & ad aliquot passuum millia vehit. Describitur accurate à Benzoni *hist. novi orbis*.

Quoad earum *Faturam*, hic opportune notandum occurrit, quod apud Cl. D. Needham, in *lib. de formato fœtu cap. 2. de 7.* observatum invenies; scilicet *Cotyledonifera* animalia dari nulla præter ovem & capram, quibus glandulæ uterinæ, præter loculamenta in Ruminantibus aliis quoque conspicua, Cotylam etiam obtinent majusculam, quæ totam ipsarum superficiem excavat, instar cupulæ glandis. Quo uterum gerentibus hujusmodi animalibus peculiari artificio natura prospexisse videtur commodiori succi alibilis per uteri angustias ad nutriendum fœtum transmissioni; quemadmodum paulo ante de Ruminantium lacte uterino dictum est.

IV. **CAPRA**, (à carpendis virgultis, ut Varro, Cicero, & Nonnius) **Æg**, a **Goat**, ab A. S. Gæte, Gæt, Ælfrico Gæt, Hircus, Cujus species sunt

1. *Hircus domesticus*, Τεγῆς (forte à Τεγῆν, & Τραγῆν, edere; quod vorax sit) **the tame Goat**.
2. *Rupicapra*, αἰξ ἄγρος, & ἀγρῶνος Oppiano *Cyneget. lib. 2. vers.*

343. Tridentinis & circumvicinis populis *Camozza*; Hispanis *Chamois* & *Gemps*; **the Rock-Goat**. Hujus in animalis ventriculo secundo reperiuntur sæpenumero globuli quidam adeo Cardiaci & Alexicaci, ut lapides Bezoardicos longe antecellant; si credimus *Velschio*, qui peculiarem de iis non ita pridem scripsit tractatum, titulo de *Ægagropilis*; quem ideo consulas velim.

3. *Dama-capra*, *ῥεός*; proprie, cornibus tanquam unco prominentes rupes apprehendens, eoque pacto tutam se reddens à venatoribus; **the mountain Goat with horns hook'd at the top**.

4. *Caper Hispanicus*, **the Spanish wild Goat**.

5. *Ibex*, αἰξ ἰβηλική. *Homero*, ab ἰβύω, quod *Hesychius* exponit *ferio*; nam non raro cum magno impetu in venatorem fertur, eumque præcipitat; **the stone-bock**. De quo vide *Scaligerum ad Cardanum Exercitat.* 207. & in *Arist. de hist. animal.* 2. sect. 130.

6. *Caper Mambrinus*, auribus longissimis, quem prolixè describit *Marcgravius hist. Brasil. lib. 6. cap. 10*.

7. *Capra Strepsiceros*; **the Antelope of Barbary** (quæ vox vel Græcæ originis est, & tum haud violenter deflecti potest ab Ἀντί, *contra, adversus*, & ῥίπος, *cervix*; quasi dicas, Caper qui inversos cornuum apices habet: vel Arabicæ, quod verisimilius videtur, quia Animal ipsum in solis iis regionibus quæ Arabice loquuntur, invenitur) & Barbaris etiam *Gazella*, ab Arabico *Gazal*, Caprea.

8. *Capra Moschi*; aliis *Cervus Odoratus*; **the Musk Goat**. Hujus enim in folliculo colligitur odoramentum illud quod *Moschum* (forte à Gr. μόχος, *vitulus*; ab aliqua fortean vituli & hujus animalis similitudine) vocant. Ferunt odoratis pasci, ac potissimum Nardo; unde etiam Moscho, i. e. sanguini circa umbilicum collecto, odor concilietur. Consule *Atlantem Sinensem*, unde paucula de Cervulo hoc odorato, juniorum in gratiam, excerpere visum est. "At ne quid *Musculus* sit "quispiam hæere possit, dicam ipse plus vice simplici testis "oculatus. Tuber seu extuberantia quædam est ad umbilicum "animalis, parvum marsupium referens, subtili pellicula, & "subtilissimis pilis vestita constans. Animal ipsum Sinæ *Xe* "vocant, unde *Xehaing*, hoc est, animalis odor seu fragrantia, "quod *Musculum* significat. Quadrupes est, exili cervulo haud "ab simile, pilo paulo magis nigricante. Cornuum omnino "expers est: caro occisi etiam pro cibo adhibetur à Sinis. "Tubera illa, seu marsupia si sincera sint, minimeque adultera- "rata, præstantissima sunt, adeoque vehementi odore, ut organum

- “num ipsum, sicut & Zibethus pura, omnisque lux, aut sonus
 “æquo vehementior aures, aut oculos, odoratum offendant:
 “at versipelles Mercatores ex sanguine, pellibus, aliisque ani-
 “malis exuviis Muscho additis, marsupia quæ pellis animalis
 “subministrat, infarciunt, ac tanquam vera & genuina vendi-
 “tant. Sunt qui id miscent cum Sanguine draconis, & hoc
 “pacto ex una vesica tres aut quatuor faciunt: fucus tamen non
 “latet peritiores. Si enim adustum evaporet, verum esse cre-
 “ditur: quod si carbonis ad instar quidpiam adustum rema-
 “neat, adulterato actu contaminatum est. Animal adeo sto-
 “lidum esse fertur, ut venatoribus fugæ nescium interimen-
 dum se ultro sistat:
9. *Hircus Bezoarticus*, (*Bochartus* in *Hierozoic.* de fleclit à *Perfic.*
Bed, remedium, & *Zabar*, venenum; quasi dicas, Alexiphar-
 ma cum per antonomasiam: alii vero à *Pazar*, Perfice Caprum
 significante, quod lapis eodem nomine insignitus in Capri cu-
 jusdam ventriculo invenitur,) **the Bezoar Coat**: de quo
 adeundus est *Bontius*, de *Medicina Indor.* p. 46.
10. *Subak Scytharum*, auribus ita demissis, ut spectent ad ter-
 ram; **the long ear'd Coat of Scythia**. Quæ lana seu pilis, fa-
 cieque & cornibus ovem potius, quam Capram referre videtur;
 judice *Aldrovando Hist. Bisulcor.* cap. 25.
11. *Fliris*, *Oryx*, (*ὄρυξ* & *ὀρύξ* seu *ὀρύξ*, fodere; quod
 ad ortum accedente luna, prioribus pedibus terram effodere
 dicatur) quæ contrario vestitur pilo, & ad caput converso.
 Plura legas in *Aldrov. Hist. Bisulc.* cap. 25.

V. CERVUS (*ἀνὸρ* & *καέρων*, quasi *καέρων* cornibus insignis)
ἡλαρός (quasi *ἡλαρός*, levis, ob cursus velocitatem) **the stag**.
 De *Cornibus* Cervorum observare est, quod cervis *anniculis*
Calves aut **stags** (à Franco-Gallico *Faon*, *Fan*, Hinnulus seu cer-
 vi pullus) nondum cornua nascantur; *Bimulis* vero oriantur *simpli-*
cia & *recta*, ad Subulorum similitudinem, unde *πυλάριαι*, Subulo-
 nes, **Brochs**, **Brochets** (à F.G. *Broche*, veru) & **Prichets**, eos per id
 temporis vocant venatores; *Trimulis* deinde *bifida*, & tunc **bozells**
 (forte à colore pilorum circa id ætatis subrufo, qui color Franco-
 Gallis *Saur*, nescio an à Lat. *Saturo*) nominantur; *Quadrimis*
trifida, atque deinceps *ramosa* fiunt, indeque nominantur **stags**
 aut **Bucks**. Constat tamen in multo plures ea ramos dividi ante
 quartum annum. Ex novellis five *Typhis* sanguine adhuc mananti-
 bus distillatur aqua summe Cardiaca, Mayerno *Rizotica* dicta, ad-
 versus febres Malignas.

Ad Cervorum familiam spectant

Tragelaphus, qui Hirco & Cervo similis est (unde nomen) **the Goat-Deer**. Germani vocant **Brandthirsch**, quod nigrioris coloris sit, quam Cervus: quo etiam major est & robustior. In saltibus Bohemiae vicinis frequens est.

Tarandus, **the Reindeer**; septentrionalibus, quibus familiaris est, **Rehenschier** dicitur. Tergori ejus tanta durities, ut thoraces ex eo faciant.

Rangifer (ita dictus duplici ratione; tum quod in capite alta cornua, velut arborum ramos, gerat: tum quod instrumenta, cornibus pectorique, quibus hyemalia plaustra trahit, imposita *Ranga* & *Loga*, patrio sermone, vocentur.) *Sanguis* ejus excellentissimum perhibetur *Scorbuti* remedium: & *Ungulae* Spasmodicis prostant. Manfueti hujus & variis usibus humanis percommodi animalis historiam expresse tradidit Doctiss. *Joh. Schefferus* in descriptione *Laplantiae*: ubi ipsum & à *Tarando* plane distinctum, & illi regioni proprium esse asserit.

Alces, Germanis **Elend**, Angli. **the Elk**. De quo *Cardan. lib. 10. de subtilis*. Ungulae ejus *Epilepsiae* & *Hystericae* affectioni summo opere opitulantur.

Dorcas (*ὄρεος δόρυκα*, video, quod acutissime videat) **Capreolus**, **the Roe-Buck**, Scotiae per familiaris.

Pygargus, fera specie Cervi, quae retriores partes albas habet: ideo & *Pygargus* dicitur, quia Graece nates *μύλα* dicuntur. *Vetus Scholiastes*.

VI. RHINOCEROS, cui nomen à Cornu, quod è naso pullulat, datum est. Cujus Cutis instar Elephantinae, rugosa admodum est, cum profundis plicaturis, adeoque crassa, ut ictui Japonicae macherae facile resistat. **The Horn-nose**.

BISULCORUM NON-CORNIGERORUM Classis.

E NON-CORNIGERIS sunt

I. **CAMELUS**, *Κάμηλος*, (vel ab Ebraico, *Gamal*; vel à *Κάμνω*, *Calaboro*, est enim animal ad labores natum) **the Camel**. Cujus species sunt

1. *Camelus* proprie sic dictus, qui ratione regionis est vel
 1. *Arabicus*, qui vocatur *Maglum*, ingentis staturae & roboris, pondo mille librarum ferens.
 2. *Bactrianus*

2. *Bactrianus*, cui bina in dorso tubera sunt, unde *διπλοῖ* & *διπυρῖ* dicitur, oneribus ferendis & equitationi aptissimus.
3. *Cassius*, qui unum in tergo tuber, alterum vero in pectore, cui incumbat, gerit. Ut *Sam. Purcas. peregrinat. l. 6. cap. 1. f. 2.*
4. *Indicus versicolor.*
2. *Camelopardalus* (à *Camelo* & *Pardalo* nomen fortitus) modernis *Giraffa*, tanta in anterioribus proceritate, ut diductis latissime tibiis cibum & potum capere cogatur. Corporis vastitate Camelum, macularum varietate Pardum imitatur. Reperitur in Africa, apud Troglodytas, & in Æthiopia.
3. *Dromedarius*, minoris quidem staturæ, sed cursus velocioris: Unde & nomen habet (nam *δρόμος* Græce cursus velocitas appellatur) *the Dromedary*. Centum & amplius millaria uno die conficere solet.

BISULCORUM NON-RUMINANTUM Classis.

- I. **SUS**, *ŭs*, a **Swine**. (Sic dictus forsan à *śus*, *maŭto* & *sa-*
ſcrifico, quia id animal sacrificiis accommodatum: ut *Varro*,
 2. *de re rustic. cap. 4.*) Cujus varia occurrunt nomina, *viz.*
Porcus, *χοῖρος*, quasi *ſpurcus*, quod se coeno & limo immergat:
 a **Hog**.
ſcropha, *χοιρῆς*, *οὐέφα*, Porca quæ sæpius peperit; an old
 Sow.
Verres, porcus non castratus, & mansuetus; a **Boze**.
Aper, a wild Boze.
Maialis, verres castratus, a **Celt Hog**, or **Barrow-pig**.
 Ejus ex Carne & aliis conficiuntur (1.) *Pernæ*, *ſcamons* of
Bacon; (2.) *Callus aprugnus*, **Brawn**; (3.) *Iſcia*, **Sauciges**;
 (4.) *Proſecta*, **ſtricates of ſweet-breads**; (5.) *Lucanica*, **An-**
dulia's; (6.) *Faſci*, *Farcimina*, **Puddings**; (7.) *Funduli*, *Hiræ*,
Chitterlings; (8.) *Botelli*, **dried Puddings**; (9.) *Apexabo-*
nes, **Harlet-puddings**; (10.) *Tomacula*, **Liberings**; (11.)
Offa, a **pudding-pie**; (12.) *Afratum*, a kind of meat of
 ſwines-fleſh, like froth; (13.) *Tuceta*, **minced meat**; (14.)
Sartuli, **Hogs-fleſh mixt with meal and fryed**, &c.

Ad genus ſuillum referuntur.

Taxus porcinus, the **Pig-Badger**.
Sus Cornutus, the **Horned Swine**.

D

Babi-

Babiroussa, seu *Porcus Indicus*, in quo plurima miranda. Ejus & descriptionem, & effigiem videre est apud *Cl. Thom. Bartholin. Hist. Anatomic. cent. 2. hist. 96.*

Porcus Americanus à *Maregravio* descriptus, l. 6. *Hist. Brazil. cap. 7.*

II. HIPPOPOTAMUS, qui parte anteriore bubulam figuram, reliquo corpore suillam refert; *the River-Horse*, in Nilo frequens. Hunc bestiam illam esse immanem, quam in libro *Job* descriptam legimus, sub nomine *Behemoth*, rationibus plurimis probat *πλύλοισι*. ille *Sam. Bachartus* in *Hierozoic.*

Dentes ejus, in annulos tornati, plurimum valere creduntur adversus *Spasmodum flatulentum*, nostro idiomate *the Cramp* dictum.

Quadrupeda DIGITATA sunt vel *Ζώοντα*, *Vivipara*, vel *Ωόποκα*, *Ovipara*: &

VIVIPARA rursus vel $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fera.} \\ \text{Domestica.} \\ \text{Dubia.} \end{array} \right.$

Ex FERIS sunt

I. LEO, *λέων*, *ἐξ τὸ λέω*, *video*; quod perspicaci præ cæteris oculorum acie polleat. *the Lion*. Cui affines sunt *Feræ* (1.) *Mitzi*, (2.) *Quamitzi*, (3.) *Macamitzi*, de quibus videatur *Nierembergii lib. 9. cap. 24.*

II. PARDUS (seu ab *ἄρδω*, *irrigo*; quod ejus pellis nigris maculis quasi irrigata sit: seu ab *ἄρδαλώω*, *inquino*, quod iis quasi inquinata sit.) *Leopardus* (quasi ex *Leæna* & *Pardo* genitus.) & *Panthera* (quod omni-faria feritate sit prædita, Fœmina scilicet, nec crudelitatis unquam etiam mansuetæ obliuiscatur.) *the Leopard* aut *panther*. Cujus speciei quedam est

Dasyodes Pinus, sicut vocant Hispani, *Theotocbtli* Indi; quem exacte descriptum invenias à *Nieremberg. l. 9. c. 1.*

III. LYNX, *λύγξ*, *ἀπὸ τὸ λύνω*, à *Luce*; quod omnium animalium acutissime videat: unde nomen factum est fabuloso isti *Lyncæo*, qui acie oculorum penetrare dictus terram ipsam, videreque ea, quæ apud inferos fierent; ut *Apollonius* in *Argonauticis* ait; eo quod primus reperisset æris & argenti fodinas, *the Lynx*. Pellis ejus maximo venditur pretio, per totam Europam.

IV. TYGRIS, nomen à velocitate datum, à *Medis*, qui *tigrim* sagittam vocant, *the Tygre*.

V. URSUS vel ab Hebræo *UR*, ob igneam animantis indolem

lem; vel à supino verbi *urgeo*, quia animantes alias urgendo & impellendo prostermit) ἀρκτός, (ab ἀρκτομεν, quod sine externo alimento hyemem totam transigat.) Et δαούρηχος, hirsutus: **the Bear**. In Urſi renibus, detracta membrana investiente, appensa quasi Ceraſorum congeries videtur, & spatia intermedia adipe intime hærente replentur.

VI. LUPUS, à λύκος, K in P. mutato, à rabie rapacitatis) **the Wolf**. Cujus species sunt Lupus

1. *Vulgaris*, **the common Wolf**.
2. *Aureus*, qui minor est lupo communi, sed voracitate par: in Cilicia & Turcia frequens.
3. *Scythicus*, qui in ultima *Scandinavia*, post *Norwegiam* & *Gothiam*, reperitur; perpetuo iracundus & rabie percitus. Germani, ab acie unguium, quibus maxime lævit, **Grünne-Claw** vocant.
4. *Marinus*, **the sea-Wolf**; animal amphibium, magnitudine Urſi, pelle adeo dura, ut gladiis pene sit impenetrabilis. Pellis ad vestimenta militum gregariorum ac nautarum adhibetur.

VII. GULO (à voracitate insatiabili) **the Glutton**. Qui vescitur cadaveribus, tantumque devorat, ut tympani instar inflatur. Plenus, angustiam duarum arborum aut rupium ingreditur, & vi per infernas & superas partes excrementa extrudit, rursusque ad cadaver regressus sese implet. Unde *Scaliger Vulturem quadrupedem* vocat. Reperitur in *Lithuania*, *Muscovia*, & aliis septentrionalibus regionibus.

VIII. DABUH Arabum, Africanis *Sesef* dicta; magnitudine & forma Lupum referens, quæ etiam sepulta cadavera eruit. Forte est eadem cum veterum *Hyæna*; quod & *Gesnero* placuit. Sanguis hujus feræ pro potu venatoribus inservit: & melle rarissimo conditus, in pompis nuptialibus propinatur.

IX. VULPES (à celeritate, ὡς Συγκροτῶ, pro *valipes*, quod pedibus quasi volet.) Ἀλώμεξ (ὡς δ' αὖλῶ & ὡς ὠπῶ, à fallendis oculis) **the Fox**. Cujus species quædam esse videntur

Vulpes Americana, *Mapach* dicta, Anglice **Ratton**. Quæ illud sibi peculiare habet, quod aquæ injectam, quicquid offertur, prius anterioribus pedibus lavet & verset, quam ori admoveat. Iconem hujus perite delineari curavit, & *Musæi sui lib. pag. 319.* inseruit *Cl. Of. Wormius*.

Digitatorum SEMIFERORUM Classis.

SEMIFERA vocamus, quæ licet feris sint instructa moribus; Sob parvam tamen corporis molem, ab hominibus facile regi & domari possunt. Cujusmodi sunt

1. SIMIA, & nonnunquam *Simius* (vel à depressis & *simis* nari-
bus: vel, quod *Vossio* magis placuit, quasi *Mimia*, à μιμῆδης, imi-
tari; quia cum homines non sint, homines tamen imitantur. Quod
ipsum indicat *Claudianus lib. 1. in Eutropium*.

Humani qualis simulator simius oris.

Πίδνυς, ὡς τὸ μιμνῆδης ὑπ' ἡμῶν, quia facile ab hominibus persua-
deatur, *the Ape.*) Cujus variae species sunt, viz.

1. *Babio the Baboon*. Dicitur etiam *Papio*, & Germanis *Ba-
bion*.
2. *Cercopithecus* (i. e. *Simia Caudata*; κίπνος enim *caudam* sig-
nificat & *πίδνυς simiam*) *the Monkey*. Qui est vel *Barbatus*,
vel *Erectus*, vel *Leoninus*, vel *Moschatus*, vel *Ambiguus*. De
quibus differentiis consulendi *Marcgravius* & *Johnstonus*.
3. *Cercopithecus Minor*, *the Marmoset*.
4. *Cynocephalus* (à canino capite) *Eliano* Κυνοκεφάλιος (quod
faciem habeat caninam) *the Dogs-Headed Monkey*: in-
genio singulari, & proxime ad humanum accedente. In *Æ-*
gypto quippe (ubi in sacris nutriebantur olim, ut inde tempus
Synodi Luminarium scire possent) discunt ad quemlibet *Epi-*
stolas deferre: & observavit *Belonius*, qui nummos hero de-
ferendos, manu protensa, à spectatoribus exigerent. Hujus
generis unum in Aula sua servabat *Carolus* 1. olim Rex noster;
sed, post biennium, sclopeto confici jussit, ob insignem sa-
lacitatem. Fuit enim tam solutissimum animal, ut, ad pri-
mum puellarum aulicarum conspectum, libidine effervesceret,
& in amplexus ruere auderet.
5. *Satyrus Indicus*; *Orang Outang* Indis; & *Homo Sylvestris*
dictus *Nicol. Tulpio* (qui ejus tum effigiem, tum admirandum
ingenium communicavit in *Observat. Medicar. lib. 3. cap. 56.*)
the Drill. De quo mira retulit *Gassendus*, in *vita Peirescii*,
lib. 5. in hunc modum. "Significarat nempe *Peirescio Natalis*
"Medicus quidam clarus, esse in Guinea *Simias*, barba proce-
"ra, canaque, & pexa propemodum venerabiles; incedere
"iplos lente, ac videri sibi præ cæteris sapere: qui maximi
"sunt & *Barris* dicuntur, pollere maximo judicio; semel dun-
"taxat quidpiam docendos: veste indutos, illico bipedes in-
cedere;

“cedere ; scite ludere fistula , cithara, aliisque id genus (nam
 “quod everrant domum, convertant veru, pinsant in morta-
 “rio, aliaque ratione famulatum præstent , hand reputari ad-
 “modum) feminas denique in iis menstrua pati, & mares
 “mulierum esse appetentissimos. *Arcosus* vero literis quibus-
 “dam exposuerat, quidnam Ferrariensi cuidam contigisset,
 “cum in regione Marmaricæ, *Angela* dicta, versaretur. In-
 “cidit nempe quadam die in Nigritam canibus venantem ho-
 “mines, ut visum, sylvestreis. Capto, cæsoque illorum uno,
 “inhumanitatem Nigritæ increpuit, qui in suum genus ita se-
 “viret. Ille vero, falleris, inquit ; nam hic non est homo, sed
 “bellua homini persimilis. Quippe sola pascitur herba, inte-
 “stinaque ovina habet ; quod ut credas melius, rem ecce ; si-
 “mulque abdomen aperuit. Feminae similiter captæ erant
 “mammarum ad pedis longitudinem : cætera mulieri simillima
 “fuit. Totum utrique pilosum corpus, sed pilo brevi, ac satis
 “leni.

II. *Upalim*, fera Cercopitheci Æthiopici magnitudine. Pellis
 autem quasi coccò tincta rubet, maculis aliquot in locis conspersa.
 Caput instar globi rotundum. Uti describitur ab *Ambrosio Hist.*
Digitator. lib. 9. cap. 9. & Johnstono lib. de Quadrup. pag. 145.

III. *Tamandua Guayanae* Brasiliensis, Congenibus Cubi & frequens
 est. *Umbalu*, Belgis vero, de groote *Dierneter* Angl. the great
Ant-eater; quia formicis velcitur, linguam prælongam exerens,
 fornicarumque tumulo tam diu imponens, donec formicis plena sit,
 quas deglutit. Teste *Marcgravio Hist. Brasiliens. lib. 6. cap. 4.* ubi
 & extat animalis hujus icon: ut & alterius, *Tamandua-i*, i. e. the
 lesser *Ant-eater*, dicti.

IV. *As*, five *Ignavus*, the sluggard. Animal magnitudine
 vulpis, sed adeo ignavum & tardigradum, ut unius diei spacio vix
 quinquaginta passus pervadere possit. Hujus iconem videre est in
Ol. Wormii Museo. Lusitani *Perillo ligero*, seu *camiculam agilem*, per
 antiphrasin vocant: aliquando *Priguita*, i. e. *Pigratio*. Inquisita
 est figura & natura hujus animalis. Ore insignitur inamæno, & un-
 guibus ad digitorum similitudinem prominentibus. Cui in occi-
 pitio existens coma cervicem velat: lentoque ventris adipe ipsam
 verrit humum, rarissime in pedes exsurgens, & tam tarde incedens,
 ut 15. dies ad sagittæ jactum continuo tractu vix progrediatur. In
 arborum cacuminibus degit plerumque quarum in ascensu biduum
 circiter, tantundemque in descensu ponit. Nondum cuiquam inno-
 tuit quo cibo vescatur: neque enim ullum capere notatur. In pe-
 dibus tantum ei robur natura contulit, ut quodcumque apprehende-
 rit, illud fortissime detineat. Homines in se insurgentes, ita aspe-

ctu suo commovet, ut ab ea ulterius molenda, vel intima commiseratione moti, abstineant: præter lacrymas enim quas ex oculis emittit, ita doloroso aspectu spectantes se ferit; ut facile persuadeat, minime lædi debere, quod natura tam inerme, tamque miseræ corporis habitudini subjecit. Vocem non nisi noctu edit, eamque prorsus prodigiosam, Musica nempe sex graduum intervalla perfecte referentem: ita ut Hispani, dum primum Novi Regni provinciam in America tenerent, noctuque huiusmodi vociferationem perciperent, homines Musicæ nostræ præceptis imbutos se audire arbitrarentur. Ab his, uti & ab indigenis HAUT nominatur, non alia de causa, nisi quod per singulos gradus intervalli Sextæ repetat hanc voculam, *Ha, ha, ha, ha, ha, &c.* Plura de stupenda hac bestia scire cupienti consulendum propono *Abb. Kircherum, Art. magna Consoni & Dissoni lib. 1. cap. 14. sect. 2. & Georg. Marggravium hist. rer. Natural. Brasiliens. lib. 6. cap. 1.* qui secuit famellam vivam, habentem in se foetum omnibus numeris perfectum; quæque in ea observarat, accurate commentariis consignata reliquit.

V. TATU, seu *Armadillo* Hispanice (quia est animal Cataphractum, crusta undique tectum, militari & cataphracto equo persimile) *the Armadillo*. Specubus, cuniculi more, conditur; unaque nocte spatium leucæ excavat: si credere fas sit *Nierembergio Hist. Exot. lib. 9. cap. 6.*

VI. TAXUS, etiam *Daxus* (forte à Græco δαῦς, hirsutus & villosus) *the Badger* (hanc vocem *Badger Skinnerus* noster desecit à Franco-Gallico nomine *Bedouer*: vel à Teutonico *Bach*, Mala, Maxilla; quasi dicas *Bacher*, i. e. validis maxillis præditus; & est sane animal mordacissimum) aut *Brock*, aut *Bawson*. Cujus species videtur

Deprat, sive *Taxus Americanus*, bestia magnitudine Cati, mellis avidissima, ideoque apum opificium sedulo in arboribus inquirens.

VII. CASTOR (quasi γάστωρ, quia est animal ventricosum. Ideoque ridiculi sunt, qui à castrando deducunt, quasi venatoribus visis, conscius se propter testiculos peti, eosdem dentibus evellat, & abjiciat. Parvos enim habet, & spinæ adhærentes, qui, superstite ipso, avelli non possunt.) *Fiber* (quod φίβρις habeat pilos, i. e. molles: unde levicula mutatione aliud nomen ejus *Beter*, quomodo Belgis vocatur *Beber*, Gallis *Bievre*, Italis & Hispanis *Bevaro*, ut *Vossio* placuit.) *the Beber*, aut *Castor*.

VIII. LUTRA (ab Æolico ἰλύδρις, pro ἰνύδρις, sive ἰνύδρις, quod in aqua ut plurimum versetur; quomodo *Lutram* Græci vocant: nempe generali nomine, cum proprie omnia Aquatica sint ἰνύδρια. Æolos, eorumque exemplo Latinos N. in L. mutare, satis constat: unde ὑμφοι, *lymphe*; ex quo ὑμφοιλήπτοι, *lymphatici*; teste

teste *Eustathio*) **the Otter**. *Penem* habet maxima ex parte osseum, Canum more; pedesque palmatos, ad instar anseris, quo velocius natet. Cui congenere videntur *Lutra Americana*, *Saricovieme*, & *Carygueibeu*. Priorem describit *Ambrosinus*, *Hist. Digitat.* l. 2. c. 13. alterum *Marcgrav.* *Hist. Brasil.* l. 6. c. 9.

IX. MUS ALPINUS, *Marmota*, nonnullis ἀπλόπος (ob similitudinem, quam cum mure & urso gerit.) Qui capite leporem refert, magnitudne Cuniculum, auresque tam breves habet, ut vix supra caput emineant. De *Interioribus* observationes *Severini* (*Zootomia Democrit. pag.* 325.) hæ sunt. Testes aliquantulum superiores, Cœcum peramplum, ventriculi modo, interne asperum & reticulatum, in quo valva insignis introrsum externe. Hepar multifidum, septenis lobis distinctum. Cystis fellis cholidochi valvula ad Duodenum. Splen longus hirundinis majoris modo. Ureteres non recto ductu descendentes à renibus, sed dorso adhærentes & exigui.

X. ICHNEUMON, (ab ἰχθυῖν *investigo*, sive quod instar canis venatici investiget Crocodilum & Aspidem, eorumque ova observet, quam rationem affert *Gesnerus*: sive potius quod rostro suo (id simile rostro fuillo) cibum ruspetur & investiget, unde & ἰχθυῖν ab ἰ; dicitur *Pisida* in Ἐξανμύρῳ.) hodie, teste *Bellonio*, *Mus Pharaonis* seu *Ægypti* vocatur: & *Æliano* *Mus Indicus*, **the Egyptian Rat**. Amphibium est animal, magnitudine felis, sed longius, pilis instar pili lupini duris, albicantibus per intervalla & leucophæis. Hepate Crocodili delectari, & ideo in dormientis ventrem irrepere, communiter traditur. Illud sibi peculiare habet, quod meatum quendam habeat extra foramen excrementi peramplum, undique pilis cinctum, pudendo muliebri non dissimilem, quem magno urgente æstu, loco excrementi interim clauso, aperire solet. Hinc scriptores omnes indiscriminatim, *Ichneumones* omnes & mares & foeminas esse arbitrati sunt.

XI. HYSTRIX (ἀστὴξ & ὕς, *pilus* & *sus*, ut ad verbum sonet, *sus pilos habens*: unde proverbium ἀστὴξ ὕς ἐστι, *hystricis seta*.) **the Porcupine**. In hoc animali, insignis ille musculus cutaneus (quem panniculum carnosum vulgo nominant) cuti continuatur, & singulæ etiam aculeorum thecæ suas sibi proprias habent fibras motrices, observante exactis, *Anatomico*, *D. Nic. Senone*, in *Canis Carchariae* dissectioni historia.

XII. ERINACEUS (forte ab *hærendo*, quia fructus, similiaque ejus tergi aculeis infixæ hærent: pro qua sententia est locus *Plin.* l. 8. cap. 37. Præparant hyemi & Erinacei cibos, ac volutati supra jacentia poma affixæ spinis, unum non amplius tenentes ore portant in cava arbores.) *Echinus terrestris* (ἀντὶ τοῦ διώκεσθαι μὴ ἔχειν δὲ τὰς ἀκίδας, ὁ ἰστὶν ὁ ἀκιδάρτης, quod ob aculeos teneri non possit,) **the Hedgehog**, aut **Archin**.

XIII. MUS-

XIII. MUSTELA (vel à *Mus*, *vel* enim vocis productio est, ex sententia *Vossii*: vel à *μῦς* & *σῆμα*, quod mures è cavernulis surripere credatur) **the Weasel**. Cujus species censentur

1. *Mustela Sylvestris*.
2. *Hermellanus*, **the Ermine**.
3. *Viverra* (quod vi verruncet, i. e. Animantes à cuniculis expellat) **the Ferret**.
4. *Furo* (scilicet quod more *furis* prædam noctu surripiat: seu à *furvus*, i. e. obscuro colore) **the Sitchet**, aut **Sitchaw**.
5. *Putorius* (quia putidum ex ore halitum semper expirat) **the Polecat**. Alias **Stunner** dicitur, à Lat. *Fumus*, quia tetrum fumum seu halitum expirat; vel contracte à *Fulmar*.
6. *Martes* (à ferocia, quia *Martia*, sive pugnax est, **the Marten**, aut **Martem**. Excrementa molchum spirant. Pellis pretium ingens. In dissecto peritonæum non comparuit: Omentum vero in marsupio intestina omnia includebat, tenue, sine pinguedine. Intestinatorum nulla animadvertebatur differentia. Crassius enim Ileon erat quam Rectum: Cecum molle, Pancreas candicans; Lien rubicundus, & oblongus; pallidius Hepar, sex lobis distinctum. Vesicula fellis lobo inclusa, quasi plicatis fimbriis. Ventriculi forma consueta. Pulmones tribus utrinque lobis conspicui. Cor & cætera nihil insolitum aliis animalibus ostendebant. Ex observatione *Thom. Bartholini Hist. Med. cent. 7. hist. 14*. Alia tradidit *Severinus part. 4. Zoetom. p. 317*...
7. *Mustela Zibellina*, Aristoteli *Satherius*, Nipho *Cebalus*, Alcianto *Mus Sarmaticus & Scythicus*; **the Cebal** aut **Sable**. Quam *Agricola* paulo minorem Marte facit, totam obscuro colore fulvam, præter guttur, quod cinereum est. Frequens est in extremis *Muscovitarum* silvis. Præstantissimæ sunt pelles, quas *Tartari & Lappones* mittunt.

XIV. GENETTA (unde nomen desumptum sit, ignoratur) *Catus Hispania*, & *Genethacatus*; nonnullis *Panthera minor*; **the Genet**, aut **Genet-Cat**.

XV. ANIMAL ZIBETHI, Græcis modernis *Zapation* Scaligero *Catus Zibethicus*, aliis *Civetta*, & Bellonio *Hyæna odorata*, **the Civet-Cat**. Folliculum circa inguina gestat, in quo odoramentum, Zibethum dictum, colligitur: de cujus materia, generatione, usu, collectione, extractione, optime scripsit *Petrus Castellus Romanus*, in *Ezetasi de Hyæna Odorifera*, quam ad calcem *Hist. sue de Quadrup.* apposuit *Johnstonus*.

XVI. FELIS (à *φῆλας*, *fallax*, impostor, est enim animal callidum


lidum & fraudulentum : unde *Felona Chief the Cat*: quæ est *Domestica, House-Cat*; & Silvestris, *Wild-Cat*; *Syriaca* multis punctis intermixta, *the Cyprus-Cat*, dicitur item *Blurus*, καὶ πάλαι τῶν ἑσπέρων, à varianda vel movenda cauda.

Sylvestres inter feles (quæ indubie pro climatum in quibus degunt diversitate, seu corporis habitum, seu rationem vivendi spectemus, haud parum inter se variant) nullam equidem hactenus vidi spectantium admiratione digniorem exotica illa, quæ hodie in Augustissimi. CAROLI II. Regis nostri Theriotrophio servatur. Hanc feram ex India Orientali, cui peculiaris nec infrequens esse perhibetur, ad Sereniss. Regem dono transmisit Nobilis quidam Anglus, commercii, nostrates inter & Indos in Emporio *Suraton* exerciti, Præfectus. Indis per universam *Choromandellæ* oram diffusis, inter alia nomina, Perfice dicitur *Sjab-Ghush*, i. e. *Nigris auribus* prædita, *Black-cat*: & generali Orientalium consensu (à quibus tamen equidem timide dissentio) prædam pro Leone investigare traditur. Animal ipsum magnitudine *fulpem*, forma *Catum*, pilorum colore Leonem, ingenio & crudelitate *Pardum* exactissime repræsentat: ut de genere merito ambigas. *Dentibus* armatur acutissimis, caninis in utraque maxilla multum eminentibus; tum ad transfigendum, tum ad dilacerandum comparatis. *Artus* ei sunt felinis & longiores & magis torosi; at excedente magnitudinem robore prævalidi: viribus enim adeo magnis pollet, ut canem venaticum forte occurrentem, strenueque pro vita pugnantem conspexerim ab ea quasi unico momento enecatam, discerptumque. *Pedes* habet pilis densioribus, tanquam pulvinari, substratos. *Condito mucrone unguium* in vaginis incedit, nec nisi appetendo unquam protendit, ne hebetentur: quod & Leoni pariter, *Pantheræ*, *Catoque* domestico commune est. Illud autem huic videtur proprium, quod capta insiliendo præda, in eam continuis moribus retentam, aliquantisper simulata morte, incumbat immobile: siue non satis moderate ferens lætitiâ, siue sanguinem interea è miselli animalis jugulo tacite exfugens. Ab Indorum Magnatibus & Principibus cum non exigua industria cicurari solent, tum in deliciis haberi; ob eximiam illam qua pollent, in Avibus, Leporibus, Cuniculis & Gazellis minoribus captandis *astutiam*. Tanta enim sunt calliditate, ut mille modis visam semet prædam, etiamsi ad suspicandum sagacissimam circumvenire soleant: tantaque simul ferocia, ut in vulpes etiam ipsas minime detrectent involare. Cæterum quæ ad venatum cicuratae sunt, à custodibus tam sedulo reguntur, ut nihil supra vires aggredi permittantur. Immittuntur ut plurimum in Grues, Pavones, Ciconias, Ardeas, Urogallos, Phasianos, Perdices, Anseres, Onocrotalos, Anates, &c. quas variis doliis deceptas insidiosissime opprimunt, non sine magna spectantium

voluptate. Feras vero pedum pernecitate duntaxat valentes, Lepores nimirum, Cuniculos, Capreolas, Damarum hinnulos, & alia id genus quadrupeda imbellia & meticulosa, partim concitatissimo cursu, partim insidiis vincunt. Ubi Anorexia laborant (quod saepe nimia ex ingluvie contingit) Bestiarius iis mox carnis cuiuspiam tenerioris frustula diutule in lotio humano macerata ingerit; unde confestim appetitu revalescere solent. Si quando ex impari certamine contusæ, claudicantes, aliterve læsæ redeunt; Mumia similiter offis involuta, & tepidum cubile cum quiete præsentaneum afferunt levamen. Dum in sylvis libere degit *Siyah-ghush*, Leoni se venatus comitem adungere fertur, ut prædæ reliquiis vescatur. De qua re *Sheich Saadi* in libro *Gulistan* seu *Rosario* quingentis abhinc annis conscripto (quem Persice ac Latine edidit *Georg. Gentius*) sequentem hanc *Apologum* in medium affert, pag. 81. "Atram Auricudam rogarunt, te quidnam adeo delinivit, ut tibi "Leonis consortium sumseris, illique mira officiorum promptitudine blandiaris? Respondit; ut prædæ illius reliquiis vescar, ab "hostiumque truculentia tuta sub illius potentiae umbra vitam "transigam. Ad hæc dixerunt illi; cum sub patrocinii illius umbra concesseris, beneficiaque illius extuleris, quid non propius "Leonem accedis; ut te lætissimorum consortio inferat, teque "ex præstantioribus ministris habeat? Respondit illa, hoc tuum si "sequar consilium, propiusque accessero, ne unum quidem momentum à furore illius secura ero.

*Ignicola et si centum annos ignem accenderit,
Si unum momentum in ignem inciderit, ille cultorem suum exurit,*

His de admirando hujus animalis ingenio & usu breviter jam enarratis, ne lectoris ulteriori oblectamento deesse videar, subjungam & ejusdem effigiem singulari artificio expressam, nec in ullo alio Zoographorum libro, quem hactenus mihi videre licuit, oculis usurpandam. Et ne ingrati animi culpam sustineam, æquum est heic palam agnoscam, me & Persici nominis *Siyah-ghush* interpretationem, & *Apologi* modo-è *Sheich Saadi Rosario* excerptæ notitiam debere amicitiae Doctissimi D. *Thomæ Hyde*, Primarii Bibliothecæ Bodleianæ in inclyta Universitate Oxoniensi Custodis, viri sane Πολυγλώστου, & mira ingenii felicitate tam ad omnia humanitatis officia, quam ad summam eruditionem comparati; qui utramque mecum benigne dignatus est communicare.



Hanc iconem aeri suis impensis incidi curavit. & ζωοφιλῶν
voluptati consecravit Doctiss. verèq. Generosus vir, D. JOH.
LAWSON. M.D. & Indyti Medicor. Lond. Coll. Socius meritis.~

XVII. LEPUS, (à Græco vocabulo antiquo, quod *Æoles* eum
Boetii λέπριον appellabant; ut *Varro ipsemet*, 3. de R. R. deduxit,
& post eum *Scaliger* in suis de Caus. L. L. libris cap. 179.) λαγῶς &
δαούρις; quod mollissime, propter villosos pedes, incedat; the
hare. Post primum congressum superfoetat, ut vere *Poeta* scri-
pserit:

*Prolis amans, gignit fetus, lactatque tenellos,
Dumque superfoetat, dum parit, usque coit.*

Non est ergo mirum, catulos prægnantes in dissecto lepore inven-
tos; quod apud *Ælium* legimus. *Amatus Lusitanus* tradit, ani-
mal facie & magnitudine leporis in India vagari, quod incolæ tam
diu baculis cædunt, donec moriatur, Mortuum pelle nudant, & car-
nem ex i&ibus lividam conterunt, manibusque quasi ad hanc re-
digunt; quam pellibus ejusdem animantis involutam, *Moscham* no-
minant.

XVIII. CUNICULUS (quem *Varro lib. 3. de R. R.* ab eo sic
dictum voluit, quod sub terra *cuniculos* sibi ipse fodere soleat: sed

contra *Vegetius lib. 4. cap. 24.* subterraneos illos meatus ab animali potius nomen accepisse statuit; huicque suffragatur *Martialis lib. 13. epigr. 60.* hoc disticho;

*Gaudet in effossis habitare Cuniculus antris;
Monstravit tacitas hostibus ille vias.*

Unde *Vossius* hariolatur, cum (*Varrone* teste) cuniculus ex Hispania primum esset advectus, non abludere à vero, ipsum etiam nomen inde reportasse) *Vegetio Lepusculus*; & *Straboni, Lepus fossor*: the **Coney** (à Belgico **Konin**, quod à Lat. *Cuniculus*) aut **Rabbit** (quod vocabulum *Minshaus* desecit ab Hebræo *Rabah*, coire scil. propter fertilitatem: *Skinner* autem à Lat. *Rapidus*; quasi cursu velox.) Recens natus, & adhuc pilis vix contactus, *Liberis*, *Laberis*, & *Laurix* indigitatur (forte à voce *λελει*, quæ Græcis antiquis ὁ τ' ὄφις γένος, Serpentis exuviae) unde *Leberet*, nisi magis placuerit, esse diminutivum antiq. voc. Franco-Gal. *Levre*, à Lat. *Lepore*. Cuniculorum *differentia* à colore, magnitudine, & loco desumuntur. In omnibus, ut & aliis ad hanc spectantibus classem animantibus, dum prægnantes sunt, duplex reperitur *Placenta*; altera nimirum rubra, & Chorio immediate adhærens; altera glandulosæ substantiæ, quæ inter priorem & uterum intercedit, ad eum tamen minime pertinens. Nam una cum foetu excluditur, & Secundinarum partem constituit. Plura de horum ovarii & generatione si quis cupit, consulat accuratiss. dissectorem. *D. Regnerum de Graaf. lib. de Mulier. Organ. generationi inservient. cap. ult.* Huc etiam refertur *Porcellus Indicus*, sive *Guinensis*, the **Guinea-pig**, cujus Anatomem accuratissime administravit immortalis *Entius*.

Nierembergius H. E. lib. 9. cap. 7. novem Cuniculorum Indicorum species observat; qui proinde videndus.

XIX. SCIURUS (à *Σκία*, umbra, & *ὄρεα*, Cauda; quod cauda sibi umbram faciat.) *ἰωπυρος*, & *καμπύρος* (forte ἀπὸ τοῦ καμπύλου, à *flectendo*, quod clunibus insidens caudam supra dorsum flectat) the **Squirrel**. In hoc Animali elegans & rara observatur *Hepatis* structura: primo namque in multiplices dividitur fibras; quas interstitiorum diversus color, in plures lobos divisas indicat; & tandem emergunt glandulosi acini extra assurgentes, ut quid distinctius vix conspici possit: observante *Malpighio*, de *struct. viscerum*, pag 7. Hujus variae sunt species, viz.

1. *Sciurus*, sive *Mus Ponticus*, ita *Aristoteli* dictus & *Plinio* (quod ex regionibus circa *Pontum*, olim ad usum & vestitum petebatur.)
2. *Sciurus*, sive *Mus Getulus* (à *Getulia*, ubi frequens est.
3. *Sciuri*

3. *Sciuri Indici*, quorum sex differentias invenies in *Nierembergii H. E. lib. 9. cap. 34.*

XX. GLIS, (seu à *glisco*, hoc est *cresco* & *pinguesco*; quia Glires pingues efficit somnus; ut *Martialis lib. 13. Epigr. 59.*

*Tota mihi dormitur hyems, & pinguior illo
Tempore sum, quo me nil nisi somnus alit.*

Seu ex Æolico γλίσκος pro ἱλίσκος per Syncopen, ut ex γάλας pro βάλανος; glans. Glis est ἑλίσκος μῦς, quasi dicas *arboreus* vel *silvestris mus*; sic deducente *Cl. Salmasio in Exercit. Plinian*) *the Dormouse*. Plus quam unam hujus animantis speciem in India observavit *Nieremberg. H. E. Lib. 9. cap. 75.*

XXI. MUS, μῦς, (vel à μῶαν, quod est abdere se in latibula, sive *inlatebrare*: vel à Persico *Mus*, quod idem significat) *the Mouse*. Cujus familiæ sunt Mus

1. *Avellanarius, the Hazel-Mouse.*
2. *Araneus, the Hardshrew, aut Spitemouse, aut Erdbrew.*
Qui à figura, nomen *maris*; ab agilitate, vel à venefica qualitate, *Aranei* nomen accepit.
3. *Norwegicus*, (quia *Norwegia* peculiaris est) è nubibus quandoque decidens, pascuis & fegetibus cladem inferens ingentem: *Leming*, de quo luculenter scripsit *Cl. Ol. Wormius in suo Museo prope calcem*. Ubi & Iconem & Sceletum videas ad vivum usque depicta.
4. *Aquaticus*, cujus meminit *Aristoteles* in libro *Mirabilium*, & cui *Bellonius* tres meatus assignat, unum pro fecibus, alterum pro urina, tertium pro foetu.
5. *Indicus*, dictus *Coyopolin*, à *Nieremberg*io descriptus *H. E. lib. 9. cap. 5.*

XXII. SOREX (quod in modum Serræ res arrodit & præcidat) *ῥοξ* (quoniam rostrum suillo perquam simile habet) *the Rat*. Qui est vel

1. *Domesticus, the House-Rat.*
2. *Aquaticus, the Water-Rat.*
3. *Moscardinus*, Italiæ proprius.
4. *Moscoviticus, sive Odoriferus.*

XXIII. TALPA (τῆ μάλ' ὄναι pro *talpa*, vel *talpa*: nempe à cæcitate, ex Græco *τῆ φλᾶ*: vel à Græco *τάλλω fodio*: quod *Etymon* respexisse videtur *Virgil. 1. Georg.*

G

Ans

Aut oculis capti fodere cubilia talpa.)

the Mole, aut **Want**, aut **Mont**. Rara in extis hujus animalis observata à *Severino* (in *Zootomia Democrit.*) pag. 317. hæc sunt. (1.) Præterquam quod nullum Colon, intestinaque reliqua fere uniformia; nullum etiam Cœcum. (2.) Testes intro conditi, colore tamen nigro: neque in loco, qui proxime renibus esse solet (puta in *Dasypodis*) sed à lateribus vesicæ, in infima abdominis cavitate. (3.) Renes conjuncti proximæ venæ cavæ pufillo, sive spatio *Emulgentium*. (4.) Fel pro corpore majusculum, cum conspicuis cholidochis. (5.) Ventriculi janitor linea quadam transversa veluti ligatus atque distinctus. (6.) Vasa ferentia suffulta Ureteris. (7.) **Larynx**, qualis in *Testudine* terrestri; mutum enim animal. (8.) **Panniculus** carnosus totus & mire commissus cuti, *etc.*

XXIV. CANIS, (à canore latratus, quod voce signa edere soleat, & homines commonefacere: unde *Præfatus custodiæ* dicitur *κύων* (κύω το κύων, amo; quia pronior est in venerem) **the Dog**. Qui est

Catenarius, a **Band-dog**, aut **Cie-dog**, à **Band**, *vinculum*.

Molossus, *Bellicosus*, *Anglicus*, a **Mastiff**.

Leporarius, *Scoticus*, a **Grey-hound**.

Venaticus, a **Hound**.

Venaticus minor, a **Beagle**.

Sagax, a **Blood-hound**, aut **Talbot**.

Agasæus, a **Cale-hound**.

Terrarius, a **Terrier**.

Vertagus, a **Cumbler**.

Hispaniolus Aquaticus, a **Water-Spaniel**.

Hispaniolus Agrarius, a **Land-Spaniel**.

Villaticus, a **House-Dog**.

Luparius, a **wolf-Dog**, aut **Irish Greyhound**.

Melitenensis, a **Lap-dog**.

Indicus, a **Naked-dog**.

Islandicus, *Frisius*, a **Shock**.

Degemer, a **Cur**.

Lyciscus, a **Mongrel**, engendered of a wolf and a Bitch.

Canis Perdicum venaticus, a **setting-dog**.

In Canum extispicio hoc singulare deprehenditur quod intestinum Colon in iis desideretur. Idem quoque in Lupo & vulpe (qui feri canes sunt) observare est. Accedit; quod Canalis Chyliferus prope glandulam Renalem sinistram deferitur, ut eandem prorsus contingat. Non tamen ingreditur, sed à latere ejus ad receptaculum commune progreditur. Hactenus de *Uiviparis*.

Digi-

Digitatorum OVIPARORUM Cute testorum
Classis.

Quadrupeda OVIPARA vel Cute teguntur, vel Testa five Crusta.

CUTANEORUM classem constituunt

I. RANA, ranula (à voce sua, Ra, Ra; iudicio *Varronis lib. 4. de L. L.*) Βα'ραχ' (vel ab eodem sono, ut *Vossio* placuit; vel, ut aliis, ὡς τὴν βολὴν ῥαχίαν ἔχειν, quod raucam asperamque edat vocem, quæ Coaxatio, Anglice **Croaking** est, forte à Franco-Gallico *Croaquer*, crocitare; & notum est illud Aristophanicum in *Ranis*, βραχυνίξ, ῥαχίξ, ῥαχίξ; imo & rana ῥαχίξ ex eo vocatur) **the frog**, (ab Anglo-Saxonico *Frocca*, Ælfrico *Frogga*, rana) quæ ovo recens exclusa, nondumque integre formata, νεῖν. Ionibus, aliis γυρίν', *Gyrinus*, nostro idiomate a **Toadpole** (ab Anglo-Saxonico *Tade*, bufo, & *Fola*, pullus; quasi dicas, Bufonis pullus, i. e. Bufunculus) dicitur. Animalculum quidem palustre, aspectuque foedum: at si ejus interanea spectemus, modumque generandi, summa dignum admiratione. Nam ore coit, ore concipit, oreque ova in aquas excludit; quemadmodum infra in *Mantissa Anatomica*, ubi ejus confectionem invenies, fuscè clareque ostendam. Hujus species sunt

1. *Ranunculus viridis*, *Calamites* (quod inter arundines & calamos versetur) **the Green frog**, aut **Buddock**.
2. *Rana Temporaria* (quia diu vivere nequit) **the short liv'd frog**.

II. BUFO, forte quod in appropinquantibus maximo impetu spiritum efflat: vel à βυβ', i. e. *plenus, confertus*; quia viso hoste, spiritu suo intus cohibito sese inflat: vel à βυβων, qui inguinis est tumor; tumida enim bestia est, unde Nostratibus proverbium, **swollen like a Toad**.) *Rubeta*, (ut inter *rubos* frequentissime versans) **the Toad**: Qui est

Geophagus, (terra enim victitare creditur) qui maxime venenatus existit, adeo ut urina etiam in homines ejaculata inficere & interficere tradatur: & sub *Salvia* sæpe stabulatur) **the Red poisonous Toad**.

Gibbosus, **the Hunch-backt Toad**.

Hel.

Helmontius (in *tumulo pestis*. p. 76.) à *Butlero Hyberno* edoctus, ex *Bufonis* cadavere, & terra, ac animalculis, quæ ad focum suspensus, intra triduum, in patinam ceream evomere solet, trochiscos cum *tragacantha* & cerea illa patina format; qui ad mammam sinistram gestati contagium pestilentielle arcent, & loco alligati virus extrahunt. Sed de hujus promissi veritate nil certi experimento fide dignorum virorum constat; licet quamplurimi periculum fecerint in nupera *Peste Londinens.* anno superiori, viz. 1665.

III. LACERTA (à *lacertorum* humanorum similitudine: Græcis veteribus Σαῦρος, & σαῦρα, modernis Κολισσαῖρα, the Lizard. Quæ est vel

1. *Vulgaris*, the common Lizard.
2. *Viridis*, the Green Lizard.
3. *Chalcidica flexuosa* (nomen à *Chalco*, seu ære, quod dorsum ejus lineæ æræ percurrant, datum est (the Lizard with yellow streaks along the back.
4. *Cypria Scincoides*; the Cyprus Lizard resembling the fish Scincus.
5. *Cauda bifurcata*, the forked-tail'd Lizard.
6. *Stellio* (à stellato dorso) the Swift.
7. *Venenata* {terrestris, the Land} Newt aut Eket.
 {aquatica, the Water}
8. *Indica*, de cujus variis speciebus consulatur *Marcgravium*, *H. Bras.* l. 6. c. 11.
9. *Salamandra aquatica*, the water salamander.
10. *Salamandra terrestris*, maculis luteis distincta. (Nomen est à Græcis quibus itidem est Σαλαμάνδρα: *Martinus* conjectat sic dici, quia prope σαῦλον habet μάνδρα: nam stabulari gaudet juxta loca humida.)
11. *Scincus terrestris*.
12. *Cordilus*, *Uromastiges* (quia continua caudæ agitatione sese diverberat.) *Bellonio Crocodilus terrestris*, quoniam primo aspectu Crocodilo Nilotico assimilatur: verum postea ab ipso discrepare asseverat; quia hoc animal caudam in modum clavæ tuberculis eminentioribus asperam gerit. Quapropter corpora, quibus appropinquat, atrocissime diverberare dicitur. Unde *Caudi-verberæ* nomen sibi vindicavit.

IV. CHAMÆLEON (quasi *parvus Leo*, nam χαμαί in compositione imminuit, contra quam βῆς & ἵππος, quæ ἐπιλαίωσιν sunt) the Chameleon. Qui est

(1.) *Varius* (2.) *Cinereus* (3.) *Niger*. Quorum icones perita manu exsculptas exhibet *Cl. Johnstonus Tab. 79. Hist. Nat. de Quadrup.*
De

De Internis partibus hæc habet *Gassendus (in vita Peirescii, lib. 5. p. 325.)* Anatomicis notatu dignissima. (1.) Unicum Intestinum; non circumvolutionibus, sed curvaturis solum productum. (2.) Excrementum satis liquidum, nisi qua parte ad anum accedit. (3.) Hepar bifidum, & ex gibba parte quidem sanguinem in cor auriculatum infundens: at non superflite ascendente descendenteve caudice venæ, sed venæ quoque aliæ ad cæteras partes directe procedunt. (4.) Pulmo inflatus abiit in membranam tenuissimam, toti animali in ambitu æqualem. (5. In imo ventre nullum Peritonæum, sed membrana solum partes dextras à sinistris dirimens. (6.) Non item Lien, non Vesica, non Renes; sed Carunculæ solum observatæ sunt, quæ Genitalia forte fuerunt. (7.) Lingua pedalis prope longitudinis. (8.) Rerum objectarum colores non induebat. (9.) Oculi non movebantur conjugati; sed uno aliquorsum spectante, alter vel staret immobilis, vel in aliam partem deflecteretur. Quibus aliâ æque admiranda adjicias, à *Cl. Thom. Bartholino (Hist. Med. cent. 2. cap. 62.)* ex *Dominico Panorolo* tradita. Oculos nimirum musculis destitutos, motum in omnem partem nancisci à membranæ corrugatione; quæ fibrarum circularium beneficio contracta, oculum trahit quocunque est movendus, sicut frons alioquin corrugari solet. Nervos autem Opticos è cerebro enatos statim dividi, ut singuli ad suum oculum vergant, absque omni decussatione: unde oculi unius motus alter non statim sequitur. Eosdem etiam laxos esse, non tensos; ut ad posteriora sine ruptura reflecti possint. Præterea Linguam aliud nil esse, quam canalem concavum, in exortu & fine carnosum, spongiosum, & viscosum, in cujus canalis medio transit funiculus, qui extenditur & contrahitur instar chordæ testudinis, inseriturque in linguæ finem quum ab osse Hyoide sumat initium, &c.

V. CROCODILUS, *κροκόδιλος*, *αὐτὸ τὰς πρῶτας φοβεῖσθαι*, quod littora timeat, nam *διλὸς timidus* est. Turcis *Timsah*, Indis *Allegator*, Angl. *the Crocodile*. Quem verum esse Jobi *Leviathan* luculenter demonstrat *Cl. Bochartus Hierozoici lib. 1. cap. 7.* Fidem meam superat, quod scribit *Mandelsous in Itinerario*, fæminas *Macasserandar* cum pueris parere quoque Crocodilos.

SERPENTIVM TERRESTRIVM

Classis.

ANIMALIA APEDA, Græce Ερπίδα in genere dicta, sunt quæ vel citra usum pedum repunt: vel tam exiguos habent, ut repere potius quam incedere videantur. Suntque (1.) *Terrestria* (2.) *Aquatica*.

TERRESTRIVM classem complent SERPENTES *Terrestres* in specie sic dictæ, viz.

I. VIPERA, (nonnullis, quia in *vipre*, hoc est vepre latere solet, unde Germanis vipera dicitur *Hechnater*, quasi *veprium Natrix*: aliis vero, & rectius quidem quasi *Vivipara*, quia sola est serpentium genere vivum pariat animal) ἰχίς, mas, & ἰχίς, femina (ἡ δὲ ἰχίς ἐν ἑαυτῇ τὴν γυναικαὶ, ἡ δὲ ἰχίς, quod animal intra se contineat,) *the viper* aut *Adder*. Cujus dissectionem accuratius instituit, & in Epistola quadam ad *M. Aurelium Severinum* missa ex professo descripsit Anatomicus insignis, *Joh. Veslingius*.

II. AMMODITES, (seu à colore arenaceo: seu quia in locis arenosis latitat) viperæ tum figuræ, tum partus ratione similis: *the Sand viper*.

III. CERASTES, (ἀπὸ τοῦ κεράτος, à duabus eminentiis in capite cornua referentibus) *the Horned Serpent*.

IV. HÆMORRHŌUS, (ἀπὸ τοῦ αἵματος, sanguine, & πλῆ, fluo; quod ad ejus morsum sanguis ab omnibus corporis humani meatibus effluat.) *the Hemorrhoid serpent*.

V. SEPS, ἡ δὲ σίπτει τὰς πληγὰς, quod vulneratorum ab hoc Serpente caro statim putredinem concipiat: unde Latine etiam Putria) ad quam pertinere videtur *Aguaſen Nierembergii*.

VI. ASPIS, (vel ab aspiciendo, quod acutum intueatur: vel ab aspergendo morsu venenum; nam & Aspides quædam πνῶδες vocantur, hoc est Spuentes, atque earum non morsus modo, sed saliva etiam venenata est) *the Asp*.

VII. DIPAS, (ab inexplibili siti, quam morsu suo hominibus infert) Μελαρρῆς (à cauda nigra) & ἀπρηρ, (quod ictus ejus veluti flamma adurat) *the burning or fiery Serpent*.

VIII. SCYTALE, (à forma τῆς σκιάλης, quæ vox baculum significat; teres enim & æqualis ita est, ut ubi caput vel cauda sit, discerni vix possit) *the slow-worm*. Cujus meminit *Lucanus*

*Et Scytale, sparsis etiam nunc sola pruinis
Exuvias positura suas.*

IX.

IX. AMPHISBÆNA (ab ἀμφὶ & βαίνω, quod geminum ut caput, ita & incessum habere videatur, nunc in anteriorem, nunc in posteriorem partem prorepens; quasi ἑκατέρωθεν βαίνουσα. Quo- modo & Gallis dicitur *Double Marcheur*, Utrique-grada) **the Am- phisbæna**, aut **double-headed serpent**. Quia autem utrinque progreditur, eo, qui non satis caput à cauda distinguerent, credide- re, utrinque caput habere, unum quo loco reliqua animantia, alte- rum in cauda. Sed si quis Serpens vilus biceps, vel triceps; inter monstra haud minus debuit referri, quam cum homines vel canes bicipites nascuntur.

X. CÆCILIA, *Typhlops* (à cecitate, etsi revera non plane cæca sit, sed perexiguos habeat ocellos) **the blind worm**.

XI. CENCHRUS (à κίνακρον, *Milio*; quod quibusdam notis in dorso milii instar exornetur) **the various coloured Asp**.

XII. ACONTIAS (ἀπὸ τοῦ ἀκρίβης, à jaculo; quod jaculi in- star se vibret in transeuntes) **the darting serpent**.

XIII. DRYINUS (à δρύς, *quercus*; quod in quercubus la- teat) χέλυδρον. (quod ab aspera cute, ad instar Testudinis, sit mu- nitus) **the Oak serpent**.

XIV. ELAPS. (ab ἑλαφός, *Cervus*; quod celeri cursu feratur) **the stag-snake**.

XV. ANGUIS *Æsculapii*, **the snake**, (ab Anglo-Saxonico *snaca*, Belg. *snake*, Dan. *nog*; omnia à verbo Saxon, *snican*, repere. q. d. *reptile*, ut serpens à serpendo.) Dicitur etiam *Co- luber* (vel ἀπὸ τοῦ κολυμβᾶν, quod subeat cavernas; ut *Cæsar*. *Scal- ligero* placuit, *Comm. in lib. 11. Hist. Animal. cap. 18. sect. 123.* vel ex χέλυδρον corrupte.) Apud nos in dumetis, sterquiliniis, fato- rum munimentis, ædificiorum ruinis, aliisque locis, maxime uligi- nosis frequens est. *Magnitudine*, pro ætatis ratione, variat; raro ulnam excedens. *Caput* oblongum, compressum, squamulis partim ex viridi cæruleis, partim flavis exornatum est. A vertice utrinque per tempora ad oris scissuram usque *aureo* quasi *capistro* insignitur. *Dorsum* habet exiguis, & ex viridi ad cæruleum vergentibus squamis contextum: *Ventre* ex albo & nigro variegatis, & majoribus squa- mis pulcre distincto. *Oculi* parvi, veluti sanguine parum rubescen- tes. A podice paulatim in *caudam* angustam, & acutam definit. In- ter cutim & carnem, *pinguiusculam* habet *membranam*, quæ cum ipsa cute, dum excoriatur, discedit. *Aspera arteria*, longitudine quatuor circiter digitorum, pro corporis proportionem, parvis circu- lis tornata, ad *pulmones* (qui prælongi, albi, & stricti, ex vesiculis pellucidis fereque ovali figura præditis constant) deferitur: cui *cor* & *vesicula fellis* adhærent. *Hepar* oblongum, instar *Lucii pis- cis*: cui & intestinis pinguedo adalligatur. *Intestina* à faucibus

ad excretionis locum sub alvo descendunt. Infra hepar utrinque juxta intestina, *Ovarium* membraneum longo ductu excurrit: cui suo tempore insunt *Ova* alba, ita pelliculis conteſta, ut in Gallinis videmus, sed longo ordine ducto, in quolibet latere triginta duo. *Linguam* evibrat bifidam quidem, & acutam, sed mollissimam. *Veneni* nihil habere credo: nam & manibus tractant, & in sinu gestant multi, sine incommodo; dentibus etiam caninis, quales in vipera videre licet, omnino caret. *Vescitur* muribus, ranis, gyrinis, limacibus, Cantharis, insectisque aliis: at captus ab omni cibo abstinet ad mortem usque, in ediam plures menses tolerans. Verno tempore excutiunt illud, quod *Senectam Anguium* vocant, vernantium *spolium* & *exuvias*. Inter duos lapides aut aliud simile exsuere incipiunt, ab oculis primum detrahendo, tum caput, atque 24. horis tota exuitur à capite ad caudam. Hæc *vernatio* à Medicis ad multa commendatur.

XVI. BASILISCUS, *Regulus* (sic appellatus, vel quod in capite habeat album instar diadematis: vel quod reliqua Serpentum genera vim ejus fugiant: utrumque Etymon confirmat *Plin. lib. 8. cap. 21.*) *the Basilisk*, vel *Cochatrice*. Quæ de ejus tum generatione ex ovo Galli gallinacei decrepiti, tum intuitu interimente dicuntur, prorsus fabulosa sunt. Halitus enim pestilens verior videtur interitus causa; qui per aerem diffusus, homini se insinuare potest. Ideo *Nicander*

*Tam teter vacuas odor exhalat in auras,
Atque propinquantes penetrat non segnet artus.*

His addantur Serpentes terrestres EXOTICI,

I. BOICININGA, & *Boiquira* Brasiliensibus, Lusitanis *Casca-vela*, & *Tangedor*, Belgis *Raetel Schlange*; Angl. *the Rattle-snake*. *Nierembergius* *Dominam Serpentum* vocat, *Hist. Exot. lib. 12. cap. 1.* Ictu mortem certissimam infert, nisi celerrime præfidiis occurratur: inter quæ excogitatum est; iccta humare membra, terraque obruere, & ita manere, donec omnino cesset dolor, aut morbus sit curatus; prospero magna ex parte successu.

II. IBIBOCA, Lusitanis *Cobre de Corais*, Serpens Brasiliensis, cujus morsus venenatissimus, non extemplo vitam depascitur, sed tarde se promovet. Sanatur Emplastro è capite serpentis concinnato, & efficaciter appposito: ex auctoritate *Guliel. Pison. Medic. Brasil. lib. 4.*

III. BOIGUACU, omnium Serpentium maximus, à *Marcgravo* descriptus cum tribus ejus speciebus, *Hist. Brasil. lib. 6. cap. 13.*

IV. MA-

IV. MATER FORMICARUM Clusii.

V. CANINANA, à *Pisone. Medicin. Brasil. lib. 3.* descripta, cum multis aliis.

Serpentium AQUATICORUM Classis.

IN AQUATICORUM numero sunt

I. HYDRUS (ἀπὸ τῆς ὕδατος, ab aqua, quia in aqua vivit) *Nicandri* interpreti χερσίδης (quod in aquis & terra divagetur) Latine *Natrix* (à natatione) *the water-snake*. Serpentum pulcherrimus visu, sed halitu adeo noxio, ut in cortice virgæ recenter excisæ, & ori ejus admotæ, vesiculæ felleæ excitentur; imo fulgens gladius linguæ veneno inficiatur: teste *Belluasensi*. De magnis ejus in Medicina usibus lectu digna collegit *Johnstonus de Serpent. lib. 1. cap. 2.*

II. NATRIX TORQUATA (à circulis, quibus tanquam torquibus in superiori parte circumdatur) *Nicandri* interpreti πάλαιστα, i. e. multis coronis insignis; Italis *Carbonarius* dicitur (à nigro colore) *the King's water-snake*.

III. NATRIX RUBETARIA (quia vocem edit Rubetarum similem) maculosa valde, & venustate admiranda, sibiloque à rusticis agnita: *the Croaking water-snake*. Ictus remedium est, patientis pedem in terræ humidæ scrobe per diem naturalem sepelire.

IV. BOAS *Lucani* (quod armentorum greges sequatur, & rigua vaccarum ubera fugat) quæ in ingentem excrevit molem; ita ut sub Imperatore *Claudio*, referente *Salino*, occisa fuerit, quæ integrum infantem in alvo gestabat.

V. CAPRIMULGUS Anguis, *the Goat sucking water-snake*, in quo singularia observat *Severinus*, *Zootom. Democrit. pag. 36.*

VI. *Serpens Marinus Norwegicus*, magnitudinis incredibilis, ab *Olaus Magno*, & *Aldrovando* descriptus.

VII. SCOLOPENDRA Marina (propter similitudinem cum terrestri nomen obtinuit, quasi ἰχθυοῦ σκόλοποι ἐν τῇ ἰδρᾷ, quod in extremo, quod caudæ loco est, corniculum, quasi radius atque impactus aculeus superemineat) *the sea scolopendra*. Cubitalis describitur longitudinis, & venenatæ naturæ. Morsu enim instar urticæ urit; & sputo hominem interficit, affirmante *Æliano Hist. Animal. lib. 7. c. 30.*

VIII. HYDRUS Marinus, de quo in Piscibus.

De EXOTICIS Serpentibus Aquaticis legatur toties laudatus *Nierembergius, H. E. lib. 7. & 12.*

INSECTORUM Divisio Generalis.

E Numeratis supra Animalibus tum Quadrupedis, tum Apodis, sequuntur MULTIPEDA, quorum classem complent *Insecta*, Aristoteli *Ἔντομα*; sic dicta, quoniam eorum corpora incisuris præcinguntur, aut parte tantum supina, aut etiam prona.

Distinguuntur generalius in *Terrestria*, & *Aquatica*: & utraque in *Pedata*, & *Apoda*.

E PEDATIS rursus alia sunt *Alata*, alia *Aptera*, five non alata.

ALATA subdividuntur in *Anelytra*, five *Detestipennia* membranacea; & *Coleoptera*, five *Vaginapennia*, quæ alas suas velut in vagina recondunt.

Inter **ANELYTRA**, alia *favificant*, alia *non*. De quibus in genere & specie, secundum hanc seriem, agemus.

Insectorum ἀνελυτῶν **FAVIFICANTIUM**
Classis.

EX FAVIFICANTIBUS sunt

I. APIS (sic dicta, vel quod se pedibus invicem alligent Apes: vel quod sine pedibus nasci primo videantur.) Pro priora ratione facere videtur illud *Virgilii* 4. *Georg.*

Aut ille pedibus connexa ad limina pendent.

Pro *Posteriori* militat illud ejusdem,

Trunca pedum primo, mox & stridentia pennis

Miscuntur.

Μέλισσα & *μέλιττα* (à *μέλι*, melle, cujus opifex est, vel τὸ μέλειν, vel ἀπὸ τῆς μελέτης, à meditatione, exercitio, & diligentia; quasi Animalculum esset, non ex mero naturæ instinctu, aut prudentia Politicum) a *Bee*.

Ex Apum officina habemus,

Mel, *Honey*.

Ceram, *Wax*.

Misyn, *Commesyn*, materiam scilicet nigram & acris odoris, the *Gummy Wax with which the Hive is first lined*. Primum operis fundamentum, seu prima crusta, Ceræ est veluti purgamentum nigrum, quo pavimentum, & alveum ipsum intus totum oblinunt, ne bestiolæ nocuæ subeant. Saporis est amari, & odoris acris. Medetur plagis, & hujusmodi suppurationibus.

Pissoceren,

Pissoceron, quasi materiam ex pice & cera compositam; **the Pitch-war.** *Pisoceros*, proximum à *Mitye* testorium, crustave. Super eam venit, picantium modo, ceu dilutior, ceræ initium plerumque è mitiore gummi. Fit è lacrymis arborum, quæ glutinum pariunt.

Propolin, **the Hive-dross.** Quæ est crassior quædam materia, flavescent, odorata, *Styracem* referens, & in *Mastiches* modum ductilis, ceræ finitima, nondum tamen cera, qua omnis frigori pluvizque aditus in alvearia obstruitur. *Propolis*, *quinnior*, *Dioscoridi*, *Cera virginea Scribonii*. Rudis est, & crassa materia, seu gluten in alveorum foribus: nondum tamen cera, sed favorum stabilimentum, qua omnes frigoris aut injuriæ aditus obstruuntur; odore etiamnum gravi. Veteres pro *Galbano* utebantur.

Favos, **Combs.** De quibus omnibus fusius egit *Mouffetus*, in *Insectorum Theatr.* lib. 1. cap. 6. *Favi* ab utroque latere cellas obtinent. Contra *Crabrones* & *vespæ*. *Cibi* causa mellificant *Apes*. *Melleum* enim liquorem è fronde in utriculos congestum, ore in cellas evomunt, & melle uno alterove die, ad summum, cellas replent. Crassescit autem mel concoctum jam tempore, quod initio ut aqua dilutum est, & ferme ut mustum, seque purgat, vicesimo die spissatur, mox obducitur tenui membrana, quæ fervoris ipsius tenui spuma concrevit. *Cass. Schwenfeld*; apud quem multo plura.

II. **FUCUS** (sive quod *fucum* faciat homini, ut qui mentiatur apem, cum non mellificet, sed aliarum mel absumat; sive quod apibus *fucum* fraudemque faciat, furtim mella devorando) *σπίναξ*, *ωδρεϊς* (quod aculeum non exerat) **the Drone**, aut **Dran**.

III. **FUR** (quia apibus natura invisus, absentibus illis alvearia irrepat, thesaurosque mellis divastat atque devorat.) *Aristoteli* *φύρ* & *φύρ*, unde Latinum nomen *furis* manasse arbitror: **the Thief**. Apibus & *Fucis* grandior est, & nigrior, latiorque alvo.

IV. **VESPA** (non tam quod *vesperi* mulcas capiat, vel vi petat & adoriatur: quam, quod *Vespa*, i.e. gracili pede sit.) *Σφή* & *σφήνορ*, aut à *σπίλω*, *stringo*, & *gracilem* facio; aut à *μέσ* & *σφαγῆς*, quod medio ita sit dissecta, ut quasi hiare appareat) **the wasp**. Insectum est longiusculum, gracile, Api fere simile, aculeatum, capite longiore, rostellum, antennis supra oculos nigricantibus. *Thorax* hirsutiusculus nigricat, juxta alarum exortum maculis luteis conspersus. *Venter* longior in acutum definit, & cum splendore flavet; quem cingunt annulares lineæ, quæ superne notis quibusdam triangularibus in medio dorsum versus, punctisque ad latera similis coloris distinguuntur. *Cruscula* flava sunt, asperiuscula extremitatibus. *Alæ* ferruginei coloris. *Vespæ* *meia*, *vesparia*, *vespeta*, seu nidos suos in arboribus & tectis figunt; aliquando sub terra nidificant, terram;

K

ut

ut formicæ, egerentes. *Cellis* sexangulis favos extruunt omnes, ut apes; sed ex materia corticea quadam & arenosa, initio facto à radicum fibrillis, quibus artificiose nidum appendunt. *Falvram*, modo apum, instillant, ad latus cellarum favi, & parietibus admovent. Sed non in omnibus inest æqualis foetus, verum aliis jam grandiusculus, ut etiam volare queat, aliis in Nympha est, aliis adhuc in vermiculo. Ictum ejus venenatum esse omnes norunt; sed in insula *Nicesin*, referente *Ortelio*, vespæ mortem inferunt. Unde natum proverbium, *ορνίαν ἐκείνην*; cujusmodi quid etiam in *Hippocratis* tumulum scribebatur his verbis, *Μὴ πρὸς ἐγχείρησιν ὀφθαλμοῦ καὶ χρομίσματος, dormientem vespam ne suscita.*

V. CRABRO (à *Κράας*, caro, & *βόας*, cibus; quia carnibus vescitur.) *Ανδρῶν*, (forte quod ictu suo *carbunculum* excitet) *the Hornet*. Insecti genus pennigerum, affine Vespis, sed multo majus, pertinacissimum, aculeo pestilentissimo. *Caput* anterius, & *venter* posterior lutea sunt. *Thorax* hirsutiusculus crassior, & *alpi* initium, ex flavedine rubent ad castaneum colorem vergente, qui in maculam triangularem definit; reliqua tota annulis luteis compacta est, præter puncta supina parte subrubentia. *Crusculis* firmatur senis asperiusculis. *Alæ* membranæ quatuor superiores longiusculæ, latentes breviores obtegunt, coloris fumigati. *Oculi* fusci sunt. *Cirri* seu antennæ, continuis veluti internodiis discretæ, prominent croceæ. Ad posteriora *aculeus* latet acutissimus. Crabrones habent *Duces*, more apum & vesparum; qui, proportionem ad Crabrones, majores quam vesparum ad vespas, & apum ad apes, sunt. *Degunt* hi quoque intus, sed non plures uno in singulis eorum alveis oriuntur. *Examinis* emissio nulla, ut apum, fieri solet; sed qui subinde oriuntur novelli, ibidem manent, & alveum fovent ampliorem. Si qui Crabrones suo alveo aberraverint, colligunt se in aliquam arborem, favosque ibi conficiunt in sublimi, qui sæpe conspicui apparent, in quibus unum procreant Ducem. Non ex floribus, ut apes, *cibum* colligunt, sed carnibus maxima ex parte vivunt. Venantur etiam culices, muscas & apes. Fructus dulces appetunt. Degunt ut plurimum in sylvestrium arborum, ut quercus, pyri, cavernis: nonnunquam & ædium conclavia subeunt; ubi miro artificio nidum trabibus ex ligno putrido annectunt. Aliquando alvearia apum vacua subintrantes, nidum in sublimi suspendunt. Longe lautior seu politior *favus*, quam vesparum. *Cellularum* oscula deorsum hiant, quibus foetum instillant, quo à pluviis & aeris injuriis tutiores esse possint. *Vita* bimatam non transit. Non enim cibum, ritu apum, sibi recondunt; sed jejuni per hyemem latent; quo tempore plurimi moriuntur. *Favi* Crabronum adversus scrofulas Equis infunduntur. Feroces & iracundæ, & quamvis gregales, semper tamen silvestri

silvestri sunt ingenio; tantæque malignitatis, ut ter novenis puncturis hominem, imo equum interficiant: Syrio præsertim orto, quo tempore ardentiorē obtinent naturam, hominesque imbecillitas major, ob spirituum largam exhalationem, tenet. Haud mirum igitur, si in Sacrosancta Scriptura sævissimis & crudelissimis hostibus assimilantur, *Erex* 23 & 24. Hinc proverbium *irritare Crabrones*: quod in Mulieris ingenium dicitur, Cui si iratas repugnes, magis provoces, neque sine tuo malo maximo discedas.

VI. TENTHREDO (*ἀπὸ τῆς τενθρείας*, quod liguratione deletur.) *the lesser Hornet*, five *Bastard Hornet*.

VII. BOMBYLIUS (nomen à *murmure* obtinuit, nam *βομβυλιαῖον* significat murmur edere. Qua item de causa *Anglis* etiam dicitur) *the Dumble-Bee*, quasi Apem *sonoram* dixeris. Est inutilis plane Apis; unde virum desidem atque inutilem Græci *βομβύλιον ἄνθρωπον* dixerunt. Stimulo armatur, & gravissime pungit. Mel faciunt subdulce & subaquosum.

Insectorum ἀνελοτήρ non FAVIFICANTIUM
Classis.

EX Non Favificantibus sunt

I. CICADA, quod *cito cadat*, five evanescat: seu quasi *κύριος φθόνος*, ut *κύριος* sit hujus animalculi sonus. Neque in Germania, neque in Anglia reperiri Cicadas, affirmat *Monffetus*: tamen si quæ ibi fuerint: utraque gens ipsas *Bowe Krichets*, aut *Baum Krichets* appellant.

II. ORSODACNA, *Mordella* (quasi ad mordendum concitetur) forte forficula, *the Earwig*. Sane & ortus ratio, & morsus conspirant. Nam & hæc generatur in caulibus herbarum fistulosis, & in Brassica frequens conspicitur.

III. PERLA (quia corpus instar *Unionis* splendet) *Libella* & *Zygana* (quia corpus inter alas librari videtur) *the Dragon fly*, aut *Adders-Boult*, & *water-Butterflies*. *Perla* Italica, Musca grandior oculata. Insectum est volatile quadripenne. Caput ei grandiusculum, rotundum, instar speculi lucidum, Oculis utrinque protuberantibus maximis, pectore crasso & brevi. *Abdo* admodum procera & gracili; cujus extremitas in bifurcatum mucronem desinit. *Pedes* hirsutiuseculi 4. *Alis* volat etiam 4. longis, robustis, fibrosis. Magna harum varietas. Volant hæc Libellæ velocissime, plerumque solæ, nonnunquam binæ in congressu cohærentes. Circa meridiem stipiti alicui insidentes quiescunt. Unde proverbium prandendi tempus indicans, *La Perla va à sticchi*. Harum tres dif-

ferentia notantur à *Mouffeto*; *Maxima* nimirum, *Media*, & *Minima*.

IV. CIMEX filvestris, the *Knolster*, aut *flying Pine*. Qui *Lectulario* Cimice sextuplo major est, æque ac ille foetidus. Sunt partim virides, seu herbacei coloris, partim flavescentes, partim subrubentes. Cimices autem *Lectularii* sunt vermiculi latiusculi, compressi, rubentes, in cubilibus ad lectos & parietes nati.

Ανελυτῶν Quadripennium FARINACEORUM

Classis.

Inter Anelytra FARINACEA ponuntur

I. PAPILIONES (vel quia *papiant*, hoc est, edunt & exsugunt olera, imo & ceras, ut *Columella* auctor est: vel rectius ex Græco ἡπίολος, repetendo P. Meminit *Aristoteles lib. de Animal. 8. cap. 27.* ubi est, ἡπίολος περὶ τῶν λύχτων περὶ τῶν φωσφῶν, *Papilio luminibus accensis advolitans*. Græci generaliter ψυχῶν, oxytonos seu paroxytonos vocant, à *vento*; forsan quia vere post ventos primo apparent) *Butterflies*. Græce ψάλυξ σκεπιδνίς, Insectum alatum, alis prælongis, latis, imbecillis omnino generis, varios colores ementiens. *Alas* habet membranosas quaternas, siccas, quasi farina asperfas. Ante oculos prætenduntur *antennæ*, seu cornicula ignava longiuscula. Harum tot sunt species, quot *Erucarum*, quarum quæque ex Aureliis proficiuntur. *Aurelia* folliculus est, seu ovum ab *Eruca* relictum, papilionis futuri larva seu matrix. *Folliculi* minores, sunt *marium*; majores, *famellarum*. Differunt autem omnes, quod aliæ potissimum noctu volent, *Phalena* dictæ, Anglis *moths*: aliæ vero interdum ἡμερήσιοι, *Diurna* nuncupatæ, *Day Butterflies*.

Phalena dicitur etiam *Papilio ignavus*, *blatta Lucernaria*, *Lucifuga*. *Πυγαλλίς* Hadr. Junio, ἡπίολος Arist. *Κανθαλοσβίσκη* Nicandro. *Apis* infestus est; favos suo stercore conspurcat, ex quo dein tinea nascuntur.

II. Papilio BOMBYCUM (quia è *Bombyce* nascitur) the *silkworm-Butterfly*. Quæ per metamorphosin generatur, hoc modo. Ex *Eruca* jam folliculo inclusa fit *Chrysalis*, sive *Necydalus*; ex *Chrysalide* oritur *Papilio*, qui folliculum perterebrat, & depositis ovis moritur. Ex ovis renascitur *Eruca*, & sic quasi circuitu facto transmigrat animula. Hinc *Aristoteli* Νεκύδαλος, ἀναστρέφεται νεκίων dicitur, veluti redivivus, morte liberatus. Insectum volucre instar Papilionis ignavi, quatuor *alis* instructum, lanugine albicante duo,

aut grisea vestitum, *Ventre* oblongo & pigro, circulis veluti distincto, & mobili, crasso, pinguique. In vertice *Cornua* gerit duo, ab latere utroque plumulis hispida, ipsa inter se aversa & recurvata. *Pedes* seni, utrinque terni, villosi & breves. Non volant, sed moventur cum strepitu, & mas magis. Non pascuntur, sed generationis opere peracto, fati concedunt, ovis post se relictis. Insecti hujus admirandi historiam superiori anno in lucem emisit *Marcellus Malpighius*.

Ανελυτρώ, BIPENNIVM Classis.

EX Anealytris BIPENNIBUS, five quæ binis advolant pennis, sunt

I. MUSCA (seu à Græco *μῦα*, quod idem significat, S. insertum more antiquo, ut deducit incomparabilis *Vossius*: seu à *Musculo*, detractis enim alis, caput nervosum, corpus molle, & caudâ tendinosa apparet.) & *fly*. Muscæ fungis *Muscariis* dictis, lacte vel melle pertritis, facile enecantur, si eos gustaverint.

II. TABANUS (quod corpore *tabeat*, i. e. *gracilis* sit) *μῦα*† vel *ἀπὸ μῦα* & *ῥῆσις*, quod muscæ sit similis; vel, ut aliis placuit, à calcare quo equi stimulantur) *the Burrel fly*, *stout*, aut *Breez*. Muscarum majorum genus est, armentis infestum. Pungit & infestat æstu. Magnitudo ei Crabronis fere, ut corpore obeso & crassiore. *Caput* nigrum, in cujus fronte *antennæ* duæ obscure rubentes porriguntur. *Oculi* conspicui nulli. Præter aculeum in ore, visuntur duæ *appendiculæ*, quibus res obvoluntas fortiter apprehendit. *Thorax* superior fuscus, inferior cum facie flavidiore, lanugine hirtus; ex quo nascuntur pedes sex luteoli, nigricantibus extremis. *Alvus* obtusa, annulosa, nigricat, circulis luteolis, & notis triangularibus, in medio fursum porrectis, insignita. *Alæ* membranæ, sunt coloris fumigati.

III. ASYLUS, & *Asilus* (ab *asillus*, quia asinorum gregem infestat) *οἷς εἶς* (ἀπὸ τῶν οἷσταιν, *insanire*, quod armenta in furorem agat,) *the whame*, aut *God-fly*.

IV. BIBIO (quæ vino delectatur.) *Volucella* Scaligero, *the wine-fly*.

V. EPHEMERUS, Hemerobius, Diaria; *the fly living but one day*.

VI. TRIMERUS, *the fly living three days*.

VII. MORDELLA (à mordendo) *ὀρσὸδᾶκυν* *Arist.* Insectum volucre, ex Muscarum genere, ore largo, & prope denticulato, pustulas puerorum appetens. Descriptam habeas apud *Schwenckfeldum*.

L

VIII. SCI-

VIII. SCINIFICES, al. *Ciniphes*, muscæ sunt minutissimæ, aculeis molestæ. Pecudum anhelitum sequuntur, & homines, maxime dormientes, aculeis suis pungunt acriter. Hinc Nobiles & delicati, retia circa lectos expandunt, ut ab iis sint immunes, & secure dormiant.

IX. LIGNIPERDA, quæ gracili est corpore, capite majusculo, antennis binis colore Rubini pulcherrimo. Arbores & ligna perforat.

Reliquarum Muscarum aliæ sunt

AQUATICÆ, ut

1. *Phryganides*, ex vermiculo Phryganie ortæ, **the Cades fly.**
2. *Macedonica*, quia apud Macedones circa fluvium Astræum reperiuntur, nec ad aliarum muscarum similitudinem accedunt, magnitudine crabrones, colore vespas, bombitatione apes, audacia reliquas muscas æmulantes.

3. *Musca Aquatilis* { Major.
Lutea.
Fusca.

4. *Æschne*, colore cinereo, sex pedibus, juxta caudam multos quasi exiguos pilos lanuginosos habentes: **the ash-coloured water-flies.**

TERRESTRES quæ sunt vel { *Zooφάγοι*,
Αζωοφάγοι.

E *Zoophagis* sunt

1. *Carnivora* (quia carnes devorat) **the flesh-fly.**
2. *Hippoboscus*, *Equisuga*, **the Horse-fly**
3. *Canisuga*, *Koromyia*, **the Dog-fly.**
4. *Serpentisuga*, *Ophioborus*, **the Snake-fly.**
5. *Bombylophagus*, **the Humble-Bee-eater.**
6. *Ovisuga*, **the Egg-sucking-fly.**

Ex *Azoophagis*, i. e. quæ rebus ab animalium natura diversis victum quæritant, numerantur

1. *Humisuga*, *Humipeta*, **the Ground-fly**, aut **path-fly.**
2. *Merdluora*, **the Dung-fly.**

Her.

3. *Herbivora**Struthiopteros*,*Erinopteros*, quæ tota alba est, vel potius argentea, exigua,
& ubique plumosa; *the silver-fly*.*Cbelidon* (quia volatu post se omnes relinquit) *the swallow-fly*.*Prædatrix*, *Damok-butterfly*.

Præter jam recensitas Muscarum differentias, occurrunt insuper
SETICAUDÆ, seu *Pilicaudæ*, *αἰχμητοὶ* *Brittle-tails*, quarum
aliæ unam, aliæ duas, aliæ tres, quatuorve setas in cauda habent.
Unde

Henothria, Unifeta.*Bipilis*, quæ duas,*Tripilis*, quæ tres,*Quadrupilis*, quæ quatuor in cauda setas habet.

VII. CULICES (vel ab *aculeo*, quod promuscide sua cutim
perterebrant, & sanguinem exsugunt: vel quasi *Cutileces*, quia
cutim *laciunt*, hoc est, morfu laceffant) *Gnats*, ab Anglo-Saxonico
Gnat; Teuton. *Schnack*, culex, & si parvuli sunt, *Midges*, pariter ab
Anglo-Saxon. Mycge, Belg. *Mugge*. Muscarum minimum genus,
alvo fere jejuna, cruribus prælongis lingua fistulosa, & aculei
loco ad pungendum, & ad suctum; sanguinis avidissimum. Sunt
eorum varia genera, viz.

Culices Arboræi, qui generantur ex rore verno, salivari aliquando,
in multis arboribus, sambuco, fraxino, & aliis; item in vesiculis
ulmi. Huc spectant *Ficarii*, *Ψύλλæ*, ex caprificis geniti, indeque
figg-gnats nominati.

Palustres, vulgares, *Κύματα*, & *αἱ ἐμπύδις*, *muliones*, qui pri-
mum in humore putrido subsidente vivunt vermiculi; deinde, for-
ma immutata, foris vitam agere incipiunt. Mordendo vellicant
homines, maxime in paludibus: unde nostratibus *ferr-gnats* di-
cuntur.

Vinari, *Καίωμα*; Arist. culices minutissimi, qui ex vermiculis ca-
pillaribus, in face vini acescentis genitis originem trahunt: hinc-
que nomen fortiuntur, *wine-gnats*.

Melliones, quod melle saccharoque delectentur, *hony-gnats*.

Culices abigunt, conyzæ fumus: absinthii, gratiolæ, rutæ, ni-
gellæ decoctum aspersum; cannabis ramuli appensi.

Insectorum COLEOPTERORUM Classis.

AD Κολοπτερῶν, five Vaginipennium, i. e. sheath-winged, genus spectant.

1. LOCUSTÆ (quasi *locusta*, quod messes & alia quæ attingunt urant, morfu vero omnia erodant.) *Ακρίδαι* ὅτι τὸ ἀκραί τ' ἐσθίουσι καὶ τ' οὐρανὸν νέμονται, quod summitates segetum & plantarum depascantur) **Locusts**. Quarum diversæ species sunt, aliæ *vulgares*, cujuscumque sunt,

1. *Bruchus* (ὅτι δ' βρῦκαν,) à mordendo & devorando) **the field-Cricket**. Minor est locusta, nigri coloris, alis cinereis, sub quibus rubet.
2. *Attelabus* (ὅτι δ' ἀτλαν, quod tam minutis pennis conspiciatur, ut eis omnino carere credatur) **the small Locust**. Qui ubicunque exoritur, ibi omnia quasi in pollinem, five rubiginem conterit, atque absumit.
3. *Gryllus*, (à clamore acuto, qui *Gryllismus* appellatur.) **the Grasshopper** si campestris sit; & si domesticus, **the house-Cricket**. *Ἀγέρη Junii*, γρύλλος. Locustæ genus, Cicadæ simile. Sub oculis eminent *Cirri* bini, veluti capillamenta tenuia. *Pedes* seni, inter quos, posteriores longiores, extremis instar ferræ asperiusculis. Acuti duo *appendices* in cauda exeunt, longiusculi, hirti. Pennis superioribus subjacent *membranule* tenuissimæ; quæ, veluti promusculis quædam bifida, ultra *appendices* protenduntur. Hyeme ad hypocaustorum fornaces, & fumibulorum parietes habitant, stridore suo nocturno plus quam molesti, quamvis nonnullis admodum sit gratus eorum stridor, ut etiam somnum conciliare afferant. *Gryllus Campestris* corpulentior est domestico, at brevior, coloris nigri, picis instar splendentis: *Oculis* majusculis prominentibus, juxta quos *Cornicula* duo brevia; ad *Rostrum* vero supra & infra *appendiculæ* binæ, nodosæ. *Alæ*, fuliginiei coloris, fibris varie distinguuntur. *Pedes* seni, utrinque tres, veluti ferrati. In fine alvi superioris, sub alis extant *spicula* duo acuta, sub quibus alii *appendices* longiores, rigidiusculi, setæ instar, porriguntur, in extremitate bifidi. In campis, pratis, & aridis colliculis frequens. Aridam fodit terram, ut ejus cavernis cubet æstate.
4. *Gryllo-talpa*, **the Mole**, aut **sen-Cricket**. Insectum visu horrendum, quadruplo maximam superans Cantharidem, præcipue ætate si fuerit proveciori. *Gryllus* dicitur, quia eundem

dum cum Gryllo stridorem nocte appetente facit: & *Talpa*, quia terram continuo fodit.

Aliæ *rariores*, ut *Locusta*

1. *Italica*, *Mannis* dicta (vel quia suo adventu ver præfagit, ut *Anacreon* cecinit: vel famem prædicit, ut *Celius* annotavit: vel quia anteriores pedes, veluti manus, supplices semper tenet, atque elatas, vatum more, qui eo gestu orationes ad Deum fundere solebant; unde Gallis *Preque Dieu* dicitur) **the praying Locust**. Tam divina censetur bestiola, inquit *Rondeletius*, ut puero interroganti de via altero pede extento rectam monstret, atque raro vel nunquam fallat.
2. *Græca*, quæ magnitudine, & forma priori similis, alium tamen colorem ex naturæ locive dono accepit. Habet enim cornicula saturate lutea, hyacinthinum ocellum, alas ex luteo fatiscientes, corpus reliquum amethystinum.
3. *Africana*, è Barbaria *Mouffeto* allata, gracilis, quinque uncias longa, cucullata, capite pyramidali, è cuius pene vertice duo cornicula latiuscula, unciam fere longa se erigunt, galerumque illum Turcicum, biplumem, quali *Janisarii* utuntur, superbientem repræsentat.

II. SCARABÆUS (à Græco *Κάραβος*, addito:) *Κάρθαρος* (vel quasi *καθαρός* quod valde fit impurus & sordidus: vel *καρὸς* *καρδία*, qui asinus est, & *καρὸς* vel *καρδία*, quod est sperma, quia animalculum hoc è stercore asinino nascatur, & vivat; unde & *καρδία* appellat *Hippocr.*) **the Beetle**, (forte ab Anglo-Saxon. *Bizel*, à verbero, *to beat*; quia Scarabæi vespera præ cæcitate involantes facies nostras percutiunt instar mallei) **or Bugg**. Insecti genus, teneras habens pennas, ob id crusta superveniente rectas. Plinius, Scarabæi nomine, omne genus Insectorum completi videtur, quod crusta tegitur, quod vaginipenne est. Scarabæi sunt *Hermaphroditi*. Horum variæ sunt *species*, viz.

Canthari majores Cornuti, quales sunt

1. *Κάραβος*, *Scarabeus* est omnium maximus, terrestris, longitudine 5 vel 6 digitorum. *Caput* quadratum cum *thorace* obscure rubent, ut & *venter* inferior. *Alarum* vaginæ castanei sunt coloris. *Cornua* gerit pulcre rubentia, instar vitri splendentia, ramosa, dentata. *Oculi* ad latera prominent bini, ex fusco rubei. Inter quos & *Cornua*, ad latera exeunt duo parva *Cornicula*, veluti antennæ. *Rostellum* acutum, promuscide, flaventi lanugine hirta, donatur; ad quod appendiculæ utrinque binæ.

M

Pedibus

Pedibus incedit senis, cum splendore nigricantibus, quorum extrema genicula instar ferræ aspera videntur, apiculis extremis, instar hamuli aduncis. *Cornua* in cacumine comprimit, ut *Cancris* suas chelas. Abscisso capite, seorsum caput, & seorsum corpus, utrumque vivit; caput tamen diutius. *Cornua* Infantibus, remedii vice, ex collo suspenduntur, ad eorum urinam cohibendam.

2. *Cervus volans*, *πλανήτης*, ab amplitudine cornuum, quibus ceruam æmulatur exactissime: *the Stag-fly*. Animalculum nostris sylvis hand ignotum, nec adeo rarum, ut descriptione indigeat.
3. *Capricornus*, *Αιγώνης*, *the Goat Chaser*, forte ab Anglo-Saxonico *Cæsen*, Belg. *Heber*: apud nos quoque sat familiaris.
4. *Taurus volans*, *Βένης*, *the Bull Chaser*: cujus bina genera describit *Marcgravius*, in *Hist. rer. natur. Brasil. lib. 7. cap. 2.* ubi etiam graphice exemplatus videatur
5. *Rhinoceros*, *the Horn-nosed Chaser*, his terris rarissime ostensus, nisi exotica inter huc delatus.
6. *Scarabæus Bufenius*, *μελαχρόνι, χρυσογύρατος*, *Galeraca*, *Scarabæus viridis* Aldrovand: item *Smaragdus*, *Viridulus*; *the Green Chaser*. Est majusculus, in acutum desinens, coloris obscure virentis. *Capitulum* parvum nigricat, instar cucurbitulae rotundum. *Oculi* ad latera prominent nigricantes; ante quos *cornicula* duo nodosa enascuntur. *Appendicula* item 4. juxta os, ex duobus denticulis acutis introsum se curvantibus confectum. *Pectus* quadratum fere, instar auri rutilat. *Ala* à thorace ad extremum, lineis longis elevatis, inter quas notæ longiusculæ, insigniuntur. *Pedes* habet sex, posteriores longissimos in extremo serratos. *Prona* pars, ut *Pissasphaltum*, splendet, nigricantis coloris. Occurrit in locis, ubi *Bufones* frequentes sunt, quibuscum coire vulgus opinatur. Venenosa prorsus naturæ est.

Non Cornuti, ut

1. *Proscarabæus*, five *Anticantharus* (à *Mouffeto* sic dictus, quia, contra *Scarabæorum* morem, sexu distinguuntur) item *Scarabæus Unctuosus* (quia pinguisculus est, & pingui fudore asfatim extillat) *Χαπόδης*, *the Dyl-beetle*, aut *Dyl-dock*. *Cantharus* est crassius, oblongior, mollis; corpore ex obliquo cæruleo splendido. *Caput* ei rotundum fere: juxta oculos *antennae* porriguntur, continuis internodiis distinctæ. *Isthmo* gracili *venter* oblongior, in acutum desinens, & *incisuris* resectus, annectitur. *Ala* integunt splendida, convexa. *Pedes* seni, extremitatibus bifidis sed trifurcis. *Majore* & *junio* passim in

in sylvis, & secus vias obrepit. Cum in manus sumitur, eas pingui liquore inficit, & subflavo; unde nomen.

2. *Pilularius* (quia ingentes stercoris *pilas* averfis pedibus volutat) *Stercararius*, *Fimarius*. (quod ex *fimo* nasci credatur, & in eo ova reponat) *αλιγορδωρ*. *Aegyptiorum* (qui hunc summopere venerantur, animatam Solis effigiem esse putantes; teste *Clem. Alexandr. Strom. l. 5.*) *παραμύς* *Hippocr. the Dung-beetle*, aut *Sphurn-bugg*. Corpus est ei compactum, latum, ex caeruleo nigrore splendescens. Corpus planum inferius, & superius nonnihil arcuatum, multis *eminentiis* conspicuis, è quo ab utraque parte duæ prominent *antennæ* breviusculæ, sed in fine in plurima tenuia filamenta divisæ. *Pedes* antèrius sunt ferrati in fine.
3. *Rutilus major*, seu *Saligneus*, qui *Pilulario* fere est similis, sed corpore longiore, & colore rubente, capite alias nigro, alias rubro. Maio in salicibus, betula, & quercu frequens, quarum folia tenella sæpe tota arrodit & absumit.
4. *Rutilus minor* priori forma similis, sed multo minor, & Junio frequens. Rosas, & tenella arborum folia arrodit. *Sturnorum*, & aliarum avium cibus.
5. *Scarabæolus cadaverum*. Insectum minutissimum, vaginipenne, nigrum, per dorsum *linea alba* transversim insignitum; in cadaveribus exsiccatis, vel carnibus suffumigatis inveteratis nascens. Quod, si tangatur digito, aut alia re, pulicis instar subfilit.
6. *Scarabæoli pistrinarii*, *μυλάρι*, *μυλαριδάς*, *μυλάριαι*, *Hesych.* *Σίλφω ἀπὸ πύστρινος* *Dioscor.* Sunt longiusculi, corniculis tenuissimis, pediculis senis, totis nigris, excepta parte prona, quæ ex obscuro rubescit. Gignuntur ex farina humida, qua conspersa interdum toti albicant. In *Moletrinis* & *pistrinis* frequentes.
7. *Arbori*, *Δορὶς* (fortasse ab Anglo-Saxon. *Dopa*, *fucus*, quasi dicas fucum ignavum & aculei expertum) or *Hedge-chafers*: vel pueris bene noti.
8. *Maculati*, *Lady Toms*; & *Falla*, cujus scapulæ & elytra albis nigrisque maculis variegantur pulcherrime: de quibus vide sis *Mouffetum*, cap. 22.

III. PYROGONUS (quia in igne generari vulgo traditur) *the fire-fly*, aut *Spalamander-fly*. Forma nonnihil *Culicem* refert maximum, colore flammeo, splendente; radiis quibusdam pyriticis illuminatus; in flamma salit, ambulat, volitat & vivit; si credimus *Aristoteli*, l. 5. *hist. an. c. 19*.

IV. CANTHARIS *Dioscorid.* vulgo nostro *Spanish fly*; & (à vi-

& (à virore) **Green fly**. Insectum est Coleopteron, oblongius, ex aureo fulgore virescens, quod frumenta arrodit. Nascuntur ex *vermiculis* crucis similibus; qui proveniunt ex humore foliis fraxini, populi, tritici inhærente. Et quamvis coeant & generent, non tamen sui generis animal, sed vermiculos procreant. Probantur in usus medicos *versicolores*, & quæ luteas in alis transversas lineas habent, corpore promisso, crassæ, ac blattarum more pingues, recentes. Inutiles ac inertes, quæ unius coloris sunt, & virescentes, judicantur: nam facile cariem sentiunt. Enecantur per linteolum vapore aceti, & reponuntur ad usum. *Ureticis* à quibusdam miscentur, & quæ lepras, ferasque lichenas, & carcinomata sanant. Earum varix sunt *species*, quæ tamen omnes reducuntur ad *Majores*, & *Minores*.

V. BUPRESTES, (ὡς τὸ ἀρῆσαι τὰς βύς, quod *boves rumpat*: primo enim, per summam veneni acrimoniam, intestina illorum inflammantur; mox tumor, febris, & tympanites ingruunt; tandem, membranarum distensione ruptis, crepunt pecudes mediæ) **the Burs-cow**, **Burn-cow**, aut **Blain-worm**. Ex Cantharidum genere, καὶ τὴν ἰδίαν καὶ διῶκεται, videtur; sed oblongiore corpore. *Elytrum* exterius ex viridi flavescit, vel potius aurum imitatur. Longiora item *crura* habet, & crassiuscula. *Oculi* globosi, prominentes. Ex fronte juxta oculos, duo *Cornus* oblonga, articulata gerit. *Caput* parvum; *Os* patulum, durum, robustum, forcipatum, dentatum, quo crudeliter vulnerat & mordet. *Venter* non rotundus, sed in longum productus. Acriter cum Scarabæis & Lacertis pugnat. Plura de hac peste scias licet è *Mouffeto*, qui varias ejus viderat species. Idem Buprestis nomen competit quoque *Araneola* cuidam ruberrimæ, quæ à bove devorata, eadem fere cum hac bestiola venenosa, inferre dicitur symptomata.

VI. IPS *Plin.* Involvulus *Plaut.* volucra *Columelle*, nostratibus **the wine-fly**. 74 dicitur ab ἰπῖω, i. e. βλάπῳ, *noceo*; quia proprium ejus est, in *vitibus* versari, earumque gemmantia germina arrodere.

VII. CUCUJUS, Κεφαλολάμψις, i. est. capite lucens, **the Indian Glow-fly**. Cujus & descriptionem sane admirandum legere licet, & iconem contemplari, apud *Mouffetum*, in *theatr. Insector. l. 1. cap. 15*.

VIII. CICINDELA (à præverbio *cis*, & *candeo*, quod tum candidum, tum ignitum esse significat; ut à sequor, sequela, à candeo, candelæ.) *Noctiluca* (quasi noctu lucens) λαμπούς, πυρολάμψις, *Luci clunis* (à caudæ fulgore, *Nitedula*, *lucio*, *lucula*, *Flammides*, *luciola* Italix, *Incendula*, **the Glow-worm**. Insectum est pennatum, ex Scarabæorum genere *capitulo* parvo nigerrimo, in duo *tubercula* dispartito

dispartito. *Alvus* annulosa, multis segmentis divisa, in cujus medio *guttule* duæ candidæ, noctu ignis modo lucentes. Non desunt ex hodiernis *Entomographis*, qui confidenter sibi compertum esse affirmant, non *Alatas* Cicindelas ab *Alatis* non specie, sed sexu tantum discrepare: hasque mares, illas vero feminas esse. Et curiosissimus Insectorum indagator, D. *Joh. Ray*, conterraneus noster, in *Peregrinat. suarum hist. p. 409.* ex *Fabio Columna* refert, *Caralum* quendam *Vincentium*, *Palermi* in *Sicilia* civem, ubi multas Cicindelas alis carentes aliquandiu in vitro incarceratas, ut curiositati suæ gratificaretur, conservasset, unam ex alatis deinde ad eas admisisse: statimque vidisse marem istum cum feminis omnibus successive, *Papilionum* ex *Bombycibus* oriundarum more, coitum celebrare, easque adeo imprægnare, ut postera luce, ova excluderent. Sunt etiam, qui tardè quæ credita decipiant credere soliti, certo sibi constare astruant, ignes illos *fatuos* hæcenus pro *Meteoris ignitis* habitos, revera aliud nil esse præterquam harum *Noctilucarum* in aere ludentium *examina*, veluti conglobatim horum illorumque volitantia. Quod si verum est, non erit quod Philosophi ingenia sua hoc Phænomeno ultra torqueant, anxie disquirentes, unde hujusmodi nocturnæ faces accendantur; quæ alimenta flammæ in tanto circumfusi aeris odore; quis ille denique error, quo nunc altius, nunc demissus, interdum secundo, mox adverso vento ferantur.

IX. BLATTA (quasi *blatta*, à πλάττω, à nocendo; quia libros & vestes erodit) *Σίλην, μολάνη*; the *Woth-fly*, aut *Cock-roch*, produced out of the *Meal-worm*. Insectum est lacifugum *Scarabæolo* haud multum dissimile, sed elytro carens. Hujus species censentur

1. *Blatta mollis*, proprio *Σίλην μολάνη*; the great and soft *Woth-fly*.
2. *Molendinaria*, *Fruventacea*, *Σιτοφάγος*, the *Miller* (because alwates whited with a delicate down, as *Millers* are with *Meal*) in pistrinis frequens.
3. *Carnivora*, quæ frumentaceis sunt similes annulosis quidem incisuris, sed multo breviores & tenuiores. *Pedibus* incedunt totidem. Anteriore facie crassiores sunt, quæ deinde sensim gracilescentes, in acutum desinunt. In carnibus nascuntur salis inveteratis, primo *vermes* albi, dein toti *hirsuti* evadunt, *annulis* alternatim rubentibus & flavescentibus. *Venter* semper albicat. Tam exacte ab ossibus carnes denticulis suis auferunt, ac si novacula rasæ essent. *Schwenckfeld*.
4. *Fetida*, *Σίλην* foetens, *Σπορδύλη* *Nomm.* the stinking *Woth*. Insectum odore invisum, acuta clune, cimum modo putidum, coloris fusci, pedibus & antennis plus rubentibus. In

N

aggeri-

aggeribus & apricis inveniuntur; nonnunquam vero in cellis vinariis.

5. *Byzantia*, quarum è succo (est enim purpuræ species) *purpurens* color elicitur, perinde ac ex Cimicibus (*Coccinioli* vocatis) vermiculatum, **the scarlet Moth**.
6. *Peruanae*, quas Peru incolæ *Araners* vocant, & *Lerius* Papiliones credit, *lib. navigat*. Gryllorum magnitudine, & gregatim noctu prodeunt, omnem ferme mollem supellectilem ambedentes.

X. FORFICULA, (à forcipe in cauda) *Auricularia* (quia in aures hominis irrepere solet,) *vellicula* (à vellicando,) *Forbicina*, Aldrovand. *vermis auricularis*, **the Ear-wig**, & *Borealis* nostris, obscæno nomine, **Witch-balloch**. Vermis est oblongus, compressus, lævis, coloris spadicei, cujus cauda in bifidum mucronem exit: juxta oculos protuberantes antennæ, tanquam exploratoria fila, enascuntur. Sub lignis & arborum corticibus stabulatur. Arbores perrepat, & pyra pomaque arrodit. Aures hominum facile incurere solet: ubi enecatur spiritu vini, oleo juniperi, amygdalarum amararum.

XI. SCORPIO *alatus*, *μαλίζωρος*, (à melleo seu flammeo colore) **Scorpion-fly**. Summæ caudæ niger nodus est, duplici præditus *aculeo*, quo crudeliter vulnerat, venenum simul infundens calidissimum. *Alæ* locustæ Maraci similes. Reperiuntur in *India* apud *Prasios*, in *Ægypto*, *Palimbroti*, & alibi. Intra *Siculi* cæli regionem non vivunt: in *Italia* sunt innocui. Lacertas, araneos, & omne genus serpentum enecant. Suo vulnere applicati medentur.

XII. FORMICÆ *alata*, *ἰππομύρμυξ* Aristot. **Horse-Emets**, aut **flying-Ants**: omnibus satis cognitæ.

XIII. PEDICULI *alati*, **flying-Lice**, *Acridophagis* infesti; de quibus consule *Hieron. Mercurial. de morb. cutan.*

XIV. ORIPÆ, ex nive jam veterascente nascentes, **Snow-flies**: de quibus fuscè Aldrovand. 6. de *Insect. cap. 9.* & Thom. Bartholin. de *Nivis usu, cap. 9.*

Insectorum non-Alatorum SEPEDUM Classis.

INSECTA APTERA, five *Non-Alata*, sunt vel *Pedata*, vel *Apo-da*: & PEDATA rursum vel *Sepeda*, i. e. Sex pedes habentia, vel *plurium pedum*.

E SEPEDUM (*six-footed Insects*) censu sunt

I. FORMICA (vel à *forandis micis*, vel quod *ferat micas* farris; ut *Virgil. 4. Æneid.*

*Ac veluti ingentem formicæ farris acervum
Cum populant, &c.*

vel forte à Græco *μύρμηξ*; modum explicante *Caninio*, qui docet, *Æoles*, quos Romani inprimis imitantur, pro *μύρμηξ* dicere *βύρμηξ*, atque obliquo *βύρμηξα*, solitos esse, *μ* in *β* mutato. Quod etymon summopere arrisit *Vossio* the *ψιμίρε* (quali dicas, quæ in *luto mingit*, vel à Belg. *Puyd* suggestum, tumulus, & *Diere*, Danic. *Dyre*; quia sc. tumulos pulveris ubique egerunt formicæ) *Ant* aut *Emmet*. Animalculum est parvum, fugax, laboriosum, nulli imperio subditum; corpusculo gracili longiusculo; cujus capitulo antennæ, ceu exploratoria filamenta, prætenduntur. *Ocelli* ad latera nigri, tantæ subtilitatis, ut visum nostrum fere effugiant. *Denticuli* bini, introrsum adunci, forficulam veluti, qua cibum apprehendit, constituunt. *Pedunculi* ex pectusculo nascuntur seni. *Venter* adjungitur crassior. Omnis generis succos appetunt, quos partim in plantis quærunt, partim ex fructibus exugunt. Mel mire appetunt, unde apibus insidiantur. Eadem semita semper ambulant. Luna plena laborant; interlunio quiescunt. Formicarum Respublica non videtur ad Monarchiam, sicut apum, pertinere; sed ad eas quæ populariter administrantur, & quarum gubernatio Democratica aut Aristocratica nuncupatur. Nullus enim illis Rex, nullus Præses, omnes ex æquo cives, pro opportunitate temporum, aut præesse, aut subesse solent, servatis Institutionis suæ Reipublicæ ordinibus: attamen omnes, ut veri Cives solent, omnia ad communem utilitatem agunt, maxima solertia.

Harum variæ constituuntur *Differentiæ*. Nam ratione *Quantitatis*, aliæ sunt *Magnæ*, quales in Novo orbe reperiuntur, (apud Bragmanas palmaris esse longitudinis, scribit *Scaliger*, *Exercit.* 367. & in nova Hispania Scarabæos æquant:) qualesque sunt etiam apud nos Formicæ majores *Herculaneæ* *ἡρώδης*, *Horsen-*

metæ, quibus isthmus exiguus, longiusculus, gracilis, utrinque extremitatibus crassiusculus: aliæ *Parvæ*. Ratione *Loci*, aliæ *Indicæ*, *Brasilienfes*, *Philippinæ*, *Aquilonares*, &c. Ratione *Effectus*, aliæ sunt *innoxiæ*, aliæ *venenatæ*, quales *Lacertas* vocat *Telephus Cretenfis*. Ratione *Coloris*, aliæ sunt *albæ*, aliæ *nigræ*, aliæ *rubræ*, &c. Ad hæc aliæ *impenes* aliæ *pennatæ*.

II. **CIMEX** (à *καίμα* cubo; quod in cubilibus nascatur,) *Κόες*, (à *Cori* herba, quam Latini *Cimicariam* vocant:) recentioribus *Κόεξα*, Gallis *Punaise*; **the wall-Louse**.

III. **PEDICULUS** (à *pedibus* nomen est.) **the Louse**. Cujus non una species est. Qui *Homines* infestant, sunt vel *Manfucti*, **Common-Lice**; vel *Feri*, *Morpiones*, **Crab-Lice**. Græce *φθῆρες*, ἀπὸ τοῦ φθῆραι ob humorum corruptione: & *Εγχαρες* Eustath. qui in capite generantur: *φθῆρες ἀγχοί*, *feri*, intestinales, qui lati sunt, in pectine, axillis, palpebris, barba pronati. Ubi permanent infixi, atque à cute non facile detrahuntur; duriores communibus, & vehementer moribus sæviunt. *Obambulatorii* gignuntur in vestimentis. Ex pellibus, ab ovibus mortuis, aut à Lupo occisis vestes factæ facile pediculos procreant. Eorum ova, *Lendes*, *Κόνιδες*, **Pittæ**, capillitio pertinacissime inhaerent. Qui *Brutis* infesti sunt, vel *Leonis*, vel *Equi*, vel *Bovis*, *Canis*, *Porci*, *Cervi*, *Capri*, *Avium*, *Afini*, *Salmonis* in specie dicuntur. Sunt & *Plantis* quibusdam peculiare. *Cyrones*, *Scirrones*, *acari*, *pedicelli*, *pelliceli*, *placulæ*, **Hand-worms**, **wheat-worms**. Omnium Insectorum minimum. Nunquam erumpunt extra, sed semper intra cutem & cuticulam latitant, & rodunt. Cuniculos agunt in pruriginosis manibus.

IV. **RICINUS**, *κρύων* (forte quia *Ricini* plantæ semina æmulantur; licet aliis videatur, potius Ricinum fruticem, vulgo *Palnam Christi*, ab hoc animalculo nomen sortiri; cujus grana illis similia sunt) **the wood-Teck**, aut **doggs-Teck**, aut **Tik** (forte à Belgic. **Teecke** Franco-Gallic. *Tic, Tique*) Aristot. *Κυνόπανος* (quod canes mordendo lancinat) Cæsar. Scaliger. *Lancinista*. Animalculum est lividum, & foedum, bobus, suibus, capris, verris, canibus intestissimum, æstivo tempore aculeo totoque capite infixio adhæret, nec prius decedit, quam sanguine saturatus. Oritur ex animalis excrementis, non è suo genere. Nam ubi Ricinus sanguine satur est, quod exitum non habeat, rumpendo moritur, & nihil procreat. Venatoribus observatum est, quod canes cum domo egrederentur, prorsus ricinis carerent; redeuntes vero ex agris, ubi frequentior, spissior & altior filix erat, iis infesti essent.

V. **REDUVIUS**, **the Sheeps-Teck**. In vellere detento integrum annum vivit, & ova rubra deponit.

VI. **P U-**

VI. PULEX, (quod ex *pulvere* generari creditur : vel rectius à *pulo* seu *pullo* colore. Veteres enim non geminabant consonas : vel, ut *Vossio* magis placuit, & *μυλῶντις*, ab *Αἰλικο* *ομίλῳ* pro *ψίλλῳ*, quod idem significat) *a* *fflea*. Forte à verbo, *to fly*; quia adeo celeriter saltat, ut volare videatur. Alitur vivo humore, & multiplicatur per ovationem. Cujus Iconem, à doctiss. *D. Hooke*, Vitri Microscopici ope eleganter depictam videas, in ejus *Micrographia*. Hujus generis sunt

Pulicellus, *Nigua*, in India Occidentali frequens.

Pulex terrestris, vulgari similis. Vere primo brassicas tenellas arrodit, aliaque terræ nascentia depopulatur. Hortulanis invisus. Enecatur calce, cineribus, absinthii decocto, &c.

Pulex aquaticus, Insectum palustre nigrum, pulice paulo majus, supra aquas, præcipue stantes, velocissimo motu cietur. Degunt gregatim, invicem colludentes.

VII. FORBICINA (quod caudam habeat bifurcatam) quæ eadem est cum Forficula, *the Ear-wig*.

VIII. TALPA *Ferrantis Imperati* (quod Talpæ more pedibus anterioribus, ceu manibus terram effodiat.) Cujus descriptionem tradit *Johnstonus de Insect. lib. 2. cap. 1. art. 6. & Casp. Schenckfeld Theriotroph. Silesia p. 528*. Insectum est oviparum, ex Gryllorum genere, longitudine & crassitie auricularis digiti. Anteriore facie Astacum fluviatilem, posteriore parte, ventre nimirum, Gryllum refert. Caput enim, & thorax testaceo cortice investiuntur, ut Astaci, ex fusco rubente. Oculi nigerrimi utrinque eminent, instar piscis splendentis. Sub his cornicula duo oblonga, tenuia, ceu exploratoria filamenta. Dorsum vestiunt ale quaternæ: superiores breves & latæ, striis subrubris marmoratæ, aliis angustis longioribus, & ad caudam fere extensis incumbentes. Crura in utroque latere terna, duriuscula, articulis divisa. Nidum in terra construit, ovaque subflava parit. Admodum vocalis est, præsertim nocturno tempore.

IX. SPONDYLIS, *Σπονδυλῖς* Aristot. Verticillus, Convolvulus, (quia se conglomerat) *the Andever*, & *whirl-worm* five *whirl-worm*. Vermis est oblongus, digitum crassus, ex Erucarum genere, capitulo rubente, reliquo corpore subflavente, pediculis minutissimis antrorsum utrinque ternis. Si tangatur bacillo, in verticilli formam convolvitur. Pestis hortorum. In terra, circa plantarum radices latet, quas aliquando totas arrodendo absumit. Piscatores ad inescandos pisces uruntur.

X. STAPHYLINUS, venenata bestiola; sphondylo haud ab- similis, sed elevata cauda semper gradiens, Gallis *Courtilles* dicta, apud nostrates vero innominata.

XI. ANTHRENUS, pennistantum à Crabrone differens, *the wing-*

wingless-Dorset. Morsum ore infert ægre curabilem, non ita tamen lethalem, ut Phalangium videatur.

XII. **ASELLUS** *arvensis Mouffeti*, the *field-sow*, aut *Tyler's-Lowse*.

XIII. **TINEA** *vestivora* (quod teneat vestimenta, & eo usque infideat, quo erodat: seu potius ob similitudinem qualemcunque ita vocatur à Lumbrici genere, quod Græcis *τρυία*, the *Woth*. Quæ est vel vulgaris, the *common-Woth*: vel quasi argento illita, the *silver-Woth*. Dicitur etiam *Blatta non-alata*, quam vere Reverendus ille vir, & curiosissimus rerum naturalium indagator, *D. Joh. Wilkins*, olim studiis meis juvenilibus in Academia Oxoniensi præpositus, dein Episcopus Cestriensis, nunc vero in Beatorum consortium exceptus, nostro idiomate *Cockroach* reddidit, in *Tabul. de Animal. ex ang.* Vermiculus est albicans, minutus, vestes, chartas, &c. erodens. Generatur ex putredine innata, vel ex rore aereo, aut Papilionis excrementis, potissimum in laneis vestimentis: Tineas abigunt amara & odorifera. Libri præcaventur, si aqua aluminosa, aut nitri, abluti exsiccentur.

Insectorum non Alatorum OCTOPEDUM Classis.

A Pteron OCTOPEDUM classem complent.

I. **SCORPIO.** *Σκorpion*. (vel *ὄφας ὁ σκorpionίζων θιον*, quod venenum jaculetur: vel *ὄφας ὁ σκαυῶν ἵππων*, quod flexuose serpat.) Ciceroni & aliis *Hepa*, Pandectario *Satocollos*, the *Scorpion*.

II. **ARANEUS** (vel ab *ἀράχνη*, omisso *χ*, quomodo à *χλαίνα*, est lana) vel *ὄφας ὁ ἀραυῶν ἵχνη ἵχαν*, quod tenuia habet fila,) the *Spider* (quasi dicas *Spinder* vel *spinner*, à verbo *to spin*. Crustulis incedit ut plurimum octonis, quibus omnibus intermodia terna. Cum coire volunt, fœmina deductam araneam trahit, mas eandem mutuo trahit: quod ubi sæpius fecerint, coeunt, & aversis clunibus copulantur: quæ modus iis propter alvam orbiculatam convenit. Horum non una species est. Generatim vero distinguuntur in *Noxios* seu *Phalangia*, inter quos præcipuum locum obtinet *Tarantula*; & *Innoxios*, qui subdividuntur in *Domesticos*, & *Subdiales*, & utrique rursus in *Retiarios*, *Telarios*, & *Varios*. De variis *Exoticorum* generibus seligendi sunt *Marcgravius de Insect. Brasil. lib. 7. c. 3.* & *Nierembergius Hist. Exotic. l. 13. c. 28.* Araneæ *λαγασσάται* agilissimæ, succinctissimæ, *ὀφθαλμοὶ* sunt *πυκνότεροι*

χινώπροι τῶν ἄλλων, ingeniosiores in vitæ functionibus. Mares aranei similes Flandris sunt, qui otiose degunt, mulieres negotia exercent. ut *Scalig. in Arist. hist. Animal. pag. 1104.*

Omnibus Arañeis illud *proprium* est, quod ova sua, tanquam in sportula, ex telis suis constructa, secum gestent & foveant: ut primus notavisse videtur oculatissimus ille naturæ indagator *Harvæus, de generat. Animal. Exercit. 3.*

Aranci, non ictu, sed *morsu* venenum ejaculantur. Deprehenditur mox stupor in demorsa parte, refrigeratione extremorum, & alvi flatibus. Corpus insuper universum obstupescit (si ex improvviso devorati sint in cibo) & instar Anasarcæ intumescit. Color item brevi depravatur, & omnes actiones hebescent. Antidotis veneni vis infringenda, & reliquæ sudoribus discutiendæ. Vulnus quamprimum abluatur aceto, quam valentissime. Theriaca, seu cepa, & allia trita imponantur: consulente *Schwenckfeld.*

Insectorum DUODECIM & QUATUORDECIM

Pedum Classis.

E Censu *duodecim* & *quatuordecim* Pedum Insectorum sunt
I. ERUCÆ (vel ab *erodendo*, quod erodant olera & pampinos: vel ab *hærendo*, ut *Apuleio* placet, quod pertinaciter adhærescant: vel quia olea *ῥῥῖν*, hoc est, scindit: vel à *rugis*, quia reptantes se corrugant & erugant,) *Κάμπαι* (ab undoso & arcuato gressu,) **Caterpillars**, & si glabræ sunt, **Canther worms**. Franco-Gallis *Chatte-pilleuse* (ab hirsutie, quasi dicas, *Felis pilosus*) dicitur: *Βρύχ*. *Scalig. ῥῥῖν* *Athen.* Vermis est vulgaris notitiæ, longus, mollis, multis constans pedibus, flexo corpore obliquis tractibus repens, colore varius. Erucæ *orientur* vel ex stirpium excrementis, aeris nempe humidioris constitutione, ac putredine tepida, vel à Papilionum ovis.

Distinguuntur à *Mouffeto* in *Ετερογαστῆς*, sive Affines, à Papilionibus & Aureliis *fatas*: & *Αυτογαστῆς*, sua ex tribu profectas. Utræque rursus sunt vel

GLABRÆ, ut

Bombyces, Seres, Silk worms.

Virides,

Flavæ,

O 2

Vinule,

Vinula, quæ elegantes sunt, Tiliæ floribus infidentes.
Fusca, &
Varia.

HIRSUTÆ, five *Pilosæ* (omnium maxime maleficæ,) eæque vel
densius, vel *rarius pilosæ*.

Prioris ordinis sunt

1. *Pytiocampes*, i. e. pinææ, piceæve Erucae quia in ramulis pini & piceæ supremis nidificant, ubi gregales vivunt.
2. *Ambulones*, (ab erratica vita) **Palmer worms**, & (ab hirsutie) **Bear worms**.
3. *Corylaria*, (quia *Coryli* foliis infident) quarum duæ species ponuntur, altera saturate, altera pallidius viridis est.
4. *Polymia*, (quia licet faciem habeant *Æthiopis*, veste tamen vario artificio fulgente insigniuntur.
5. *Neustria*, è Normannia delatæ *Mouffeto*.
6. *Mesoleuca*, **the half-white Caterpillar**.
7. *Urticaria*, (quia urticæ in morem leviori attacku vulnerat) **the Nettle worm**, aut **stinging Caterpillar**.
8. *Brassicaria*, (quia in *Brassica* ortum adipiscitur) **the Cabbage worm**.
9. *Sepiaria*, (quia sepes populatur) **the Hedge Caterpillar**.

Posterioris

1. *Geraniivora*, Eruca grandis, Geranio palustri potissimum infesta.
2. *Jacobæa*, five senecionem depasceus.
3. *Echini*, (quia hirsutie pilorum referunt Echinum) **Urchin worms**.
4. *Rubicola*, quæ pilos rariores gerit, eosque plane nigros; **the Briar worm**.
5. *Cerastes*, cujus cornu crenatum rubescit, **the horned Caterpillar**.
6. *Erucaraneus* Aldrovandi, **the spinning Caterpillar**. Cum innumeris pene aliis; quia quælibet ferme herba peculiarem alit Erucam sui vastatricem.

Inf-

Insectorum MULTIPEDUM in Classe ponuntur.

I. **A**SELLUS, (à colore asinino) ὄνιον. Galeni, ὄνιον. Diosca-
rid. πλοῖ Plinii, Κύαμ. etiam (seu à forma fabæ, cui si-
milis est dum se in globum contrahit : seu quod è fabarum follicu-
lis & culmis prodire solet) Latinis *Millipes*, *Multipes*, *Centipes*,
Porcellio: Angl. *the Tyleys Lowse* (quia sub tegulis interdum
nidulatur) item *Wood-Lowse*, aut *soy*. Bestiola est è vermibus
terræ, subcinereicoloris, multis pedibus arcuatim repens : ad con-
tactum se in orbem vertit. Tenuium est partium, digerit, exte-
nuat, abstergit, aperit. Ex vino potus calculo renum, urinæ diffi-
cultati, & Regio morbo medetur. Cum melle Anginis utiliter illi-
nitur. Tritus, & in cortice Punici mali calefactus, doloribus aurium,
addito rosaceo, convenienter instillatur. Panno lineo involutus,
in vino albo maceratur : colatura potui datur Asthmaticis ; dictu
mirum, quam cito saturatos pulmones depleat. *Schwenckfeld*. Fere
eadem etiam tradit *Dioscorides*.

II. **SCOLOPENDRA** (quod σκίλον, *aculeum* habeat in *idea*,
cauda) *Porcus lutesus*, *Nicandro ἀμφιγῆς*, *biceps* (quod pari fa-
cilitate prorsum capite, retrorsumque ducente cauda incedat) *the*
scolopendra, aut *many-footed Worm*. Vermiculus est longius-
culus, planus, gracilis, trium aut 4. digitorum longitudine, coloris
sublutei, pedibus innumeris utrinque refertus, & antennis binis
longiusculis, caudaque bifida ornatus. Contactus se contrahit.
Invenitur in truncis arborum, aut in lignis supra terram locatis, aut
palis terræ infixis. Ad morsum puncturamve ejus locus undique li-
vescit, putrescit, & vini rubri facibus similis videtur.

III. **JULUS**, (à nucum juglandium, atque avellanarum veluti
candis, quarum villi callo compacti infixi, Julos hos repræsentant,) *the*
Gally-worm; *because the Legs on each side resemble the*
Dags of a Gally. Horum alii sunt *Glabri*, alii *Hirsuti*. Omnes
vero tactu se in gyrum colligunt & convolvunt. *τελ. πολύπους*,
μυερίπυς, *Multipes*, *Eruca hirsuta villosa*, *Centipeda hirsuta*. Vermis
est terræ longus, ex annulis multis compactus, pilosus, multi pedi-
bus arcuatim repens. Si contrectetur, in globum complicatur. In
multas partes divisus, omnes vivunt. In hortis oleraceis quando-
que occurrit. *Ictericæ*, & *urine difficultati* confert, ex vino potus.

Vermium HEXAPODUM Classis.

INter TERRESTRIA Insecta restant adhuc vermes HEXAPODES, *vis.*

I. ARBOREI, cujus ordinis censentur

Ligniperdes, ξυλόφθοροι, quorum multi cernuntur. Nam qui in virentibus adhuc arborum Truncis innascuntur, δῆκας (ἀπὸ τοῦ δάκναι, à mordendo) nominantur. Qui in aridis & exsuccis lignis, ἐν ξύλῳ. Qui in solidis & ficcis, δειπας. Qui in cæsa materia, *Coss*, *Timber-worms*. (Cossus est vermis multiples, digitalis longitudinis, crassus, albus, Erucæ fere similis: linea à dorso ad caudam usque conspicuus, plurimis incisuris constans. Os nigrum, ex duobus velut introrsum se curvantibus confectum. Ad latera punctis maculatur castaneis. In cariosis lignorum caudicibus nascitur, & farina seu carie saginatur, cui involvitur.) Qui in *Navium* tabulis, proprie *Teredines*; sic enim *Ovidius* (*i. de Ponto*)

Estur ut occulta ꝑꝑitiata Tereðine navis.

(*Teredo*, τερηδὼν, à terendo, est vermiculus candidus & minutus, ligna erodens, & corrumpens: cujus dentes sentiunt omnes fere arbores, præter *Larycem*, *Euonymum* & *Xylosteum*. *Farina* seu caries, ulceribus humidis & fluidis utiliter inspergitur: sine morfu exiccans.) Qui in *Ficis*, *Cerastes* vocantur. Qui in *Esulo*, *Galbi*. Qui in *Platano*, *Carabi*. Qui in *Quercus* radicibus, *Rauci*. Qui in *Corticibus*, *Corticarii*. Qui folia arborum & flores depascuntur, *Syrones*. Qui tam in lignis, cortice, folio, floreque & fructibus arborum; quam in caseo, cera, &c. generantur, *Acari* nominantur, *Mites*. Qui in ipsa aridi ligni medulla generantur, *Termites*, vulgo *Death-watches*. Vermis *Vitivorus*, the *Devils gold Ring*; sic *Higginio* dictus, forte à colore aureo, forma annulari, & pernicie quam arrodendo vitibus affert. *Blatta* *Tinea*, *Book-worm*.

II. FRUTICARII, qui salicem, ilicem, juniperum, cynosbatum, & alias frutices infestant: *Shrub-worms*.

III. LEGUMINARII, qui legumina exedunt.

IV. FRUMENTARII, qui frumenta depascuntur, & in genere ψώμικας nominantur: in specie vero, qui integro & mola nondum confracto frumento vescuntur, *Curculiones* (per ἀρτίστων, quia nihil pene aliud in iis quam gula videatur) *Bowds*, *Wibels*, & *Wibels*: & qui amylo vescuntur frumento, *Farinarii*, *Meal-worms*. *Kis*

Theo-

Theophrasti, *κίς*, *φθίσip σίτου*, *Cis*, *Gurgulio*, vermis est frumenta exaniniens, peculiaris tritico, filigini, hordeo. Nascitur ex granis excussis (quæ corrodit & devorat) ex calore extraneo & putredinali, quem contrahunt ex situ, seu superfluo humido dulci. Hic tandem in *Chrysalin* mutatus, è *Chrysalide* fit *Papilio* minutissimus, quem proinde *Frumentarium* appellare licet. *Aldrovandus* *Triticarium* nominat.

V. HERBARIUM, qui nascuntur in Violis, Cynara, Ocymo, Saccharo, Lupulo, Asphodele, Pimpinella, &c. omnes innominati.

VI. Qui in ANIMALIBUS nascuntur; quorum haud minor ferme varietas, quam Animalium ipsorum. Inter hos præcipuum locum tenent *Acari*, *wheat* aut *Hand-worms*.

VII. TERMES, *the Gentle*: qui carni recenti innascitur vermiculus candidus, æstivo præsertim tempore; qui deinde in *Barbegiam* transmutatur.

VIII. *Midas Theophrasti*, *καὶξ*, vermiculus in fabis natus, eas erodens & consumens; ex Tinearum genere.

Insectorum APODUM Classis.

IN numero Insectorum APODUM sunt

I. LUMBRICI terrestres (quasi *lubrici*, quia labuntur: vel, ut *Martinius* ingeniosius deducit, ex eo, quod ex *λύμει βρύει*, hoc est, è sordibus nascatur.) Græcis *γῆς ἐντέρεα*, terræ intestina, & *καφαῖα*, (quod terram comedant) *Earth-worms*. Quorum *intestina* per accuratissimam anatomen detecta, & iconibus ad ipsius naturæ fidem expressa, contemplari licet apud Doctiss. *Willisum*, de *An. Brut. cap. 3*. Quibus consimiles etiam in *Hominum* ventriculo & intestinis generantur trium generum, *viz.* Lumbrici (1.) *Lati, broad Flat-worms*: (2.) *Teretes, round Gut-worms*: (3.) *Ascarides*, (*ἀπὸ τοῦ ἀσκήειν*, quoniam iis affectos mordicatione & pruritu valde exercent,) *Worms*: (4.) *Syrones* in cute, *wheat-worms*. De *intestinorum lumbricis* admirandum sane historiam hanc tradit *Casp. Schwenckfeld*. Novi fæminam rusticam, inquit, cui Lumbrici longi teretes, palmares & longiores, noveni, per intervalla, aliquot dierum spatio, dextra abdominis parte, sponte ex ventre prorupere; ulcusculo suapte natura iterum coalescente.

II. *Teredo Depes*, quam ab æneo colore *Agricola* vocat *Copper-worm*. Sub lignis putridis plerumque invenitur.

III. LIMACES (quia in *limo* nascuntur) **Snails without shells**, quarum Differentiæ satis notæ sunt.
Tantum de Insectis *Terrestribus*.

Insectorum AQUATICORUM Empodum, sive Pedatorum, Classis.

Insecta in aquis degentia generatim distinguuntur in *Empoda*, & *Apoda*. *Empoda* rursus vel *paucos* habent pedes, vel *multos*.

Inter PAUCIPEDA numerantur

I. SQUILLÆ, à Squilla pisce parum differentes, nisi quod & breviores multo antennas, & colorem magis spadiceum vel terrestrem obtineant.

II. LOCUSTA, piscem pariter Locustam forma representans. *Αχις Dioscorid. χόρνωψ, μολυρίς, μέγαξ Nicand.*

III. NOTONECTA, insecta, quæ non ventre, ut alia, sed spina innatant; à quibus Homines Hypotionecticen, i. e. supine natandi peritiam didicisse verisimile est. **Water-Insects, not much unlike small Beetles, always swimming on their backs.**

IV. CICADA aquatica, **the water-Locust.**

V. ANTHRENUS aquaticus, **the water-Hornet.**

VI. FORFICULA aquatica, **the water-Earwig.**

VII. LACERTA aquatica, **the water-Lizard.**

VIII. CORCULUS (quia *cardis* effigiem, pedibus capiteque demptis, scite exprimit) **the water-Beetle resembling an heart.**

IX. ASELLUS marinus, squillam molliorem referens, nisi quod quatuor duntaxat pedibus donatur; **a sea-Insect like a wood-loose.**

X. MUSCA aquatica, **the water-fly**; de qua videatur *Rondeletius de Fluviat. c. 40.*

XI. HYDROCANTHARUS, **the water-Beetle.**

XII. THERMOCANTHARUS, in calidis fontibus media æstate frequenter visus; **the Bath-fly.**

XIII. TIPULÆ, & Tipullæ, (ὀψὶς ἢ ἴφην, quia hoc insectum versatur circa paludes; ut deducit *Hesychius*;) in fontibus ac rivis summa celeritate superficiem aquæ percurrentes: unde Belgæ vocant **Water-spinne**, & Angli **Water-spinners**. Harum meminit *Plautus, Persa, act. 2. Scen. 2.*

Neque

Neque tipula levius pondus est, quam fides lenonia.

Ortum suum trahit ex *Pediculo marino*, eademque videtur cum *Aranea Albert. Magni*. Insectum est parvum, aquaticum, levissimum, colore Aranei obsoleto, cætera Scarabæo similis; corpore compresso; capitulo minuto duæ forficulae adnatæ, extrorsum reflexæ viam præsentant. Ocelli prominent bini. Pro alis sunt membranulæ duæ tenuiores fulcæ. Cauda gemino spiculo, sed imbelli, armatur. Per ventris mediam longitudinem excutrit linea nigra, cum splendore. Crusculis utrinque ternis, prioribus brevioribus, posteriorum ad corpus proportionem sesquialtera. Mira celeritate aquæ superficiem sicco pede permeat ac trajicit, ac si tertam ipsam obambulet. Æstate in palustribus & aquis residibus occurrat.

Dicuntur etiam *Macropedi*, *Pedones*, & *Græna*, à pedum longitudine. *Long-shanks*, aut *Crane-legs*. Harum *Monffet* quatuor, *Aldrovandus* duas observavit differentias.

XIV. ATTELABUS arachnoides *Aldrovandi*, (quæ mediam quandam formam inter Araneum & Attelabum, seu Locustam apteram obtinet,) sex tantum pedibus dotatus.

XV. LIGNIPERDA aquatica, *Phryganie* Bellonii, *Gallis Churree*, the *Caddis-worm* (sic appellata, quod phrygana, i. e. fremia sive festucas, thecæ aut tegumenti lateribus filo tanquam araneæ ab ejus ore dependente (novit enim nescit ut aranea) agglutinans circumponat, ex quibus angustius etiam ampliore sibi construit,) qua piscatores utuntur pro elcæ ad inhamandas Truttas. *Χυλοφάγοι* Arist. *Phryganie* Bellon. & Gesnero, quod *phryanis* seu thecis inhaerent. *Tinea tunica trahens*, Plin. Vermis est oblongus, ex Erucarum seu Tinearum genere, coloris cinerei, thecula oblonga festucacea inclusus. Caput antennis duabus brevibus, & pedibus senis putamine suo exerit varium: reliqua pars, alvus nimirum oblonga, intus reconditur; supra infraque cirris albicantibus hirsuta; quibus thecæ suæ adeo tenaciter adhæret, ut vi evelli vix queat. Hanc secum, dum ambulat, trahit. In *Chrysalidem* abit, ac tandem in *Papilionem*, up *Brucæ* quædam. In putridis lignis, furvis appositis aut immeris, nascitur. Piscatores hos legunt, ad pisces inescandos, quos avidissime appetunt.

XVI. CIGADA fluvialis, bestiola in rivulis nata, terrestri cicadæ perlimilis: quam accurate descripsit *Schwenckfeld* in *Theriotrophia* suo.

XVII. SQUILLA fluvialis, *Gryllus aquaticus*, palustris; the *Water-shrimp*. Insectum est aquaticum, tenuissima crassa interctum, longiusculum. Caput rotundo & compresso, lentis leguminis instar.

Q

star. *Oculi* ad latera eminent bini. *Cornicula* trina longiuscula, subfusca prætenduntur, cum totidem *appendiculis*. *Thorax* latior ex tribus tabellis constat, pallidiusculus, lineolis & punctis nigris varius: cui prona parte affiguntur *pedes* seni, utrinque terni, geniculis distincti. *Ventrem* longiorem, teretem, constituunt decem undecimve annuli, punctulis & circulis nigris insignes. *Cauda* gemino spiculo firmatur. *Prona* pars albet. In fluviis passim occurrit: piscium quorundam cibus.

Inter MULTIPEDA numerantur

I. **TINEA** aquatica, ~~the water-moth~~. *Scrofula aquatica*, *Asellus aquaticus*, *Pediculus aquaticus*. Bestiola est fontium, perexigua, albicans. *Pedicellis* nititur continuis, per totius fere corporis alvum. Ab ore etiam veluti pediculi prominent. *Cauda* oblonga in aculeum definit. *Oculi* sunt perexilia puncta alba, cum centro nigro longe minutissimo. In *fontibus* reperiuntur, ac puteis limpidis ac frigidis duntaxat, præsertim Martio ac Aprili. In aqua moventur & currunt, corpore non recto & æquali, sed in alterum latum inclinato. Conglobari convolvique, quasi in arena solent. Periculosa sunt iis qui hauserunt, ita ut in summum vitæ discrimen redigantur.

II. **PULEX** marinus, facie hominem ridiculum, aliis partibus Locustam referens; ~~the sea-flea~~, *Sugg.* Insectum palustre nigrum, pulice paulo majus, supra aquas, præcipue stantes, velocissimo motu cietur. Degunt gregatim, invicem colludentes.

III. **ASILUS** marinus, terrestri persimilis.

IV. **SCOLOPENDRA** marina, ~~the sea Gally-worm~~.

Aquaticorum APODUM Classis.

EX APODIS sunt

I. **HIRUDINES** (ab hauriendo) *sanguisuga*, Βῆμας, (ἀ βῆμας, i. e. emulgeo) ~~horse-leeches~~: quæ sunt venenatae, & Innoxia; item Maxima, & Lacustres λιμναῖες. Insectum est palustre, instar Lumbrici oblongum, lubricum, lineis & punctis nigris varium. Corpus veluti ex quibusdam circulis colligatur, (absque ossibus, pedibus, & pinnis,) quibus extensis contractivè movetur. Os ei trifidum, quod ex vulnere cuti inflicto apparet.

II. **STELLÆ** marinae, (quod stellas figura æmulentur,) ~~starfishes, Roses, five-fingers, and Sea-pads~~.

III. **HIP-**

III. HIPPOCAMPUS (ab ἵππος & γόμῃ flexura; repando enim corpore est, & in arcum se curvaute, Erucasque cauda maxime refert; reliquo vero corpore Equum imitatur,) nonnullis *Gal-lus marinus*; aliis *Salamandra marina*, *Caballio marinus*; Veget. *Dracunculus marinus*; Hippidium *Athen*. Cui equinum caput, & col-lum, & corpus; cauda Erucæ. *Rostrum* oblongum, teres, tubuli modo cavum: capite & collo protuberante. Totius longitudo sex digitorum. *Venter* longiusculus est, ex circulis cartilagineis, ceu coltis, à capite ad caudam duodecim compactus: in cuius parte prona triplici, in dorso autem quadruplici serie *processus* acuti pro-minent. *Cauda* longa, inflexa, quadrangularis, sensim gracilescit, ex continuis constat internodiis, eminentibus utrinque supina parte *aculeis*. *Oculorum* meatus visuntur ad frontis initium. *Branchiæ* nullæ. *Schwenckfeld*.

IV. LUMBRICI aquatici, *Summer-worms*, (vel quia æsta-te tantum comparent, vel quia hyeme pereunt.) *Aquatici* autem dicuntur, quia sicut Lumbrici terrestres in aqua haud diu vivunt; ita etiam Aquatici in arido positi cito intereunt: illi videlicet aeris, hi vero humiditatis penuria laborantes.

V. SETA AQUATICA, vermis aquaticus, Pilus aquaticus; Insectum palustre longum, instar setæ tenuissimum, cubitalis longi-tudinis, pilo caudæ equinæ similis. Ex pilis equinis, positus in aquis stagnantibus, vitam & spiritum concipientibus, nasci quidam cre-diderunt. Horum perfimiles nonnunquam ab Hominibus etiam cum ingenti dolore eminguntur. Exemplum notatu dignissimum prodidit *Cl. Swenckfeld*. Civis quidam consularis Fridebergæ ad Quadam fluvium, inquit, de colicis & nephriticis doloribus ingen-tissimis conquestus, opera mea usus, tandem filum sesquicubitum longum, instar pili aut setæ, per meatum urinarium extraxit, magno cum dolore: ex eo cessantibus torminibus, paulo post iterum sani-tati pristinae fuit restitutus.

Et tantum de *Insectis*.

AVIUM Differentiæ & Nomina.

Terrestribus cursim lustratis, proxime, observato Hebræorum ordine ex sacra Scriptura desumpto, animalia inspiciamus **AE-REA**; quæ generatim Græcis ὄρνιθες (*ὄρνις* ὄρνις, ἡ ὄρνις; aves enim impetuose se movent, & volando alte extollunt: sed proprius est ὄρνυμι, excito; unde ὄρνιθια, tempestas,) dicuntur; Latinis *Aves* (ab Hebræo *Aph*, i. e. *volans*, quia in aere liquido volant; Anglis *Birds* (ab Anglo-Saxonico *Brecan*, fovere, incubare, educare: quia ova incubando ac fovendo pullos excludunt, denique diligenter eos educant) & *fowl* (ab Anglo-Saxon. *Fugel*, Dan. *Fugl*. Belg. *vooghel*, avis: omnia forte à Lat. *volare*) & ut planius ab Insectis volantibus internoscantur, *feathered-fowl*.

Avis vero est animal *bipes*, *alatum*, & *plumigerum*; à Quadrupede plurimum, & his præsertim *proprietatibus* differens.

1. Si *vivam* spectas, neque pilos habet, neque labia, neque dentes, neque cornua, neque pedes *anteriores*: sed *plumam* pro pilis, *rostrum* pro labiis & dentibus, *alas* pro pedibus anterioribus, & pro cornibus nonnullæ gerunt *cristam* & *calcaria*. Etiam avibus desunt *cilia*, & *supercilia*, & *nares*, & *auriculæ*. Membranam autem *Nistatoriam* habent, in majori oculi cantho conspiciendam, qua oculos suos detergere solent, & dum dormiunt, obvelare.

2. Si *mortuas*, cultroque anatomico apertas; *vesicam urinariam* non habent; ideoque lotium & stercus unico meatu excernuntur. Præterea, quod in pecude *rumen* est, id in ave *ορόλογον*, *ingluvies*, Angl. *the Cram* (*Minshaus* noster desleat à Belgico *Braeghe*, jugulus) or *Crop* (à Belg. *Brop*, *ingluvies* avis) & in carnivoris, *the Gorge* (à Franco-Gallico *Gorge*, gula; quasi dicas *gurgēs*, gula enim est præ reliquis corporis partibus belluo.) Quippe aves fere omnes duplicem naturæ sunt ventriculum, quorum alter *ingluvies* proprie nominatur, & apud nostrates *the Gizzard* aut *Ghiz-zard* (forte à Franco-Gallico *Gesier*, *Jesier*, ventriculus avium; quod defluxisse videtur à voce *Festi Gigerium*, de quo inusitato vocabulo consule, si placet, *Salmasium exercitat. in Solin. pag. 219*. In priori, aves grana integra devorata retinent; indeque, cum epota aqua madefacta, macerata & emollita fuerint, in ventriculum sensim transmittunt, ut ibidem molantur & comminuantur. Cujus rei gratia, Pennata fere omnia arenulas, lapillos, aliaque quædam duriora deglutiant, & in ventriculo una cum cibariis servant (dum interim in ingluvie nihil tale reperitur) habentque hunc ventriculum ex duobus crassissimis & robustissimis musculis (in minoribus avibus, carnosis aut ligamentosis) compactum: ut hoc modo, ceu duobus lapidibus molaribus, binis invicem cardinibus colligatis, molere cibaria,

cibaria, & pinlere possint: vicemque dentium molarium, quibus carent, calculi supplent. Hinc aves, cum calculos eligunt, lingua probant; & si nihil asperos senserint, rejiciunt. *Inglavies* autem extra corpus (ut plurimum) in infima colli parte, ad os jugale (notatibus, à figura, *the fork*, q. d. *furca*, dictum) hæret: in qua (ut dixi) cibaria emolliuntur solum, & præparantur; ideoque Pennata quædam cibum ita maceratum pullis suis regurgitant, eosque semiconcocto jam chylo nutriunt; ut videre est in omni *Columbææ* genere, atque etiam in *Spermologis*. *Aspera* etiam *arteria* in Avibus conficitur ex integris circulis cartilagineis, & à sinistris Gulam in suo descensu comitatur. Forte hoc fit ob longitudinem & gracilitatem colli; quod antè indecore prominere, si aspera arteria gulæ incumberet. At vero in Avibus quoque ipsa larynx orificio gulæ præponitur. Integre Tracheæ circuli ad suaviorem vocem, magisque canoram facere videntur.

Hepar item in Avibus, suprema loborum cavitate, cor, cum investiente capsula, amplexatur. *Vesicula* autem *fellea*, altero quidem capite exortum trahit à cavo hepatis, à quo bilem recipit: altera vero extremitate oblongum collum promit, quod in Duodenum inseritur, ita ut Cystis in intestina exanimatur. Et *Porus biliaris* ab hepate exortus, nullo habito cum Cysti fellea commercio immediato, ad intestina excurrit, ut plurimum supra colli Cystis insertionem, Pancreatis substantiam pertransiens: observatore *Malpighio*, de *viscer. structur.* pag. 41.

Lien autem carent; docente *Harvæo*, de *Generatione Animal.* exercit. 6.

Ad hæc, *intestina* in Avibus à parte superiore ventriculi oriuntur, & secundum longitudinem sursum deorsumque (non transversim, ut in nobis) replicantur, cum plurimis membranulis intertextis, ære repletis: quippe in his, asperæ pulmonum arteriæ foraminibus hiulcis aperiuntur. *Cæca* vero duplex habent, & utrumque valde longum; forte ad supplendum *Coli* defectum, quod penitatis omnibus deest.

Quoniam insuper Avibus hoc commune est; quod *orbita* five cavitas quæ oculum amplectitur, cerebrum ipsum magnitudine exsuperet; ut in ipsarum craniis videre est: fit autem ut earum oculus minor videatur, quia totus præter pupillam, cute & plumis obtegatur. Neque orbiculari figura præditus est (qua promineat) sed depressiore; ut Piscibus contingit, quod scite annotavit *Harvæus*, de *Generat. Animal.* exercitat. 17.

Si reclusis *Calvaria* claustris, porro tibi visum fuerit, quæ in ejus cavitate recondita sunt, curiosiori scrutinio perlustrare; haud pauca inibi comperies, quibus volucres *relinquuntur*. Natura tum ab Homine, tum à Quadrupedibus cunctis ulterius adhuc discrimi-

R

navit.

navit. Nam (1) in volucribus, dura cerebri meninx in quatuor *sinus* quasi replicatur; quorum *primus* eo in loco, ubi cerebrum in duo hemisphæria dividitur, in longum, sed nullo falcis interstitio bipartitum, quasi angiportum excurrans; cerebro minus profunde interitur: *secundus* vero & *tertius* priore paulo inferiores & ad latera, ubi eadem membrana cerebrum à cerebello distinguit, situm obtinent; *quartus* deniq; aliquanto posterius quam in homine aut quadrupedibus, situs est, in cavitate nimirum, quæ inter membranam striatam & cerebri hemisphærium interjacet. (2) *Pia mater* valde tenuis reperitur, plana etiam & æquabilis, gyrisque & anfractibus omnino destituta; longe secus quam in homine & quadrupedibus. (3.) In ipso *Cerebro*, neque *corpus callosum*, neque *fornicem*, neque *corpora* etiam *striata* reperies: adsunt tamen quibus eorum defectus suppleatur. (4.) Cerebri quoque *figura*, si cum hominis conferatur, plane videtur *inversa*, quippe in homine aliisque perfectioribus animalibus cerebri pars *corticalis* exterior est, eique subternitur *medullaris*: in avibus autem, inferior cerebri compages, quæ substantia constat crassiori & densiori, corticis locum possidet; & membrana extima & superior, ventriculum concamerans, supra quamvis aliam partem *medullaris* apparet. Porro *ventriculi* in hominis & quadrupedum cerebris infra & prope fundum: in volucribus, superius & juxta oram exteriorem collocantur. (5.) In *medulla* denique *oblongata* dispar conformatio apparet sc. in prima illius sectione, unde nervi Optici exoriuntur, duæ insignes *protuberantiae* utrinque accrescunt: quæ proportionem majores sunt, quam in perfectioribus animalibus *prominentiæ Orbiculares*; adeo ut *Cerebrum* veluti *alterum* & *sucenturiatum* esse videantur. Præter hæc discriminis indicia, quæ volante calamo tantum enumeravi, sunt quidem & *alia* quædam in avium capitibus dextre dissectis observanda: attamen quia oculatiss. noster Collega dicam, an Symmista, D. D. *Willisus* omnia dudum jam in *Anatom. Cerebr. cap. 5.* conjecit; idcirco mihi consultius videtur, aventem plura rescire Lectorem eo candide remittere, quam iis hic frigide recensendis immorari.

Postremo, si à summa facultatum Animalium arce, ad instrumenta *Pneumatica* Pennatis concessa descendamus, & in iis etiam quidpiam peculiare, ac singulari artificio conformatum percipiemus: *Pulmones* nempe tam numerosis undique foraminulis *perflabiles*, ut inspiratus aer in universam ventris cavitatem liberrime permeans, inde inter expirandum, abdominis musculorum ope, rursus excludatur. Quod sensibus quidem nostris manifestum est: sed si in naturæ primarium isto in opere consilium inquiramus, rationi adeo abstrusum, ut de aeris ita in ventris recessus admissi *usu* disquirentes Anatomix proceres, in varias iverint conjecturas, remque etiamnum haud temere solvendis difficultatibus involutam relinquere sint coacti.

coacti. Quid igitur de tanto Naturæ problemate sentiamus? Certe illa hic nullum habuit respectum ad Avium *cantilenas*; non omnes enim canoræ sunt, omnibus tamen Pulmonum perspiramina communia esse perhibentur: & in ipsis Pulmonum vesiculis tantum aeris contineri posse videtur, quantum ad cantum, & longiorem vocis modulationem requiratur. Neque etiam probabile est, voluisse in omnibus consultissimam Naturam, ut hoc pacto Aves, aere per totum ventrem diffuso, inibique tanquam in vesica arcte concluso, *leviores* reddita, aptiores essent & promptiores ad volandum. Nam sua ipsi etiam aeri gravitas inest, uti experimentis compluribus *Aerostaticis* à *Mersenne*, à nobilissimo *Boyle* nostro, & ab aliis passim factis, certissime compertum. Ac graviter proinde lapsi sunt, qui hanc opinionem admiserunt; corpora quævis eo minus ponderare, quo aeris plus in porulos sive loculamenta partibus suis interspersa receperint. An non plane absurdum, rem aliquam sua natura gravem, si alteri magis gravi forte accesserit, eam reddere minus gravem posse? *Dices* fortasse, *Pisces* pariter, quo in aquis leviores natent, *vesiculas* quasdam semper aere distentas in mediis visceribus circumgestare. *Respondeo* igitur, verissimum esse, compluria Piscium genera huiusmodi folliculis ventosis donari: at sane non ut ab aere in illis concluso ipsi leviores fiant inter natandum; huic enim usui ipsius aeris gravitatio palam repugnat; utpote quæ nec in aquis vim suam amittere, compluribus experimentis certissimis (quorum nonnulla collegit *Phyicomathematicorum* subtilissimus, *Marin. Mersennus*, in *Phenom. Pneumatic. propos. 29.* & *Reflexion. Physicomath. cap. 6.*) deprehensa est. *Cuinam* ergo usui *vesicula* ista *piscium* inserviant? Equidem, ut ignorantiam meam ingenue confitear, plane nescio: quippe novi quantis difficultatibus sepiantur res physicae, quæque sit in illis ardua veritas. Si tamen ut aliis, ita pariter & mihi modeste conjectandi licentia concederetur, quid de hac quaestione sentiam, exponere non vererer. Illud in præsentia dicam, mihi admodum aridum novam illam *Cl. D. Joh. Mayow, LL. D.* Hypothesin (*de fermento ventriculi cap. 5.*) qua inter cætera astruere conatur, aerem in dictas piscium vesiculas inspiratum, potius ad promovendam ciborum concoctionem, quam ad natatum facilitandum conducere. Primum enim rationi consentaneum videtur, tantopere decantatum illud ventriculi *Fermentum*, quo cibaria attenuari, comminui, & digeri (hoc est, *colliquari*) supponuntur, ex particulis *Nitro-aereis* præcipue constare, quæ nervorum ductu in ventriculi membranas illata, ibidemque cum liquore quodam idoneo, à sanguine, membranae ventriculi glandulis refertæ beneficio, secreto, per minima commixtæ sunt. quippe non simplici experientia compertum habemus ab huiusmodi spiritu Nitro-aereo, quamvis acidus non sit, & ferrum tamen ipsum corrodi, & vitriolum confici & salia fixa ad

fluorem perducere, rerumque fere omnium compagem tanquam ab universali menstruo dissolvi: quamadmodum luculenter ostensum est ab eodem ingeniosissimo *Autore* in tractatu suo Medico-physico *de Spir. Nitro-aereo*. Et aereum quoddam ad ciborum in Animalium ventriculis expeditiorem colliquationem requiri, vel hinc divinare licet, quod aer serenus, & purus, tenuiorque haud parum ad appetitum excitandum, digerendamque crapulam conducatur; contra autem crassus, uliginosus, & gravis aer, cum chylicationis opus remoretur, tum ipso ventriculo varias molestias creet. Deinde, ex incorrupto Eruditissimi viri, D. D. *Gualt. Needhami* (in *Disquisit. Anatomis. de Fetu formato, cap. 6.*) testimonio constat, in hisce piscium vesiculis vulgo quidem, sed forte perperam *Natorum* dictis, conspicuum reperiri *canalem* quendam sive ductum, ad ventriculi fundum usque productum, eique insertum, ita ut leviter compressa vesicula, quæ ut plurimum duplex est, aer mox inde in ventriculi cavitatem irruat. Quem autem precor, in *finem*; nisi ut ita immixtus aer spiritu nitroso imprægnatus, concoquenti assumpta alimenta ventriculo usui quadantenus sit, & adjumento? Cum itaque (ut quæ de hoc ænigmate jam diximus, summatim recitemus) aeri & facultas quædam inesse credatur, cibaria in Animalium ventres excepta comminuendi, colliquandique, & aditus è toties hic memorata vesicula in ventriculi fundum pateat; cumque præterea nunc ab omnibus confessæ ejusdem aeris gravitati palam refragetur, ut is in cujusvis rei conceptacula exceptus, vel minimum de illius pondere detrahat: his inquam æqua rationis statera expensis, quid impedire possit, quo minus suspicemur, ventolum istum folliculum in compluribus piscium generibus repertum, potius *promovenda ciborum concoctionis* gratia, quam ad illorum corpora in aquis allevianda, ex Naturæ instituto conditum esse? Cæterum ut ad modo propositam, de aeris in *Avium* abdomen per pulmonum perspiracula excepti usum, difficultatem jam revertamur, nil mirum cuivis videri debet, esse inter Anatomicos de hoc zetemate magnam digladiationem. Res enim perdifficilis intellectu est, multæque disquisitionis. Liceat mihi tamen, ne tanti momenti questionem videar prorsus intactam reliquisse, ingenioli mei augurium extispicio captum experiri.

Consideratu dignum sane videtur, quod solertissimus noster *Harvaeus* (*de Generat. Animal. exercit. 3.*) sapienter annotavit; Avem scilicet, præ cæteris animalibus, *facillime respirare*; cum tamen ejus pulmones lateribus & costis adeo affixi sint, ut parum admodum dilatari, assurgere, & contrahi possint. Unde igitur, precor, avibus isthæc respirandi *facilitas*? Certe non aliunde quam à membranis illis, quæ non modo transversim positæ ad cinctum corporis, sed & secundum ventris longitudinem protensæ, & aerem è perforatis pulmonibus

monibus excipiunt, redduntque vicissim; & diaphragmatis vicem subeuntes, ad respirationem conferunt: ita ut in pennatis, pulmones potius *transitus*, & via quædam ad respirationem videantur, quam hujus adæquatum organum. Neque etiam diaphragma ipsum, sine musculorum abdominis adminiculo, respirandi officium præstat: aliudque ei munus incumbit in iis, quibus carnosum sive musculosum contigit. Nimirum ut ventriculum cibo turgidum, & intestina fecibus flatuque distenta deprimat; ne cor, & pulmones ab eorum ingressu patiantur angustias, vitæque penetralia opprimantur. Cujus periculi cum in avibus nullus sit metus, septum membraneum iis donatum est, respirandi usibus valde accommodum. Hinc itaque clare liquet, Naturam, in avium organis pneumaticis ad hunc modum fabricandis, *duplicem* sibi proposuisse *scopum*: nempe ut & diaphragmatis musculosi defectum suppleret, simulque alias insufficienti pulmonum dilatationi, qua eorum perforatione, qua membranarum satis copiose inspirati aeris capacium supplemento, prospiceret atque auxiliaretur. Quod si verum est, equidem non amplius erit, quod aeris in avium ventres inspirati usum quæramus alium, quam qui sit nobismet etiam ipsis, cæterisque animalibus sanguine præditis indiscriminatim communis; maxime cum dubitare liceat, an non in *homine* etiam, dum vivit, aer per inconspicuos pulmonum meatus, in thoracis cavitatem penetret. Quomodo enim aliter in vulneribus pectoris (illæsis etiam pulmonibus) aer per vulnus foras erumpat? aut liquores in cavitatem pectoris injecti, cum sputo reddantur? ut *Harvæus* nervose argumentatur.

Quæ avibus in genere propria sint & peculiaria, jam vidimus. Proximum est, ut videamus quibus differentiarum indiciis singula earum genera à cæteris omnibus commode intuscantur.

Distinguuntur generalius, loci in quo maxime degunt ratione, in *Terrestres*, & *Aquaticas*. Terrestres vero subdividuntur in (1,) *Carnivoras* (2,) *Insectivoras*, (3,) *Granivoras*, sub quibus comprehenduntur *Pulveratrices*, sylvestres & domesticæ, *Pulveratrices* & *Lotrices* simul: & (4,) *Baccivoras*. *Aquaticæ* autem in (1,) *Palmipedes*, & (2) *Fissipedes* discescuntur: quæ etiam sua sortiuntur genera, inferius proponenda.

Avium Terreſtrium CARNIVORARUM Classis.

E Terreſtribus CARNIVORIS ſunt

1. **AQUILA** (vel ab *aquilo*, hoc eſt, fuſco ſive ſubnigro colore, qualis aquæ eſſe ſolet: vel ab *acute volando*; nam avi hac nulla volat vehementior, ut eſt apud *Ciceron. 2. de Divinatione*: ac apud *Cedrenum* legimus, videri veteres, ad ſignificandam raptus celeritatem, finxiſſe, *Ganymedem* aquila à *Jove* raptum eſſe: vel ab *acuto viſu*; quia aquila perhibetur acuti adeo viſus, ut cum in eam altitudinem elata eſt, ut nec humanis pateat oculis, tamen & minutos videat piſciculos in mari natantes, & lepufculos ſub umbroſo frutice recubantes.) Græce *ἀετὶς αἰετὶς ὅς αἰεὶ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ*, quod ſemper augurium ejus veridicum crederetur: idque fortaliſſis, quia miniſtra Jovis, qui eſt ſummus æther, quem ſola illa petit) **the Eagle**, à Latina, *aquila*. Cujus ſpecies ſunt.

1. *Chryſætos* (à fulvo pennarum colore) *Ariſtoteli γρῖναιος*, **the Golden Eagle**. Hujus & deſcriptionem & conſectionem fuſe tradidit *Aldrovandus, Ornitholog. lib. 2. cap. 2.*

2. *Haliætos*, *Aquila marina*, **the Sea Eagle**, à *Belloniò, de Avibus, l. 2. c. 8.* deſcripta. Quæ pede uno eſt anſerino & natante; altero fiſſo & prædæ captandæ dicato; in *Angliâ* noſtra haud raro reperitur.

3. *Melanætos*, *Ariſtoteli λαγωδιῆς*, aliis *Hyperionis* avis; **the Black Eagle**, quæ reliquis minor eſt. Viſitat ut plurimum leporibus, quos, ſenſim in terram delapſa, in plana digreſſos opprimit. Sola aquilarum foetus ſuos alit, ſi *Plinio* credimus.

4. *Pygargus Hinnularia* (quia cervorum hinnulos adoritur) *Gazæ Albicilla*; **the Fawn-killing Eagle**; *Turnero, an Erne*. Lapidem *Actitem* in nidum infert, à quo & is nomen habet: ſed in alendo foetu reliquis eſt difficiliſſior.

5. *Morphnos*, *πλάγος*, *χλάγος*, & *πρίνός*, *Neuia*, *Clanga*, *Planga*, *Anataria*, à necandis anatibus) **the Fowl-killing Eagle**. *Turnerus* apud *Gesnerum* nomen hoc noſtro **Bald-Buzzard** aſcribit. *Bellonius* vero avem Falconem ſecuplo majorem, pedibus cœruleis, digitis oblongis, unguibus patulis, Gallis *Gerſault* dictam, & terreſtri venatui adhibitam, pro *Morphno*, ſed dubius, obtrudit.

5. *Morphno* congener *Aldrovandi*, cuius magnitudo galli gallinaei eſt, color ferrugineus; **the Rough-footed Eagle**.

7. *Pernopteros*, *Hypætos*, *Ægyptas*, & *Oripelargus*; **the Short-winged Eagle, with a white head**.

8. *Off.*

8. *Offraga*, Aristoteli *φλυν*, *Harpa*, (ob insignem rapacitatem;) & *Livio* *Avis sangualis*, aliis *Immutatus*; **the Osprey**, aut **Bone-breaker**.

9. *Aquila alba*, seu *Cygnæa* (ob candorem niveum) in rupibus circa Rhenum degens; **the white Eagle**.

10. *Heteropus* Gesneri (quia sinistrum crus coeruleum, dextrum fuscum albicans habet,) **the Eagle with one leg blew, the other brown**.

11. *Avis Scythica*, **the Scythian Eagle**, de qua mira narrat ex propria observatione *Ol. Magnus*.

II. **VULTUR** & *Vulturius*, (à tardo volatu, quasi *volitardus*; nam ob amplam corporis molem, utpote Aquilam sesquialtera proportionem excedens, ægre se humo attollit, tardoque per aera motu fertur,) item *avis Titii*, per periphrasin; Græce γύψ, **the vultur**, aut **Geir**. Avis est rapacissima, *rostrum* adunco, *oculis* truculentis, *facies*. *Pennæ* seu pili, instar velleris tenuissimi sub mento, veluti barba, prominent. *Crura*, ad extremos usque digitos flaventes tabellis intactos, hirsuta: *ungues* adunci, nigri. Cujus genera Neoterici plura observant. Recensentur nimirum

1. *Albicans* & parvus, in subiectis Septentrioni regionibus frequens; **the whitish vultur**; qualis hodie in Theriotrophio Regis nostri nutritur. *λευκοκέφαλος*, proprie dicitur; quippe caput, collum, alæque interiores, insigni candore nitent: quæ maculis, seu lineolis longiusculis potius, resperguntur, alis exceptis.

2. *Cinereus*, **the ash-coloured vultur**.

3. *Beticus*, sive castaneus, **the Chestnut vultur**.

4. *Nigricans*, **the swarthy vultur**.

5. *Leporarius*, (quia leporibus præcipue infidiatur,) **the Hare-catching vultur**, *λαγωφόνος*, *Arist.* *Offisragi* fere est magnitudine: volatque magno & sonoro impetu.

6. *Aureus*, (à fulvo colli, pectoris, ventris, & pedum colore,) **the golden vultur**. De quibus omnibus optime *Albertus M. l. 7. de Animal. cap. 8.*

III. **ACCIPITER**, (ex *ἄκπιτρος*, quia alas habet in acutum definientes & longissimas,) *ἱεραξ*, quasi sacer ales, utpote cujus magna fuit apud veteres veneratio,) **a Hawk**. Cujus diversæ species sunt

1. *Asterias*, *Astur* (quia punctis & notis quibusdam stellulas representantibus respergitur) **the Star Hawk**, aut **Eget**.

2. *Palumbarius, Phasianopus, Columbida*; **the Pouter.**
3. *Fringillarius, the Finch.*
4. *Circus*, (forte quod, cum infidiatur, circuitum in aere faciat) Aristoteli *ῥίπτις*, **the Osprey**; quia semper clamitat.
5. *Esalo*, Turnero *Smerillus*, Isidoro *Merillus*, Alberto *Merle*, **the Merlin**. *Αἰσάλας* Arist. Est rostro adunco coloris Indici; ungibus unctis, nigris. *Crura* subflavent. *Vertex*, *dorsum*, *cauda*, *alaeque* fusca sunt, notis & maculis castanei coloris undique distincta. *Venter* subflavet, longiusculis maculis varius. *Gula* albicat. *Caudam* transversim zonae latiusculae obscure rubentes distinguunt fene. Alarum *remiges* notis rubentibus juxta spinam, ut in Cuculo, asperguntur. *Faciem* & *collum* veluti circulus guttulis refertus exornat. *Oculi Iris* ex caeruleo nigricat, *papilla* obscure rubente. Omnium avium velocissima,
6. *Tinnunculus, Gaze Trifunculus*, ut Italici Tristarellus & Canibellus; **the Wind-wanner**, aut **Kestrel**.
7. *Nisus, Alaudarius, the Hobby*.
8. *Merularius, the Sparrow-hawk*.
9. *Buteo* (à Syro *Βούτ*, i. e. *diripere*, quia avis rapax est) *Τεσπυχνὴ* (à trinis testiculis, quasi Tritestiger) **the Buzzard**.
10. *Sub-buteo*, seu Hypotriorchis, **the lesser Buzzard**.
11. *Buteo albus, the Ring-tail*.
12. *Collurio, the little Laniar*: *Spinitorquus minor*.
13. *Lanio, the Butcher*, aut **Adder-bird**, because in colour resembling the Adder: in *Schrophire* and *Chestre*, the **Warriangle**. vide *Chaucer in the Assembly of fowls*. *Ætate* Gryllis campestribus vescitur; eosque lupinos spinis affixos juxta pullorum nidos collocat, ne quando cibi penuria tabescant. Apud nos occurrit etiam *Lanius minor*, tertius nempe *Aldrovandi*, Agri Eboracensis incolis **the flusker**, Turnero **the Shrike**.
14. *Milvus* (nec quasi *mollis avis*, ut *Isidorus* vult: nec quod milio vescatur, ut aliis placet: sed à *sono*, quem volans edit; unde *dicta milvina*, genus tibiæ acutissimi soni, ut *Festus* scribit,) *ἰκνὴς*, *ἰκνὴς*, & *ἰκνὴς*, à viribus scilicet & volata. **The forked-tayl'd Kite**, aut **Glead** (à Anglo-Saxon. *Gleā*, à verbo *Gleān*, labi, quia velociter in prædam se dimittit.) *Rostrum* habet aduncum, nigrum; minutissimis pennis juxta nares utrinque rigentibus. Cum vocem edit, *lipire* dicitur. Autumno mures & columbas venatur; quibus ventriculum distentum sæpe reperire licuit.
15. *Milvus regalis* (sic dictus, quod à binis Falconibus sacris in ipsum emissis, intra nubes etiam se condens, summa cum principum

pum voluptate in terram dejiciatur,) the long-winged Kite,
aut Buttock.

16. *Milvus palustris*, the fen-kite, aut frog-kite.

IV. FALCO (à falcato unguium hamo) the Falcon. Qui est vel

1. *Peregrinus*, *Ardearius*, the blew-bacht falcon, preying chiefly upon Herons. Nomen ex eo habet, vel quod semper de regione una in aliam migret: vel quod nidus ejus nullibi gentium inventus fuerit.
2. *Sacer* (vel Græcorum imitatione, quasi *Hierax* Accipiter, per excellentiam, sic dictus: vel à corporis magnitudine, viriumque præstantia vel ab Arabico *Saker* quod quoddam accipitris genus denotat,) qui *Britannicus* appellatur; the *Saker*, aut tith falcon.
3. *Gyr-falco* (forte à circumgyrando in aere,) the *Gyr-falcon*, frequent in Ireland.
4. *Falco Montanus*, the Mountain-falcon.
5. *Gentilis*, (propter generositatem) the Carlel-Gentil.
6. *Tunetanus*, the Barbary-falcon.
7. *Gibbosus albus*, the white hunch-bacht falcon.
8. *Lapidarius*, *Lithofalco* (quia in lapidicinis nidum ponit) the Stone-falcon, breeding in quarries.
9. *Arborarius*, (quia nidum in arboribus extruit) the tree-falcon.
10. *Rubeus* (à guttarum sive macularum, quibus distinguitur, rubro colore) the Falcon with red spots.
11. *Cyanopus* (à cyaneo pedum colore) the blew-legged Falcon.
12. Falcones promiscuo coïta geniti; Bastard Falcons. De quibus omnibus consulat *Aldrovandus* in *Ornitholog. lib. 7. cap. 8, 9, 10, 11, 12. & sequentibus*, atque etiam *Casp. Schwenckfeld, Theriotroph.* qui plura desiderat,

V. CUCULUS, Κόκκυξ, (à voce κοκκίζω, cucurire,) the Cuckoo.

VI. PSITTACI (seu à *Psittace*, urbe juxta Tigrim celebri: seu ἀπὸ τῆς ἑλληνικῆς φύσεως) Παπαγὰς. Παπαγὰς, ἀνθρωπώλακος. Corporis habitu *Accipitri* quodammodo similis. Corpus enim habet prægrande, rostrum hamatum seu aduncum, durum, instar rapacium, unde frustra ligneis clathris coercetur, cum omnes perfringat, sed ferreis opus est. Lingua ei crassior & latior cæteris avibus, cucurbitini seminis fere figura: unde articulata verba exprimit. Pectus rotundum. Pedes Pico Martio cognati, digiti utrobique ante & re-

T

tro

tro, bini, unguibus aduncis, quibus elcam, instar rapacium, completitur, & humano more, ori escas admovet. *Nidificant* in arboribus. *Nidum* pilæ modo rotundum,artificiose contextum, ramulo tenui pensilem, instar *Orioli*, alligant; foramine ad ingressum & egressum perquam exgiuo relicto. *Aloysius Cadamustus*. *Ova* pariunt 2 vel 3, columbinis similia, quæ licet ab homine tacta, Psittacus tamen non deserit. *Pullos* excludunt medio Junio & fine; plumati autem pulli inveniuntur apti ad eximendum fine Julii & medietate Augusti. Cum primum excluduntur, *vermes* crassiusculos habent, in quolibet narium foramine unum; ac præterea in summitate capitis tuberculum, in quo itidem vermis crassus latet. Omnes autem vermes brevi sponte excidunt, ac locus per se sanatur. Fiunt varii coloris Psittaci à Tapvyis, deplumando juniores, & cutim variis coloribus inficiendo. *Marcgrav. in hist. Brasil. Avium lib. 5. c. 11.* Horum species sunt

1. *Psittacus maximus Cyano-croceus*, the great blew and yellow Parrat, called the *Machao*, aut *Cockatoom*, rectius *Caba-toon*, a voce.
2. *Maximus alter vertice capitis compresso*, the great flat-crown'd Parrat.
3. *Albus cristatus*, the white Parrat with a tuft of red feathers on his head, for a Crest. *Talis hodie alitur in Ornithotrophio Regio, St. James's Park vocato.*
4. *Viridis, cum alarum costa superna rubente*, the great green Parrat with red pinton feathers.
5. *Poikilorinchos*, the Parrat with a greenish body, and variously coloured feathers above the beak.
6. *Melanorinchos*, the green Parrat with a black beak.
7. *Leucocephalus*, the white-headed Parrat; powdered with black spots.
8. *Cinereus*, the ash-coloured Parrat.
9. *Erythrolencus*, the red and white Parrat.
10. *Torquatus Macrourus*, the little green Parrat with a red Ring about the neck, and a long tail.
11. *Erythroclorus Macrourus*, the red and green Japan Par-raket, aut Perroquet.
12. *Torquatus Macrourus minor*, the lesser long-tail'd Parra-ket, aut Perroquet.
13. *Erythroclorus Torquatus cristatus*, the red and green Parra-ket with a red Crest, and red Ring about the neck.
14. *Erythrocyanus*, the red and blew Parrat, called the Rainbow Parrat.
15. *Erythroxanthus*, the red and pellow Parrat:

16. *Pur-*

16. *Purpureus, the purple Parrat, qualem unper vidimus in Aula alba Regia.*

VII. CORVUS (à Græco *κῠρῶξ* inserto *v.* consono, quomodo ab *ὑλη* est *sylva*; ab *λαῖος*, *levis*: *κῠρῶξ* vero est à *κῠρῶς*, *niger*; ut Grammatici censent:) **the Raven**. Sub quo genere recensentur

1. *Corvus minor, the Carrion Crow.*
2. *Semicinereus, the Roryston Crow.*
3. *Cornix, the Chough.*
4. *Spermologus, Frugivorus, the Rook.*
5. *Coracias Aristotelis, Pyrrhocorax, the Cornish Chough;* (quia in *Cornubia* nostra frequens, ubi etiam vulgo nuncupatur **the Killigrew**.) Est Cornicis magnitudine rostro longiore puniceo. Pedes quoque rubent.
6. *Monedula (quasi monetam edens, quia aurum & argentum asportare & abscondere gaudet) the Daw, aut Jack Daw.* De cujus furacitate ita *Ovidius*.

*Mutata est in avem, quæ num quoque diligit aurum,
Nigra pedes, nigris velata Monedula pennis.*

Graculus etiam dicitur quasi (*garrulus*) & avis est Corvini generis, quæ vocem humanam summa dicacitate imitatur. Cornice minor, tota præter verticem, qui cinereus est, nigra, minime canora. *vescitur* in cibo vermibus, scarabæis, feminibus, & carne. Bis in anno *pullificant*. *Ova* parit ut plurimum quinque, subviridia, maculis fuscis aspersa. Vidi plus semel *candidissimas*, in Ornithotrophio regio cicuratas.

7. *Monedula Torquata, the Helvetian Daw, with a Ring about his neck.*

VIII. PICA (quasi *πίκα*, eliso *T.* à colorum varietate) *πίκα*, **the Pie**, aut **Wagg-pie**. Alarum brevitatem cauda longior compensat. *Caput*, collum, cauda, uropygium, femora nigra sunt: *venter*, & alæ superiores, cum dorsi parte, clypei figura, candidæ. *Remiges* majores decem medio tenus ad nervum candidæ sunt, altera parte cum apicibus extremis virent. Reliquæ superiores & inferiores majores, cum cauda, ex fusco virore splendent. *Rostrum* crassum, nigricans. *Pedes* atrii splendent unguibus nigris. *Carnivora* est. *Ova* & pullos gallinarum populatur. Aviculas etiam capit. *Nidum* in arboribus construit altissimis, ex luto, lana, & pilis, extra & supra spinis munit, relinquens tantum in latere for-

men arctissimum, per quod ingreditur; & hoc eo in loco, quo nidus inaccessibilior est, in opposita ostii parte aliud foramen relinquit, per quod caudam emittat. Ova parit circiter sex, viridia, notulis purpurascensibus respersa. Picæ caro calefacit, exiccat, digerit; & venenis resistit; convulsionibus, resolutionibus & contracturis eximium remedium. *Schwenckfeld*, quem consule. Hujus species sunt

1. *Pica caudata Indica*, the Japan pie, with beak and legs red, head and neck blew; breast and belly white.
2. *Pica Glandaria*, (quia glandibus vescitur) the Jay. (Forte à Joy, gaudium, vel à γαίω, glorior, exulto; quia superbire videatur.) Pedes habet leucophæos, quorum digiti multis articulis flectuntur, unguiculis cinereis quodammodo aduncis armati. Cristam in capite erigit ex plumis antè albidam, maculis nigris variam, retrorsum versus mixtus est ex cæcio, rufoque color.
3. *Mimus*, five *Picus garrulus Indicus*, the Indian Mock-bird, not much unlike the Jay, but somewhat smaller.
4. *Pica marina*, the Sea Pie.
5. *Garrulus Bohemicus* Gesneri, seu *Ampelides* Aldrovandi, de quo mira scribunt, tam quoad internam viscerum constitutionem, quam quoad ingenium.
6. *Pica Brasiliensis*, *Hipporinchos* (à rostri magnitudine,) the great beakt pie of Brasil, aut pepper-pie, because he eats pepper.
7. *Loxia*, seu *Curvirostra* (rostrum enim habet, contra omnium avium morem, ab utraque parte recurvum, crassum admodum & robustum) in plurimis Germaniæ superioris locis frequens; the Cross-beak, aut shell-apple: in Anglia etiam quandoque invenitur; ideoque iconem ejus hic apposui. Avis hæc dicitur etiam *crucifera*, *cruciata*. Paulo major & longior est *Fringilla sanguinea*. Color ei per totum corpus varius; quem tempore & ætate mutat. Nunc enim ad flavum, nunc ad rubicundum, nunc ad viridem, nunc ad cinereum seu griseum magis declinat. Rostrum cornei coloris, cujus summæ partes ac mucrones in Crucis morem invicem transpositæ ac decussatæ sunt. Caput magnum, crura rubent. Nidificant in cavis arboribus, & pullos excludunt. Voracissima est, & nucleis Pinastri & Abietis in cibo fruitur. Semine Cannabis mire delectatur, ac pinguescit. Caveis inclusa ferreis, (lignæ enim confringit) rostro ac pedibus sursum deorsumque, Psittaci instar, repetit. A potu pocillum rostro, si potest, abjicit. Ingenii est simplicis & stolidi: at suavissime modulatur hyeme ac æstate. *Schwenckfeld*.

8. Rbi-



8. *Rhinoceros, Tragopanda* Plinii, aquila major, capite Phœniceo, & cornu prope frontem insignita, *Æthiopiz familiaris*: the **Horned Pie of Ethiopia**. Vide *sis Scaligerum in Exercit.* 231. Sect. 3.

IX. BUBO (à *sono*, quem edit, ut olim docuit *Varro 4. de L. L.* his verbis: *De his (volucris) pleraque à vocibus, ut hæ; Upupa, Cuculus, Corvus, Hirundo, Ulula, Bubo, &c.*) *Búas*, (ob eandem rationem) the **Owl**, aut **Howlet**. Cujus generis numerantur

1. *Bubo Maximus*, Aristoteli ἀσκάλαρος, nec *Aquila minor*, nobis ignotus.
2. *Asto*, seu *Otus* (forte ab *auribus*, unde etiam *Alexandro Myndio* apud *Arthenzum Lagotia*, quod aures habeat leporinas.) the **great Owl with long feathers standing above his ears**. Ex ferrugineo tota flavescit, sed magis ventre.
3. *Scops* (quod *ἰν σκῆπτῳ* habeat *ἰν σκῆπτῳ*, seu noctu maxime cernat)

U

cernat) **the lesser Owl with the like feathers prickt up.** *Turtur* est magnitudinis, *ἄφρων*, coloris ex fulco subrufi, punctis albicantibus per intervalla plurimis. Venter albicat. Crura cinerea, plumosa ad digitos usque. Rostrum aduncum, fuscum. Oculorum iris flavens pupillam exornat nigram.

4. *Aluco* (vel ab Itolorum *Alochone*; vel à Germanorum *Locken*, quod *allicere* significat; ut *Gaza* & *Lazius* desumunt) *ἄλως*, **the Barn-Owl**, aut **White-Owl**.

5. *Ulu* (*ἀπὸ τοῦ ὀλολύζειν*) *Αἰγώλιος*, **the whooping Owl, Howlet**, aut **Gilhooter**. Est fere gallinæ magnitudinis, nocturnæ cognata. Color partis supinæ, capitis, dorsi, alarum, caudæ cinereus, obscurus, ad ravum inclinans, maculis albicantibus & nigris ubivis variis. Venter albet, maculis majusculis fuscis respersus. Caput obtinet grande, rotundum, admodum plumosum, anteriori parte plumulas exiguas, graciles, candidiusculas, in orbem velut flammeum positas. Oculi grandes, pupilla maxima, ex nigro cærulea, circulo ambiente obscure bætico. In horum ambitu ad palpebrarum oras, Lippientium instar, rubescens circulus conspicitur. Superiori tantum palpebra inter nictandum oculus conregitur, latitante periophthalmio, seu tunica crassa dilute cærulea, à supra deorsum porrecta, integrum oculum operiente. Rostrum aduncum, subvirescens. Nares patulæ. Crura habet albicantia, fuscis notis respersa, ad ungues usque leucophæos, aduncos, acutissimos, hirsuta. Digiti quatuor, bini antè, retro, & ad latus singuli. Appendices binæ intestino, qua desinit, hærent.

6. *Noctua*, (quod noctu canat & volet) *γλαυξ*, Minervæ sacra, **the common grey Owl**, (à *glauco* oculorum colore.)

7. *Strix*, *ἀπὸ τοῦ στεγνύναι*, *stridore*, ut conjicere aliquis possit, propter *Ovidii* illud in 6. *Fastor*.

Est illis strigibus nomen, sed nominis hujus

Causa, quod horrenda stridere nocte solent.)

the screech Owl; aliis **Lich**, aut **Leech-Owl**, quasi cadaver ripeta, *Lich* enim Anglo-Saxonice hominis *cadaver* significat; unde *Lichfeldiæ* urbis nomen & insignia, cadaver scilicet humanum ad cœmiterii portam jacens, desumpta sunt.

8. *Caprimulgus*, *αἰγρομήλης* (*αἶψα δ' ἐξ αἰθρῆς πτηναιεύων*, quod *Capras* sugere credatur) **the Goat-sucking Owl**, aut **Night-Lark**, à stridula voce quam vespere potissimum edit; qui reperitur quidem in *Angliæ*, sed infrequens, utrum quod sit ex numero adventurum, an quia *ἡμετέρας ὀλιγακίς φαίνεται*, incertum. Quem in agro *Suffexiæ* maris mihi oculis usurpare licuit, cum *Aldrovandi* *Caprimulgo*

primulgo hand omni ex parte convenit. Ejus igitur fidam, & ex recens occiso desumptam descriptionem arbitror cunctis rerum Britannicarum studiosis pergratam fore.

Caprimulgus nostras, *Cucula* & magnitudine & habitu corporis haud multum dissimilis est: cum tamen longitudine superat, quippe à capitis vertice (qui aliquantulum depressus) ad uropygium, uncias circiter sex, indeque ad extremum caudæ, totidem alias complet, quod huic avium generi inter rapaces proprium videtur: nec ab ullo tamen ex *Zoographis* (quod sciam) hactenus notatum. *Plumarum* & colore, & plusquam byssina mollitie, est *Noctuæ* per similis. *Caput* enim, *dorsum*, *alas*, & *caudam* habet colore cinereo, maculis quibusdam ad albedinem, aliis ad nigedinem tendentibus, passim interspersis, exornata. *Pectore* autem & *ventre* Rusticulam exacte refert, maculis subnigricantibus transversim per intervalla ductis. *Alarum* *remiges* paulo ultra medium, alba & ad figuram ovalem accedente macula singuli insigniuntur. Et ex *Caudæ* quoque pennis aliquot, ex uropygii lateribus prodeuntes, consimili extremitatum tinctura variegantur. *Oculi* insigniter prominentes, & quam pro ratione capitis grandiores; cum nigerrimis, & Gagatis adinstar, splendentibus pupillis. *Rostro* est vix passerinum excedente, ad extremum modice adunco, nigricante, plumulisque tanquam pilis quibusdam, superne ad nares, & inferne sub mento sparsim ornato. *Rictus* oris ingens; ut murem integrum deglutire posse credatur. *Crura*, tibiæque plumulis circumvestiuntur: *Pedibus* passerinos gracilitate & colore imitantibus; digitisque in semilunares, prædæque retinendæ aptissimos *unguiculos* desinentibus. *Natura* quoque est, vitamque agit legregem: non nisi crepusculo lustrum relinquens. Dum vagatur, vocem edit lugubrem, quamque pro omine semper tristi habet, superstitiosum vulgus. *Videtur* ut plurimum insectis alatis, vespis nimirum, Crabronibus, maxime verbò *Cantharis* & *Scarabæis*, quos inter volandum mira dexterritate intercipere solet, vivosque deglutire. Unde non tam *Caprimulgus*, quam *Accipiter Cantharophagus*, Anglice *the Doz-hawk*, audire meretur.

¶ *Nycticorax*, *the Night-Hawk*. Cujus elegantissimam Iconem videas apud *Johannum de Avibus*, tabula 20. Sed ad Ardeolam cineream representandam ab eo designatam.

X. STRUTHIO, *Struthio-camelus*, *the Ostridge*. Non penas ad volandum commodas gerit, sed pilis similes. Alas quidem erigit, sed volare nescit.

XI. EMEU, *the Cassowary*. Hujus admirandi generis aves binas hodie videre licet in Zootrophio Regis nostri augustiss. *Caroli II.*

XII. VE-

XII. VESPERTILIO (quia *vespere* tantum volat, ut *Ovid.* 4. *Meta. lib. 12.*

—————*lucemque perosa*
Nocte volant, seroque tenent à vespere nomen.)

the Bat, aut ~~flitter-mouse~~, ~~flutter-mouse~~, (i. e. mus volitans) aut ~~Bearmouse~~. Cujus plurimæ observantur differentiae, omnes tamen innominatae. In Chinae provincia *Xensi* dicta, Vespertilio-nes reperiri dicit *Atlas*, quæ corporis mole gallinam aut anserem æquent, unde & à Sinis in singulares menfarum delicias quærentur. Græcis *φιδίωμα*, *νυκτερίδα*, *νυκτερίδα* audit *vespertilio*. Est mediæ cujusdam inter avem & murem speciei; corpore instar murium piloso, alis cutaneis, pedibus murinis incurvis. In utraque parte mandibulæ dentes, instar murium, habet. Caret *canda*, cujus loco quasi *uncinulum* gerit, quo se parietibus interdum appendet. Pullos parit viventes, quos mox uberibus admotis lactare solet.

—————*minimam pro corpore vocem*
Emittunt, peraguntque levi stridore querelas. Ovid.

*Avium Terrestrium PHYTIVORARUM, sive Plantis
vescentium Classis.*

Absoluto Avium Carnivorarum Catalogo, ad PHYTIVORAS pergendum; inter quas primo occurrunt PULVERATRICES, tam sylvestres, quam domesticæ, viz.

I. PAVO (vel à *sono*, quem edit, ut *Varro* deducit, *lib. 4. de L. L.* vel à Græco *ταῦς*, *Æoles* enim, quos sequi solebant Romani, interserere in usu habebant *v* consonum, ut *ῥον*, *ῥον*, unde *ovum*, & mutare T. in P. similiter igitur pro *ταῦς*, dixere *ταῖς*, unde *pavos*, & ut postea dixere, *Pavum*, quemadmodum laboriose deducit post *Angelum Caninium Vossius*,) the Peacock. Dicitur vero *ταῦς*, *ταῖς*, à caudæ extensione, ἀπὸ τῆς ταύσεως τῆς πτέρων. *Pupillas* Pavo. Cujus familiæ annumerantur

1. *Pavo albus*, the white Peacock.
2. *Pavo Japonensis*, the Japan Peacock, in vivario serenissimi Domini mei, *Caroli II.* hodie visendus.
3. *Pavo Chinenfis sine cauda*, qui idem videtur cum *Grue Balearica*.

II. GAL-

II. GALLOPAVO, Gallus Indicus, Meleagris, *the Turkey-Cock*. *Gallina Africana, Numidica.* vid. *Schwenckfeld*.

III. PHASIANUS, *Phasidis ales* (nomen dedit *Phasis* Colchidis amnis, ad cuius ostia frequentes convenire à Græcis præditum est, unde *Martialis* in *Xentis*, lemmate Phasianus.

*Argiva primum sum transportata carina;
Ante mihi notum nil nisi Phasis erat)*

the pheasant. *Rostrum* ei crassum, elevatum, pollicis lati longitudine, coloris cornei. *Vertex* capitis eleganti micat cinereo. Inter aures & rostrum ad latera, macula est *coccinea*, nigris punctulis variegata. Supra hanc & prope rostrum *viridis* color elegantissimus totum collum occupat. *Colli* pars, prope pectus, fusco, aureo, & viridi colore adornatur: hunc alba ovalis macula percurrit. *Ala* & *dorsum* totum fere ferruginei coloris ad rufum vergentis. *Pectus* & ventriculi regio iisdem cum collo coloribus, sed obscurius coruscant: prope anum, & in femoribus, ex ferrugineo fuscescit. *Phasiani* in supremo honorum lumine semper habiti sunt.

IV. UROGALLUS, *Tetrix* Aristotelis, Germanis *Aurhan*, Angl. *the Cock of the Wood*. Reperiuntur qui libras quatuordecim Germanicas pendant. Hujus duæ dantur species, *Major*, & *Minor*. *Major*, *Tetrao* Plin. *Gallus Alpinus*, & *Urogen* dictus; corporis magnitudine Anserem fere æquat: colore tam atro, ut tanquam Palumbi collum resplendat. *Rostrum* ei gallinæ, validum, gibberum, fuscum. *Macula* rubra utrinque circa oculos ad tempora insignitur. *Digit*i glauci, utrinque quasi ferrati, seu pectinis instar, tunica aliquatenus junguntur, & unguibus fuscis firmantur. *Femina* ejus Germanis quidem *Grygallus* dicitur: sed male, ut expresse probat, quicam tepissime diligenter considerarat, *Schwenckfeld*.

V. GRYGALLUS, *the Birch-Cock*, (because of the colour of *Birch*,) in sylvis Germanicis haud infrequens sed Britannia ignota. Est utique Urogalli *Femina*.

VI. GALLINA CORYLORUM, *the Hazel Hen*.

VII. ATTAGEN, perdix Asclepica, *the Heath-cock* aut *Grouse*. De quo sic *Martial*. lib. 13. *Epigr.* 61.

*Inter sapes fertur alitum primus
Ionicæ angustus Attagenarum.*

Hæc in Anglia duas habemus species, quarum *Major* vulgo dicitur *the Black Game*, (Mares quippe toto fere corpore nigricant:) *Minor* vero, *the Grey Game*, (quia tam mas, quam femina cinereis maximam partem plumis veliuntur.) Hæc quatuor

X

avium

avium genera, *Urogallus* nimirum, *Grygallus*, *Gallina Corylorum*, & *Attagen* seu *Perdix Asclepica*, nec recte singulatim describuntur, nec bene inter se discriminantur ab ullo Zoographorum. Nam revera *Urogallus minor*, & *Gallina Corylorum*, non specie, sed sexu tantum differunt: & apud nostrates ille **Black-Death-Cock** aut **Birch-Cock**, hæc vero **Death-Pen** nominantur. *Mas* utique collum habet dodrantale, plumis nigricantibus, cinereo diluto colore sparsim interspersis. *Caput* nigrum, *rostrum* breve, gibberum, latum. *Supercilia* & pelliculam circa oculos, in morem Phasiani, pulcherissime rubentia. *Dorsum*, *pectus* & *venter* nigri sunt coloris. *Alarum* remiges candore insigni distinguuntur. *Sub alis* pariter plumis vestitur albissimis: itemque in *canda* bifurcata. *Crura* ad pedum digitos usque plumis fulcis exornantur. Ex albis in *canda* maculis ætatem dignoscere licet: quo majores sunt aves, eo pauciores illas habere feruntur. Degunt ut plurimum in sylvarum betula & corylis abundantium confiniis uliginosis, ut & in ericetis, ubi ex ericæ seminibus pinguescunt. *Famina* vero habitu corporis fere Phasianum, plumarum coloribus Rusticulam majorem refert. *Uterque* gallum gallinaceum magnitudine æquat, carnis teneritudine saporeque superat.

Idem de altero etiam pari, *Attagena* scilicet & ejus *famina* observandum: quas Nostrates, quo hanc speciem à priori distinguant, **Death-poults** (quasi dicas, *Grygalli pullos in ericeto natos*, & **Grouse**, nuncupare solent. Sunt enim Urogallo etiam minore nonnihil minores: Perdicum nempe magnitudinem haud multo excedentes. Et *mas* in omnibus convenire videtur cum Attagine veterum. *Ericeta* potissimum frequentant: nec nisi rarissime reperiuntur in latibulis sylvestribus. Utriusque speciei caro, ventri gulæque in magnifico ciborum apparatu indulgentibus summopere arridet.

VIII. O T I S, (proculdubio ab auribus patulis,) *Tarda* & *Bistarda*, (tarde nimirum volat, ob magnam corporis molem,) **the Bustard**; tribus tantum insistens digitis, sub quibus talus magnus instar musculi conspicitur. *Erythronotus* Olao Magno dicitur, *Tetraon* Longolio. *Alarum* pennæ majores candidæ, circa finem nigræ. *Crura* fusca; digitus antrorsum terni, nullus retro; *Ungues* ut in gallina. *Vola* seu pars interior densa torosaque est. *Lingua* ferrata utrinque acuta. Arboribus infidet nunquam, nec aquas frequentat. *Nidificat* in terra inter segetes. *Caro* ejus dura, nigricans, concoctu pervicax. In cibo laudatur juvenis, si per dies aliquot post jugulationem reservata fuerit. *Interanea* si spectes, hoc sibi peculiare habet. Intestinis diductis & extensis, id quod à fundo ventriculi ad alvum recta procedit, dodrantum est septem cum dimidio: appendices vero duæ ab alvo retrocedunt. Quarum altera tenuior est tres dodrantes longa; altera amplior duos cum dimidio: tres vero isti
meatus

meatus juxta alvum in unam capacitatem conveniunt. Hæc Avis in mediterraneis *Angliæ* partibus frequens est.

IX. ANAS *Campestris*, Gallis *Canne petiere*, quæ Galliæ peculiaris esse traditur à *Bellonio*, qui primus eam descripsit, & à rusticis *Oliva* dictam esse asserit, *the Olive*.

X. STELLA, à *Johnstono* descripta, *lib. de Avibus*, pag. 64.

XL OEDICNEMUS *Bellonii* (ob tibiærum infra genu, propter os, quod valde crassum est, quæ nota vel sola agnosci potest, singularem crassitiem, sic vocatus) nobis prorsus ignotus. Cui subjunxere *Bellonius* & *Aldrovandus* unum & alterum *Oedicnemo* *congeneres*, quorum nos pariter nescii sumus, nisi iidem sint cum Pluvialibus cinereis.

XII. PERDIX, *περδίξ* (αἴμα δὲ περδῖν, eum enim sonum edit) *the Partridge*. Quæ est vel

1. *Græca*, nostratibus duplo major.
2. *Ruffa*, (à rostro & pedibus rubentibus) *the Spanish partridge, with bill and legs red*. Cujus sortis ingentem numerum alit & Insula nostra inter Britanniam & Galliæ Armoricæ littora sita, *Guarnsey* dicta.
3. *Cinerea*, Græcis ignota, sed à *Gessnero* descripta, sub nomine *Minoris*.
4. *Damascena Aldrovandi*, brevitate & crassitie corporis ad *Perdices* nostras accedens, minor tamen & rostrum habens prolixius; pedesque quodammodo luteos.
5. *Alba*, *Lagopus* (à pedibus leporinis, & villosis,) & *Aldrovando* *Perdix Petrofa* (quia in rupibus nidulatur) tanti candoris, ut à venatoribus hoc solo, quod nives superat, visu deprehendatur: *the white and rough footed partridge*, Germanis *Scheerhan*, quasi *Snow-hen* (quia frigore, nive & glacie ita delectatur, ut ubi locis inferioribus liquantur nives, albiora & soli averfa prosequatur loca, in quibus nix perennat.)
6. *Indica* à sono *Tutu* dicta, & descripta à *Job. de Laet. Ind. Occid. l. 10. c. 5.*
7. *pulgaris*, *our common partridge*.

XIII. GALLINA *Africana*, five *Guiniensis*, *the Guinea Hen*.

XIV. ORTYGOMETRA, *Coturnico-mater Scaligero* (*in Comment. ad lib. 8. Arist. de Hist. Anim. cap. 15.*) *Bellonio Rasale*, five *Rallus*, & nostratibus *the Rattle*. Raro, nec nisi metu coactus volat: est cursus velocissimi. Inter herbas & gramen sese abdit, ut raro appareat.

X 2

XV. CO-

XV. COTURNIX (vel à sono vocis, teste *Festo*: vel rectius ab ὀρνῆξ, quod idem sonat; nempe ab obliquo ὀρνυῖν, & πάλιν δὲ C. Nam γ facile abit in C. quomodo deduxit *Servius* in 3. *Æneid.*) the Quail, ab Ital. *Quaglia*, Franco-Gall. *Caille*. Inguviem amplam habet. Veteres eam à mensis amoverunt; quod veneno, Helleboro nempe, alantur. *Plin.*

XVI. CYNCHRAMUS, le Prunier, five Preyer Gallosum; a lauda cristata paulo major, & *Hortulana* non absimilis. In agro Bononiensi & Florentino ex milii esu vehementer pinguescit; unde magno numero deplumata & scatulis asservata, Romam transmittitur, ibidemque magno pretio divenditur.

XVII. GALLUS GALLINACEUS, ἀλέκτωρ, the Poule Cock, aut Roost-Cock; cum suis Generibus variis,

XVIII. GALLINA LANIGERA Sinenfis; cujus lana ovina simillima est: de qua consule *Martinium* in *Atlante Sinesi*, & *Kircherum* in *China illustrata*. p. 196.

Avium, quæ se Pulverant simul & Lavant, Familia,

Secundo *Phytivorarum* loco occurrunt Aves, quæ se pulverant simul & lavant, nempe,

I. COLUMBÆ, (seu quod in culminibus villarum degere soleant: seu quod *lumbos* frequenter colant: seu à Græco κολυμβᾶν, *vinare*, quoniam talis est Columbarum gestus, & bibentes rostrum aquæ diutius immergunt; ut *Gervasi* & *Joh. Passi* visum est,) αἰσῆαι, (αἰς & αἰσῆαι: ἰπᾶν, à nimio amoris affectu) *Doves*. Quæ sunt vel

Domestica, ut,

1. *Livia*, common *Poule-Pidgeons*, aut *Culbers*.
2. *Gutturose* (quia lascivientes, fauces & guttur in ingentem tumorem diducunt) *Plinio Campanæ*, (quia tunc temporis frequentes in *Campania*.) *Croppers*.
3. *Cucullate*, (quia cristam gerunt, Monachorum cucullum referentem,) *Jacobins*.
4. *Gyratrices*, (quia in orbem supra famellas obvolitari solent mares, simulque alas tam fortiter concutunt, ut duorum asserum invicem collisorum sonitum superent, unde) *Clappers*, & *Smitters* (quasi percussores.)
5. *Cohæte*, *Helmetts*.
6. *Tur-*

mihi; referente *Scaugero Exercit. 19.* in columbino ge-
nere (quæ bina omnino ova uno nido reponunt, & incubant,) *Y*
observavit *Harvæus (de Gen. Anim. Exercit. 3.)* omnia ova in ovario

ovario congesta, uniusmodi esse magnitudinis, præter bina illa cæteris longe majora, & jam ad descensum in secundum uterum parata. Ut in his numerosi foetus proveniant, non parvus multitudo, sed frequentia; singulis nempe mensibus.

II. PASSERES, (à passim, quia passim volitant; utpote aviculæ vulgares, & ubivis pene se oculis ingerentes,) Σαρδοι, Sparrows. Quorum plures ponuntur species, viz.

1. *Domesticus*, vulgaris, **the common House-Sparrow**. Qui nonnunquam, ludente natura, *Albus* invenitur; & interdum, sed rarius, etiam *Flavus*, qualis ad *Aldrovandum* delatus fuit, ut ipse testatur, *Ornithol. lib. 15. cap. 15.* Proprie *ψάρ*, cujus vox propria *Πιπιλίζαν*, *Pippilat & passer*, & dulce canit *Philomela*. *Rostrum* habet acutum, breviusculum. *Capitis* vertex castaneus, seu ruber. *Dorsum* totum atque alæ partim flavæ, partim nigræ. *Pectus* albet. *Cauda* longiuscula ex luteo fusciscit. *Tibia* & pedes subflavi sunt. *Mentum* atrum, inter quod & verticem color albus est. *Albissimos* cum rubris oculis sæpe vidi.
2. *Maculatus*, flava cauda, *Aldrovandi*, **the speckled Sparrow, with a yellow tail**.
3. *Montanus*, omnium passerum nostratium elegantissimus; **the Mountain Sparrow, with a reddish Crown, a black chin, and white descending from the head to the lower jaw**: unde popularibus nostris dicitur, **the white-Cap**.
4. *Albicilla* (quia caput, cauda, & omnes inferiores partes ex albo lutescunt) **the white tail'd Sparrow living in woods and heaths**.
5. *Sylvestris*, verticem capitis habens ferrugineum ad cinnaberinum vergentem, ab *Aldrovando* descriptus *Ornitholog. lib. 15. cap. 16.* nobis vero ignotus.
6. *Torquatus* (à *Bellonio lib. 7. de Avibus, cap. 20.* descriptus) ab albo torque oculos sub supercilio ambiente sic vocatus; à me nunquam visus. Superne fuscus est, sed varius, & lineolis albicantibus intercisus; inferne ad flavedinem vergit: vertice purpureo. Collum ambit circulus albus.
7. *Passer arundinaceus*, (quia inter juncos & arundines degit,) **the Reed-Sparrow**. Σαρδοις γαρινάκος, *Passer arundinarius*. Felle caret. Ventriculus crassiusculus.
8. *Pusillus*, in juglandibus victum quærens, **the walnut-sparrow**.
9. *Brachyurus* nostras, (utpote cui cauda admodum brevis,) **the curt-tail'd Sparrow, inclining to yellow all except the**

the breast and belly, which are whitish.

10. *Stultus Bononiensis Bellonii*, loco recens citato.

11. *Troglodites, the Wren*; *τρογλοῦς*. *Schwenckfeld*. Adversus calculum renum & vesicæ maximopere commendatur, si integer, evulsis pennis, sale conditus, crudus devoretur. Novi quosdam, qui quotannis unicum comederunt, & ab affectione illa minus fuerunt vexati. *Schwenckfeld*.

12. *Canarius, the Canary-bird*.

13. *Indicus*.

1. *Macrourus, Long-tail'd*.

2. *Brachyurus, Curt-tail'd*.

3. *Sine Uropygio, Rumpless*.

4. *Porphyromelanus, red and black*. Omnes ab *Aldrovando* descripti, *Ornith. lib. 15. cap. 22, 23. 26, & 27*.

14. *Embryza, tam alba, quam pratensis*; utraque *Gesneri*. *Avis merula* congener. Dicitur etiam *Hordeola*, quod in superiori fusci rostri parte, tuberculum hordeacei grani similitudine conspiciatur.

15. *Passer solitarius, Sturno* haud absimilis. De quo consule *Aldrovandum* in *Ornitholog*.

Granivorarum CANTANTIUM Classis.

INter Aves GRANIVORAS, aliæ sunt CANORÆ ut

I. CARDUELIS, (à *carduo*, cujus seminibus victitat ut plurimum,) *Chrysomitris*, *Aurivittis*, (ab aurea in alis vitta,) *ἀυράδης*, & *Avis Fovis* (propter eximiam venustatem) **the Goldfinch**. Quem *Scaliger* *Biopungvor*, *industrium* ad victum facit.

II. SPINUS; seu *Ligurinus*, (*ἄλξις ὁ λυγρὸν ἔφωνε*, à vocis argutie,) **the Siskin**: quem *Gesnerus* eandem avem cum *Serino* quasi *Syrene*, à vocis dulcedine, facit. Nec immerito quidem, ut ex simul collatis descriptionibus colligere est. Minus recte autem alii cum *Lutea*, sive *Luteola*, quam nostrates *Powling*, aut *Yellow-hammer* vocant, confundunt. *Spinus* siquidem est rara avis, in frigidioribus regionibus non nisi rarenter apparens, nec in Anglia plus quam semel vel à *Turnero* visa: *Lutea* vero etiam rusticis probe cognita nostratibus.

III. FRIN.

III. FRINGILLA, (quasi *Frigilla*, seu quod *frigus* cantu prænunciet : seu quod plures in frigore convolent :) Aristoteli *Spiza*, **the Chaffinch** ; quasi *palearia*, quia hyeme sævientem, *palea* exhorreis abjecta ut plurimum victitat.

IV. MONTIFRINGILLA, **the Bramble, Brambling**, aut **Brier-finch** ; utpote *rubis* sæpe infidens, eorumque fructibus victitans.

V. CHLORIS, Fringilla viridis, **the Green-finch**.

VI. LINARIA (quia cibis ipsi est *Lini* semen) **the Linet**, aut **flax-finch**. Ad cujus familiam referuntur

1. *Linaria rubra* (*Gesnero*, à coccineo verticis colore, sic dicta) **the Red-headed Linet**. Advolant aliquando turmatim, & fere pestilentiam brevi futuram circa *Norimbergam* indicare putantur
2. *Linaria Marina Aldrovandi*, quæ rostro lutea, vertice minia- cea, pectore & ventre candicans est : in Septentrionalibus *Anglia* littoribus haud infrequens, sed uti vulgus affirmat, è *Germania* advolans, ubi *Syntel* nominatur.

VII. CITRINELLA (à colore citrino, sereno enim intensius flavescit) quam Galli *Tarin*, & *Thracipidem* Aristotelis esse opina- tur *Bezonius* : **the Yellow-Hammer**, aut **yellow Amber**.

VIII. ALAUDA (seu à *Laudando*, i. e. cantando ; seu quasi *Aluda*, à ludendo, quia ludunt & canunt in aere) Græcis veteribus *χίεες*, & *χρυσόχλωρος* ; modernis *πυλαίτις* : **the Lark**. Alauda adeo sublime volat, ut fugiat visum : vocem simul cum volatu attollit, quasi velit exaudiri. Scandit vero non per gyros, sed quasi perpen- diculo, interpellatis tractibus, ut *Pica* aliquando. Cujus species sunt

1. *Galerita*, Cassita, Cristata, **the Crested Lark**, aut **Cotswold- Lark**. *Κορυδαύς*, ἀπὸ τῆς *χέρας*, galea.
2. *Arborea*, **the Wood-Lark**.
3. *Pratensis*, **the Tit-Lark**.
4. *Calandra* (ἀπὸ τῆς *καλῶς* ᾄδαν, à suavitate cantus) aliis, sed falso, *Acredula* ; **the Bunting** ; im omnibus fere conveniens cum *Alauda*, nisi quod paulo major sit, & calcaribus multo brevioribus armata. In arboribus & fruticibus summa semper cacumina petit, quibus diu immobilis infidens, suavissimas cantilenas modulatur.

IX. FICEDULA, *Συγγαλὶς*, Italis *Beccafico* ; *Avicula* ficubus & uvis victitans : ut pulcre his versibus testatur *Martialis* ;

Cum

*Cum me ficus alat, & pascat dulcibus Uvis,
Cur potius nomen non dedit Uva mihi?*

Descriptionis defectum supplebit Effigies hic inserta.

Ficedula

ad pag. 89.



BACCIVORARUM Canorum Classis.

E Baccivoris Canoris sunt

I. TURDUS (forte ex *Surdus*, mutato S in T. quod crebro fit; nam usque adeo surdus vulgo perhibetur, ut proverbio locum dederit, *καρόντος* *αἰχλὴς*, *surdior Turdo*: vel potius quasi *tardus*, A in U abeunte; ut à *labor*, *lubricus*, à *quatio*, *concutio*. Sic enim *Isidorus lib. 12. cap. 2. Turdi à tarditate dicti: hyemis enim confinio hoc est, in fine autumnii, se referunt*.) **the Thrush, song Thrush, aut Throfile, aut Davis.** Cujus species sunt

1. *Turdus Viscivorus*, Aristoteli *ἰξοκόπος*, **the Diletoe Thrush**
Z aut

aut *Shreitch*. Primarius in suo genere, & reliquis major, paulo infra picam. *Capite*, alis & ventre fulcus; plumis tamen juxta caudam aliquid flavi admixtum est. *Pedes* digitique flavescent praesertim posteriore nervo tibiæ. *Ungues* & rostrum nigricant. *Collum* parte prona, venterque totus nigris punctis in albicantibus plumis & alicubi flavis variant. *Plumæ* sub alis candidæ. In sylvis vivit, visci, aliarumque arborum & fruticum baccas devorans.

2. *Trichas*, Turdus *Pilaris* aliis *Collurio*, the *fieldfare*, aut *fieldfare*. Nunquam aut raro in æstate in *Anglia* visitur; hyeme vero tanta illorum è *Norwegia* redeuntium multitudo, ut nullius avis major. Volat gregatim, & inter volandum obstreperus est.
3. *Illas*, nonnullis Tyllas, the *wind-Thrush* (because coming in high winds into England, in the beginning of winter.)

II. MERULA (quod *mera*, i. e. sola volitet) *μέρουρα*, *Nigretta* (à nigro colore) the *Black-bird*, aut *Dulle*. Magnitudine est turdi: *rostro* longiusculo, recto, cereo; pedibus aterrimis; colore nigro & splendente. Colorem rostri & plumarum, pro temporum diversitate, mutat. Non nisi anno postquam natæ sunt, rostrum *buxæum* habent; pulli enim nigrum habent. Non nisi vere ineunte *canunt* mares, alio tempore muti. Hyeme etiam strepit, & tumultuose voculatur. Fæmina pallet. Hujus species sunt

1. *Leucocephalus*, the *white-headed Dulle*, ab *Aldrovando* descript. *Ornithol. Lib. 16. cap. 6.*
2. *Candida*, ab eodem *Aldrovando* notata.
3. *Montana* Germanorum, à nobis nunquam visa.
4. *Saxatilis*, quæ eadem avis videtur cum *Caryocatactæ* *Gesneri*.
5. *Rosea*, quam in omnibus convenire arbitror cum *Italarum Sturno Marino*.
6. *Brasilensis*, à *Bellonio lib. de Avibus, cap. 27.* descripta.
7. *Indica*, *Apos* dicta (à brevitate pedum) quam adumbrat *Aldrovand. Ornith. l. 16. c. 16.*

III. STURNUS (ἀστὴρ στερν, quia se magna vi sternat humi ex alto,) *σαρπδαες, βύττα*, the *Starling*, aut *Stare*. Qui nonnunquam reperitur *Cinereus*. Dicitur etiam *βύττο*. *Hæsyeb. & Varin. πόλμυς*. Avis est Merulæ fere magnitudine, variis coloribus picta: ut plurimum nigra, cum splendore insigni, ut etiam in pectore, ventre, alis, & prope oculos viridescat: emicante juxta collum præcipue, cuprea rubedine, maculis albis distincta, quæ aliquando

quando rubescunt, nonnunquam flavent. *Alarum* pennæ extremitatibus luteæ sunt. *Cauda* brevis & nigra. *Rostrum* robustum, longiusculum, acutum, luteum, in fine fuscum. *Pedes* subrubentes: *ungues* nigri. Voracissimus est. Linguam habet latam, & perfecte loqui discit. Huc spectat *Sturnus Indicus* à *Johnstono* in *Mantissa*, numero 6. descriptus.

IV. COCCOTHRUSTES vulgaris, (quod rostro suo, quod durum, robustum, & permagnum est pro corporis proportionem, coccos, & interiora ceraforum grana confringere soleat,) *the Grosbeak*. Avis quidem in Anglia infrequens, & hyemis confinio nobis adveniens, verisque initio se rursus subducens. Hujus generis unam, à meipso sclopeto confectam, & pulvere aromatico conditam, in Pinacotheca inclytiss. *Societatis Regiæ*, inter rariora rependam haud ita pridem curavi. Cujus Iconem pag. versæ appositam habes. Nostratum nonnullis *Haw-finch* dicitur. Cantus ei peculiaris, cymbalorum fere æmulus, non insuavis. Ut caput magnum, sic etiam ingenium crassum & stolidum obtinet. Caro ejus non improbatur, quamvis sit amaricantis saporis. In cibo calculosis proficius. Rostrum ei insigniter magnum, durum, validum, breve, crassum, fuscum, tantillum subrubens. Color capitis ex flavo rufus: in pectore ac ventre ex cinereo rubicundus, cum macula sub gutture nigra. Pennæ alarum superius nigricant, in medio albescent, in imo Indici sunt. Collum pronum utrinque ad latera plumis vestitur cinereis. Dorsum ex rufo nigricat. Propius caudam nigrae sunt pennæ, extreme albicant, præter medias duas, quæ totæ cinereæ.

Coccothraustes Vulgaris.

V. COCCOTHAUSTES Virginiana, Cardinalis (quod gallerum coccineum gestare videtur) the **Virginian Nightingale**. Apud nos in caveis alitur à curiosis: idque tam ob eximium colorum fulgorem in plumis coccineis; quam propter miram cantus dulcedinem.

VI. CARYOCATACTES, Nucifraga, the **Nut-breaker**; aut **Nutjobber**: quæ nobis nihil aut parum differre videtur à *Pico Cinereo*, seu *Sitta*; uti ex utriusque collatione pateat.

INSE-

INSECTIVORARUM non Canorarum
Classis.

INter Aves Insectivoras aliae *Canorae* sunt; aliae *Non-Canorae*.
Quales

I. **PICUS MARTIUS**, (quod Marti olim facer: *διδροκορλα-πῆς*, *ξύλοκρηπῆς*, quia arborum truncos rostro perforat: **the great wood-pecker**. Cujus Anatomen vide apud *Aldrovandum Ornith. lib. 12. cap. 30.* Hujus species sunt

1. *Picus Varius minor*, **the Piammet**, aut **lesser wood-pecker**, speckled with black and white on the wings.
2. *Picus Varius major*, quem *πίπερ* vocat Aristotel. **the french pie**; à priori differens, tum quod magnitudine Merulam vincat, tum quod plumæ medio vertice rubicundæ sint, & saturato cocci colore conspicuæ.
3. *Picus viridis*, Aristoteli *χαλιδίς*, **Virio**, **the Dickwall**, **wit-wall**, aut **Green wood-pecker**.
4. *Picus Murarius*, (quia muris turrium maxime adhæret, & vermiculos in eorum rimis venatur,) **the Creeper**, aut **Spidder-catcher**. Passere domestico paulo major, hilaris est, & suavem vocem edit.
5. *Picus Luteus*, *Cyanopus*, ex Persia allatus, **the Persian wood-pecker**.
6. *Picus Cinereus*, *Sitta*, eadem avis cum *Caryocatactæ*, ut supra subindicavimus: **the Nut-hatch**.
7. *Ψύλλος*, *Torquilla*, *Verticilla*, *Verticilla* Scalig. *Collitorques* (à colli circumactu, reliquo corpore interim quiescente,) *κυανιδίων ὄρνεον*, *ἰνυξ* Hesych. **the Wryneck**, aut **Emmet-hunter** (quia formicas in victum inquirat.) *Varii coloris* volucris, ex Picorum genere, alaudæ magnitudine æqualis; passerem domesticum colore plumarum fere æmulans. *Pedes* breviusculi, fusci, in quibus digiti quatuor, ante ac retro bini, subvirides, geniculis quasi distincti, *unguiculis* latiusculis acutissimis. Voce *τεῖξεν* stridere dicitur. *Vivit* in sylvis. *Rostro* ligna tundit, & strepitum, qualem *Picus*, tundendo edit: arbores sursum & deorsum perreptando. *Cossis* & formicis alitur, quas magna celeritate aculeo suæ *lingue* exertæ transfixas vorat, nec unquam illas rostro suo attingit, ut cæteræ aves suos cibos.
8. *Certhia*, *καρδίον*, (quasi ad quæstum astuta,) **Scandulaca**

A a

arbo-

arborum, *δριποράγος*; **the Dry-eye-creeper**. Est Regulo seu Passere Troglodyte paulo minor. *Rostellum* habet longiusculum, acutum, prædurum. Superius ex fusco rubens, inferius albet. *Linguam* emittit tenuissimam, acutissimam, fere osseam.

9. *Merops*, (ἀ μερμηϛ ὀπίς) *μελιπόραγος*, **Apiaster, the Bee-eater**. In *Creta* Insula tam vulgaris est, ut nusquam non in ea conspiciatur: reperitur autem & in *Italia*; in *Anglia* autem rarissime aut nunquam. Magnitudine Sturnum paulo superat. Mari rostrum est longum, durum, ad instar falcis messoriae arcuatum, & quasi triangulum. Oculorum Iris ita rubet, ut aliam omnem rubedinem splendore excedat. Fœminæ color ubicunque minus intensus. Tergus quodammodo virescit. Venter ex albo & cæruleo mistus, cum macula flava sub mento ad aures usque utrinque ascendente. Cæterum, quia Avis est nostratium plerisque invisâ, & quia forma ejus multo facilius, certiusque ex Imagine, quam nuda descriptione concipiatur; En! *Apiastri* maris, quem nobiliss. Vir, *D. Thomas Crew*, Eques Auratus, necnon *Baronis de Crew* filius, hæresque meritissecus, secum in *Angliam* attulit ex *Italia*, mihiq; inspiciendum exhibuit, *Effigiem* hic habes, Sculptoris manu ita solerter delineatam, ut Avis vera esse, non glyptice simulata videatur.

Omnibus istis *Picorum* generibus, magnitudine tantum & colore differentibus, *Rostrum* inest longiusculum, durum, robustum: quo arbores pertundant. *Lingua* item longa, acutissima, in extremitate quodammodo cartilaginea; ad lancinandos vermiculos. *Pascuntur* formicis, & coxis. Perreptant arbores, humi raro consistunt; scanduntque in subrectum, felium modo. In cavis arborum *nidificant*; volantque quasi per saltus.

II. CÆRULEO, **the Clot-bird, Smatch**, aut **Stone-check**; de quo videatur *Turnerus, de Avibus*.

AVES.

95

A a 2

&

& in proximo confidunt. Ubi illi ausi sunt, & jam possunt; illæ verberant, atque extra ædes exigunt. Foris autem simul cum illis ludunt. *Scaliger*. Dum garrit aut cantillat *Hirundo*, *trinsare* dicitur. Hujus species sunt *Hirundo*

1. *Agrestis Rustica*, the rough-footed Swallow.
2. *Riparia* (quia ripas fluminum excavant, & internidificant) *Drepanis*, *Falcula* (à cauda falcata) the Sand, aut Bank Warten, aut Western.
3. *Apos major*, *χρυσέας*, the Horse-Warten, aut Swift.
4. *Apos minor*, the Wartlet. *Apes*, *Depes* (non quod sit sine pedibus, sed quod iis haud multum utatur). *Hirundo saxatilis*, seu *speluncaria*.
5. *Marina*, the Sea-swallow.

V. PARUS (quasi parvus Mus) *Egithalus*, (ab impetu, quo volando utitur,) the Tit-mouse. Cujus species sunt

1. *Parus major*, Carbonarius, ater, the Cole-mouse.
2. *Parus minor*, the Dun, (à vittato capite in morem *Monialium*.)
3. *Parus Palustris*, *Turnero Schenicklos* Arist. the Black Cap, aut Fen-Titmouse. *Parus fuscus*, *Atricapillus Aldrovandi*.
4. *Parus Caudatus*, *οὐροῦς*, the long tail'd Mountain-Titmouse, with a white Crown. Colonienles in Germania *Wynstepher*, i. e. wine-tapper, vocant, quasi vini promum: Gallis vero *Mourier* audit.
5. *Parus Cristatus*, the Crested, aut Juniper Titmouse (quia degit circa Juniperos.) *Avicula elegantissima*, tum ex subviridi crista, tum ob odorem juniperinum quem exhalat, insignis.

VI. MOTACILLA, *Σκουμπὺς*, *μύμυς*, Cauda tremula, (à motitatione caudæ, the washer, aut water-wagtail. Cujus species sunt *Motacilla*

1. *Alba*, *Albicula*, *Aristoteli Cnipologus*, the white bellied wagtail, aut common Dish-washer.
2. *Flava*, the yellow wagtail.
3. *Spizola Bononiensis* ab *Aldrovando Ornith. lib. 18. cap. 26, 27.* descriptæ. white-throats.
4. *Stiparola*, *aviculæ* pariter *Italicæ* ab eodem ibidem descriptæ. Nomen à *stipula* est; quod Autumno, demessa segete, inter stipulas frequens gregatim volat. Capitur nocturno tempore cum alaudis, retibus tractoriis.

5. Mu-

5. *Muscicapa*, **Gnat-snappers**, quarum quatuor genera depingit *Aldrovand. Ornith. l. 18. c. 28.*

VII. RUBETRA, Rubicola (quia rubos incolit.) *Melanocephalus* (à capite nigro,) **the Stone-chatter**, **Blackberry-eater**, **Porttetter**, aut **Black-Cap**.

VIII. RUBECULA, Erithacus (à rubro pectoris colore) **the Red-breast**, **Robin-red-breast**, aut **Ruddock**. Hoc sibi peculiare habet, quod nunquam fere in eodem saltu nisi una reperitur; unde *Phavorino* ὄρνις μονοῦ, ἢ μονοῦ ὄρνις, Avis solitaria dicitur, & solitarie pascens: & natum illud proverbium, Una arbor non capit duos Erithacos. In cavea cum aliis avibus inclusa, cum iis strenue pugnat. Parem enim non facile admittit, & continuo inter se pugnare solent ad cadem usque: est *dorso*, capite, superiori alarum parte, & cauda, cinereo obscure flavente. *Pectus* totum exornat color aurantius, ad ferrugineum accedens. *Venter* albus totus. *Caudam* 12. pennis instructam saepe motitat. *Alarum* remiges nigricant. *Pedunculi* fusci, lingua fissa. *Rastello* armatur nigro, gracili, acutissimo, ac proinde ad vulnerandum aptissimo.

IX. RUBICILLA, Pyrrhula, **the Woodpecker**, aut **Bulfinch**.

X. RUTICILLA, Phoenicurus, **the Redstart**, aut **Redtail**. Quæ tota æstate nobiscum degit, appetente vero hyeme aut avolat, aut in murium cavernulis se abscondit, & usque ad æstatis reditum dormit. *Cauda* ei ex luteo phoenicea, pennis duabus exterioribus nigricantibus. *Pedes* graciles nigricant.

XI. ANTHUS, Florus, Gallorum *Brant* *Bellonio*, hinnitum equorum imitans; **the Brighing bird**. *Aldrovandus* confundit cum *Sipola*, cum & pulchra sit, & omnia fere ea, quæ Antho *Aristoteles* adscribit, admittat.

XII. CANNEVAROLA Bononienfium (quod in viridi crescenteque cannabe & niduletur, & degat) Germanis **Grasmusch**, Angl. **the Titling**. Quæ Lusciniam tam exacte corporis figura exprimit, ut nisi paulo esset minor, nec tam rufesceret, prorsus eadem videretur.

XIII. OENANTHE Aristotelis, vitiflora seu vitifera, (vel à colore simili uvis germinantibus: quod vini tempore appareat: vel quod uvis delectetur) Gallis *Cul-blanch*, Italis *Culo bianco*, **the White-throat**, **white-tail**, **Horse match**. In montanis plerisque locis, maxime vero in comitatu *Suffexie* frequens reperitur; & circa mensis Junii medium vehementer pinguescit; sub Septembris finem aufugit, nec uspiam in *Anglia* totam hyemem comparet. In agro *Warwicensi* dicitur **fallow-Smiter**.

XIV. LUSCINIA (quod luctuose canere existimatur, atque esse ex Attica Progne in luctu nata; quod in lucis canat; seu quod

B b

ante

ante lucem) Philomela (quasi $\phi\iota\lambda\omicron\varsigma\alpha\delta\mu\epsilon\lambda\epsilon$) Ales Pandionia; **the Nightingal**. Græcis Αηδών , ab $\alpha\acute{\alpha}\delta\epsilon\alpha\iota$, vel $\alpha\acute{\alpha}\iota\alpha\delta\epsilon\alpha\iota$, quod sine intermissione fere *canat*. Huic *crura* oblonga, *ungues* subtiles, aliquantulum incurvi: *Lingula* brevissima. *Oculi* ampli, parum protuberantes nigricant. Cujus speciei est & *Luscinola Bellonii*, Itolorum forte *Giarola*; avis non obvia, quamque mihi videre nondum contigit: dici tamen commodissime potest, **the lesser Nightingal**. Nominatur etiam *Luscinia montana*. Amænis ut plurimum, & fruticosis montium locis degit & nidificat.

XV. UPUPA, Græce ὑπούρα , vernacule **an Hoopoop** (proculdubio à *sono*, quem volatura edere solet,) Germanis (quibus frequens est) **ein Weidehopf**. Avis est magnitudine Turdi; alis per intervalla fuscis, albis & nigris pennis interstinctis: Cristam habens, ab ea parte rostri, qua capiti committitur, ad extremum usque occiput porrectam per longitudinem; quam pro affectibus suis aut contrahit, aut dilatat, eodem prorsus modo quo Equus aures arrigit aut demittit. Tibiis est valde brevibus, alis obtusioribus, & lentiori volatu. In *Angliam* raro venit. Hyeme tamen superiori, Vir quidam Generosus, mihiq; veteri amicitia conjunctus, unam decimo circiter lapide à Londino interfecit, & mihi mox donomisit: cujus *effigiem*, à peritissimo Sculptore descriptam, paginae huic, raritatis causa, adjunxi. Avis est haud magis plumarum varietate ornata, quam spurcitie ac morum foeditate infamis. *Nidum* enim ex stercore humano fingit in arboribus excavatis, & circumlinet, ut foetore suo homines à nido arceat: unde proculdubio est, quod vulgo **the Dung-bird** dicatur. Et *Pollux* πολύζων scribit: certe insuavem edit vocem, *Cuculi* non absimilem. Unde fortassis alio nomine, **the Hooper**, insignitur quasi incondite exclamaret.

Avium

ad pag

Vpupa.



Avium AQUATICARUM Palmipedum Classis.

SEquuntur nunc Aves AQUATICÆ quas supra dividimus in
Palmipedes, & Fissipedes.

Bb 2

E PAL.

E PALMIPEDIBUS sunt

I. ONOCROTALUS (ab ὄντος, *asinus*, & κρόταλον, *crepitaculum*; nempe quod collum in aquam immergens, & spirans, rostri crepitu asini ruditum quodammodo imitatur.) *Pellicanus*, **the Pellican**. *Sabaudi* vocant *gutturifam*, i. e. strumofam, ab *ingluvie*, quæ in gutture strumæ instar prominet: & Arabes *Alhansal*, i. e. *ingluviem*, ac si tota avis sit ingluvies: *Romanis* vero *Truo* dicitur; nempe quod *trua* sit vasis genus, de quo consule *Bochartum* in *Hierozoic. part. II. lib. 2. cap. 20*. Plures hujus generis visuntur in *Serenis. Regis* nostri Vivario, ab *Imperatore Muscovitico* dono transmissi.

II. Avis *Diomedea* (ab insulis *Diomedis* sic dicta, licet *Aldrovandus* *Artennam* hodie nuncupari, & nullibi nisi in insula sanctæ Mariæ de Tremiti reperiri, expresse affirmet.) à *Salmasio* in *Exercit. Plinian. & ad Solin. cap. 2.* descripta.

III. LARUS (vel à garrulitate, quia λαλος; est enim avis clamosa: vel quasi λαβος, à vorandi impetu vel à *Laris* pisciculis, quos comedit,) **the Gull**, aut **sea-Cobb**. Cujus species sunt

1. *Larus Cinereus Major*, *Gallis Grison*, *Anglis Cornubiensibus*, apud quos frequentissimus est, **the Ganet**, reliquis vero **the great grey Gull**, aut **Herring-Gull**.
2. *Larus Cinereus Minor*, **the lesser grey Gull**,
3. *Larus Piscator*, **the fisherling**, aut **plunging Gull**: in flumine *Sabrina* dicto, prope *Bristoliam*, turmatim volans, & pisciculis captandis inhians, colore subnigricante.
4. *Niger*, (quia capite, rostro, collo & pectore nigricat) **the black-headed Gull**. Quales ipsemet saepe & vidi, & inter volandum sclopeto transfixi, in flumine *Thamisi*: à quibusdam **the shear-water** vocatur.
5. *Gavia*, **the sea-Pewee**.
6. *Cataracta*, (quod cum impetu ad capiendam prædam ex alto se præcipitem dare soleat,) **the plungeon**.
7. *Cephus*, **the puet**; Avis passim obvia.

IV. ANSER BASSANUS (ab insula quadam in Scotia, *Bass* dicta, non procul *Edinburgo*, ubi & nidificat, & degit: **the solan Goose**. Corporis *magnitudine* anserem minorem, colore plumarum sturnum proxime accedit. At *rostro* armatur tres circiter digitos longo, nigricante, duro, acuto, ad transfigendos pisces, præsertim *haleces*, quibus insidiatur, aptissimo. *Alis* longissimis diu se in aere librans prædæ inhiat.

V. PHALACROCORAX (ex φαλακρος, *calvus*, & κωξ, *corvus*)

corvus) the Cormorant, in Cornubia the Shagg.

VI. GRACULUS PALMIPES, Corvus marinus, Mergus magnus niger, the Coot, aut Sea-Crow.

VII. MERGUS (quia aqua se mergit) the Diver, aut Dourker. Cujus varia genera sunt.

1. *Mergus Rhenanus*, quibusdam Monialis alba, the white Dun-diver. Magnitudo ei *anatis* fere, longitudinis cubitalis. *Rostrum* obtinet subrubens, canaliculatum, in acutum desinens, tres digitos longum. *Cristata pluma* circa verticem & collum supremum eminent, superius nigræ, ad latera rufæ, instar pilorum vulpis. *Dorsum* & alarum majores pennæ fusæ, minores albæ sunt. Parte *prona*, pectore & ventre candicat, plumis fere niveis. *Crura* juxta alvum fere retrorsum porriguntur, glauci coloris, natationi potius quam ingressui apta, femoribus in ventre conditis. *Digiti* pedum terni, lati, adhaerentibus membranis, sed aliquousque divisi, non, ut in cæteris aquaticis, conjuncti; *unguibus* omnino latiusculis, præsertim medio, fuscis. *Cauda* caret.
2. *Glacialis*, (quod per summa frigora in aquis nondum glaciatis facile capiatur,) Norwegiæ & Islandis frequens, apud nos rarissime visus. Historiam ejus petas ex *Olai Wormii Musæo*, pag. 304.
3. *Longirostris*, the lesser Cormorant.
4. *Ruber*, the Red-headed Diver.
5. *Cirrhatus*, seu *Cristatus*, (à duplicata crista, eminente ad utrumque capitis latus una, auris instar :) Bellonio *Uria*, the *Ratte*.
6. *Merganser*, cui caput cum tertia colli parte ex viridi nigricat, collum reliquum cum aliquo pallore album est, inferior colli pars, & dorsum nigrescit; plumæ ventris & supinæ caudæ gilvæ sunt: crura & pedes, cum membranis inter digitos & rostrum; minii colorem habent. Anser paulo major est, & pondere interdum ad libras duodecim accedit. In *Islandia* frequentem esse à Mercatoribus audivi; sed in *Anglia* rarissime visitur. Contigit tamen, ut, dum anno superiori, nempe 1664. in agro *Norfolciensi*, non procul à mari commorabar, medicinam Nobili cuidam faciens; Merganserem unum in piscina natantem interficerem. Cujus exuvias, pulvere aromatico refertas, in hodiernum usque diem servat Musæum *Societatis Regiæ Londinensis*, ubi cuivis eas contemplari liceat.
7. *Colymbus*,

1. *Major*, the great Arsefoot, aut *Didapper*, aut *Dourker*.

C c

2. *Minor*,

2. *Minor, the Dab-Chick*, & Cornubienſibus *the diving Billegew.*
8. *Morfex*, tota nigra, roſtro ferrato & valido: quæ ſub aqua mergens, anguillas capit: *the Teſler puffin* ab incolis inſulæ *Veſtiæ* dicta.
9. *Harle*, *Scheladrachus*, *the black Diver*, & *Norfolciæ* incolis *the ſhell-drake.*
10. *Mergus Americanus*, quem luculenter depingit *Nieremberg. Hiſt. Exot. lib. 10. cap. 27.*
11. *Mergus Arcticus*, ſeu *Farrenſis*; cujus hiftoriam reliquit *C. Cluſius, lib. 5. Exot. cap. 5.*
12. *Fomoria*, *the Gullam*, quam ſemel vidi in *Ornithotrophio* regio prope *Londinum*; eo, raritatis ergo, ab una ex inſulis *Hebridibus* occiduo *Scotiæ* lateri adjacentibus, delatam. Avis erat marina, palmipes, ex genere *Mergorum*: corporis habitu minorem *Colymbum*, magnitudine *Fulicam*, plumarum ornatu *Picam* vulgarem repræſentans. Caput quippe, dorſum, & alas (quas perexiguas gerebat, nec ad volandum comparatas) plumæ nigræ contegebant, adeo molles & æquales, ut *Holofericum* nigrum æmulerentur. Venter autem eximio erat candore inſignitus. Cujus ex parte poſteriore, ad ipſum prope podicem prodibant pedes nigricantes, breviculi, adeoque imbelles, ut avis ad terram ex alto invecſta, non niſi erecto cælum verſus pectore, ac vacillantibus alternatim veſtigiis, incedere valeret; quaſi fuiſſet ad natatum duntaxat deſtinata. Oculos habuit ex atro reſplendentes. Roſtrum quoque nigricans, rectum, longiuſculum, in extremo acutum, piſciculis quibus viſcitabat, tranſigendis accommodatum. Caudam adeo curtam, ut nullam habuiſſe juraret quis perfunctorie aſpiciens. In aquæ fluentis canali piſculento ſervata, haud diu tamen captivitatem ſuam ſupervixit.

VIII. AVOSETTA, Itolorum *Spinzago d'acqua*, *Recurviroſtra*; *the ſcooper*, (because his long narrow beak, arched upward, reſembles the long crooked ſcoop, with which Dutch Mariners throw up water to wet their ſails.) Sub hyemem gregatim convolant in Occidentalia *Angliæ* litora, & poſt menſem unum aut alterum diſcedunt, in oras forſan frigori minus obnoxias. De eis haud paucas olim, dum adhuc juvenis eſſem, globulis plumbeis confodi, in margine fluminis *Sabrinae*.

IX. TROCHILUS (*ὄρνις τῆς ῥάβδου*, quia ſemper currit) *Corriva*, ſeu *Tabellaria* Aldrovandi, *the Trochilus*, aut *fin-footed Hummer*. Hoc me ante biennium ditavit doctiſſimus Collega meus,

meus, D. Dr. Merret, sagacissimus rerum naturæ indagator.

X. CYGNUS (à Græco Κύκνος, mutato C. in G. unde quidam Cycnus malunt: vel à κυμαίνω, turbare, fodere; quod cœnum turbare soleat, dum cibum quærit.) Olor (quasi ὀλῶ, ὀραῖν, totus candidus) Homero δολιχόσπερος, (quia collum habet longissimum, viginti octo vertebribus constans) **the Swan**; & si pullus adhuc, **the Cygnet**; si ferus, **the Elk**. De Canione suavissima Cygnorum quæ tradita sunt à veteribus, non prorsus vana esse, vel nuperis experimentis comprobant. *Ol. Wormius in Musæi sui pag. 299. & Thom. Bartholin. in obser. medic. Arteriam asperam* habet singularis & admirandæ plane structuræ. Nam Oesophagum subiectum comitata, ad jugulum descendens cum pervenit, non recta, ut in cæteris animalibus, ad pulmones tendit, sed supra claviculas elevata, in costam ossis pectoris seu sterni, quæ ex duobus lateralibus ossibus, & tertio superno his pro operculo incumbente fabricata, vaginæ seu thecæ figuram & usum præbet. Ad hujus finem postquam arteria pervenit, inferne in se instar serpentis reflectitur, & S. literam exprimit; moxque sub priore jam dicta portione ipsi superposita, hanc capsulam denuo egreditur, & claviculis mediis conscensis, harum jugo tanquam fulcro innititur: & ita sustentata denuo in morem tubæ revolvitur, thoraci que cavum subiens, antequam ad pulmones fertur, prius quasi alteram Laryngem efformat. Sub qua arteria in duos canales divaricatur; quorum singuli in medio ampliori capacitate protuberantes, recta in pulmones exiguos, costis retro totos affixos, abeuntes, distribuuntur. Talem structuram & *cantus*, & *respiratio* poscebat. Ne enim, dum aliquando horæ dimidiæ spatio toto capite & collo pronis, vado alimoniam hausturus immergitur, periculum suffocationis incurrat; ex ea arteriæ, quæ pectoris dictæ vaginæ reclusa est, portione spiritus quantum satis suppeditatur. Et *Cantum* quod attinet; duplex ille flexus in eum finem factus videtur, ut vox in ipso revolutæ arteriæ angulo reperiçssa, majori cum clangore erumperet, ac veluti morulæ exiguæ in eo anfractu quiete recreata, vires acquirat eundo.

XI. ANSER (nomen à *sono* factum docet Varro lib. 4. de L. L.) Græcis veteribus χλω, hodiernis χίνα, **the Goose**. Cujus ad Familiam spectant.

1. *Ferus*, **the wild Goose**.
2. *Vulpanser* (quia in cuniculorum foveis, & rupium cavernis, more *vulpis*, nidulatur) *Chenalopex*, **the Bergander**, aut **Burrow-duck**.
3. *Branta*, **the Brand-goose**.
4. *Bernicla*, **the Barnacle**, aut **Scotch-goose**, aut **Clack-guse**.
Quæ eadem forte est cum *Branta*, seu *Brentbo*.

C c 2

5. *Anser*

5. *Anser Magellanicus*, à *Clusio* lib. 5. *Exot. cap. 5. de ab Ol. Wormio Musci sui pag. 300.* fuscus descriptus, **the penguin.** i. e. lingua Cambro-Britannica, **white-head.**
6. *Caprica*, Scotis **Capitcalze**, & eadem forte Anserum species, quam *Cl. D. Dr. Merret* se vidisse affirmat (*in pinace rerum natural. Britannicar. pag. 163.*) in *Cimelio Tradescanti* sub nomine **sqweed**, ex insula Scotica *Basse* dicta, delatam. Quamque descripsisse videtur *Georgius Buchananus*, *Rerum Scotticarum* l. 1. his verbis. In hac Insula (de *Leago* loquitur) rarum & aliis regionibus ignotum genus Avis conspicitur. *Colcam* vocant, magnitudine paulo infra anserem. Ea vere singulis annis eo adventat, pullosque exclusos eoque educat, dum ipsi sibi prospicere possint. Ad id fere tempus plumæ sponte defluentes è toto corpore, nudam destituunt: ac tum demum ad mare se recipit, nec ante proximum ver usquam conspicitur. Illud quoque eis est singulare, quod earum pennæ caulem non habent, sed levi & cui nihil prorsus duri adest, pluma totum corpus velut lanugine vestiunt.

XII. ANAS, (à nando, ex sententia *Varronis*: qua ratione & Græcis *νάνα*, seu *νάρτα*, dicitur, à *να*) **the Duck.** Quæ est vel

1. <i>Domestica</i> , a Came	} Duck. Quæ omnes vi- sæ sunt in vivario Re- gio, St. James's Park dicto.
2. <i>Indica</i> , an Indian	
3. <i>Lybica</i> , an African	
4. <i>Muscovitica</i> , a Muscovian	
5. <i>Cairina</i> , an Egyptian	
6. <i>Fera</i> , a wild	

7. *Anas Platyrinchos Gesneri*, Germanis **Lepelgans** (quod rostrum cochleare figura referat,) **the spoon-bill'd Duck.** Quam ad vivum depinxit *Ol. Wormius*, *Musci sui, pag. 301.*
8. *Islandica*, *Havellda* ipsis dicta, & ab eodem *Wormio* ibidem descripta. Huic plane congenerem ego nuperrime vidi, meumque in usum comparavi anatem quandam, ornithopolis nostris Londinensibus, ob eximiam colorum, quibus undique ornatur, elegantiam ac varietatem *Phasiani marini* nomine insignitam, & in multis à *Gesneri Wormique* *Platyrincho* discrepantem; adeo ut hic loci à me accurate describi mereatur. Corporis quidem habitu & magnitudine, anatem domesticam exacte refert: sed cruribus aliquanto altioribus & gracilioribus incedit. Rostrum habet anthracino nigrore opacum, uncias circiter quatuor longum, ad extremitatem ad instar cochlearis expansum compressumque: sed in apice partis superioris

perioris, apophysi quadam incurva, inque acumen desinente donatum, ac longa denticulorum quasi corneorum serie utrinque armatum. *Caput* & superior pars *colli* nigredinem inter & viriditatem mire splendentem ambigit. *Oculi* lapidis Gagatis politissimi nitorem æmulantur; iride aurea circumabiente. *Pectus* obscure rufescit, sed albedine quadam subter lucente, quemadmodum in Vulpantere nostro. *Dorsum, venter & latera* cum *cauda* cinerum pallorem nonnihil obfuscata gerunt. *Ale* maximam partem cyaneo oculis amænissimo resplendent: reliquo ad ferrugineum divergunt. *Palmipes* est, ut anser: sed *crura & pedes* colore coccineo rutilant. Non admodum in Britannia nostræ litoribus frequens est; capi tamen hic interdum, præsertim ubi sævit hyems, fertur. Certe in universa volucrum palmipedum classe, nullam reperies, huic elegantia formæ, plumarumque pulcritudine comparandam. Quocirca meam avem (indubie sexu marem) ad vivum depingi, oculisque tuis hic usurpandam imaginem objici curavi.



9. *Fusca* (à colore,) quibusdam *Media* (à magnitudine inter Anatem & Querquedulam media,) quam *Gesnerus* eandem facit cum *Rothalsa*, unde *Erythrocephali* quoque nomen meruit: **the Red-headed Widgeon.**

D d

10. Cau-

10. *Candacuta*, **the Cracker** (à strepitu quem rostro vehementer colliso facit) quæ in paludibus Crowlandiensibus, ut & aliis locis Angliæ maritimis frequenter capitur. Ornithopolis Londinensibus dicitur a **Gaddel**.

Ex Anatibus feris nonnullæ adeo familiares reddi solent, ut alias è longinquo alliciant, (unde *Aleatrices*, **Decoy-Ducks** dicuntur) & Aucupes ad congeneres capiendas adjuvent. De quibus *Alciatus* hoc lufit Epigrammate.

*Altilis allectator Anas, & cærulea pennas
Assueta ad dominos ire redire suos:
Congeneres cernens volitare per aera turmas,
Garrit, in illarum se recipitque gregem;
Incantas donec prætensa in retia ducat:
Obstrepitant aliæ, conscia at ipsa filet.
Perfida frudatrix cognati sanguinis ales,
Officiosa aliis, insidiosa suis.*

Præter has Anatum species, reperiuntur apud Cornubienses binæ etiam aliæ; una scilicet tota nigricans, **the Scoter** dicta; altera *Sancti Cuthberti* nomine insignita, quam oculis nondum usurpavi.

XIII. **BOSCAS** (à *βοσκω* *pasco*, quia pastui avidissime indulget: unde & *Pascula* Jul. Cæs. Scaligero audit) **the whistler**. Ad quam referri debent

1. *Boscas Mergens*, **the diving whidgeon**; in Norfolcia, **the smee**. Hæc avis diu urinando spiritum continere potest, & ea nulla alia pernicious se submergit. Id quod ipsemet sclopeto eam petens, multoties expertus sum. Visa enim pulveris pyrii flamma, aquis se condit; antequam grando plumbea co pervenire possit.
2. *Boscas*, aliis *Anas Fistularis*, à sono acutiore, quem fistulæ modo emittit, sic denominata: unde & popularibus nostris **the whewer**, aut **whistling whidgeon**.
3. *Penelope*, **the common grey whidgeon**.
4. *Glaucius* (ab oculorum colore.) Gallis *Morillo*. Quænam avis sit, nondum compertum habeo; nisi eadem cum illa, quam vulgo *Pochard* vocant.

XIV. **QUERQUEDULA** (forte à *κέρκω* *δάμοντι*, à cauda vi-
renti) nonnullis *Boscas Minor*, **the Teal**. Ad cujus familiam re-
feruntur

I. *Anas*

1. *Anas Circia*, quæ mergulo paulo major est, corpore fusco, rostro latiusculo.
2. *Querquedula Cristata*, quam Bellonius *Colymbim* vocat, paludibus agri Somerletensis frequens, & ab aucupibus dicta **the Summer-Teal**.
3. *Kernell* circa Argentoratum dicta, quam nunquam nos vidisse fatemur.

XV. PUFFINUS, Gallis *Macareux*, **the Puffin**, avis maritima, colore fusca, plumis tantum ceu lanugine quadam vestita: Itaque subvolare non potest. Alga & Cochleis victitat. Sale & muria condita, tempore quadragesimæ, vel à Monachis comeditur.

XVI. FULICA (à fuligineo colore) Alberto magno *Mergus niger*, aliis *Pullus aquaticus* nostratibus *Cotta*, **the Coot**. Cujus species est

1. *Cotta major*, sive *calva*, **the Bald-Coot**; Magnitudine est Gallinæ, colore nigro per totum corpus, in collo quidem & capite atro. Rostrum acutum & molle; *sinciput* glabrum, figura ovali, alba pellicula tectum, calvitiei specie; toto capite Gallinam referens. *Alarum* (quæ brevissimæ) ambitus per angustam lineam albicat. *Digitis* pedum membranæ nigræ latæ adherent; divulsæ, ut in *Colymbo*.
2. *Rallus Italicus*, in eo à Fulica differens, quod rostrum habeat nigrum, plus albi in alis & circa oculos coloris, crura subviridia, calvitium nullum, membranas inter digitos non ita dissectas.
3. *Avi* quædam anate paulo major, mergendo victum querens; agri *Cestrensis* incolis (ubi frequens est) à **Cargoes** dicta. Est ex *Mergorum* genere, anate paulo major; rostro longiusculo, nigricante, duro, acuto. *Dorsum*, *caput*, *alasque* superiores color fere nigricans occupat. *Venter* totus albet. *Caudam* desiderat. *Pedes* retrorsum quasi ex albo prodeunt. Semper in lacubus & piscinis amplioribus natahdo, ac urinando versatur; ubi etiam quiescit, rarissime ripas accedens, volans nunquam.

Aquaticarum FISSIPEDUM Piscivorarum
Classis.

E FISSIPEDIBUS *Carnivoris* numerantur

I. CICONIA (forte quasi *Cicania*, à sono quem quatiente rostro faciunt; ut *Isodoro, lib. 12. cap. 6.* videtur: vel à *Cicur*, puta ob benignam naturam) *παραρῖς, the Stork*. Hæc avis, quam sancta pietatis cultrix sit, erga parentes suas senectute jam marcescentes, notum est ex *lege Ciconiarum*, apud *Aristophanem* sæpius celebrata; quæ inde nomen traxit: quamque flagranti amore foetus prosequatur, patet ex incendio Delphensi, quod dum describit *Hadrian. Junius in Batavia histor. cap. 17.* observatum fuit, inquit, "Ciconiam à pabulatione reducem, cum flammæ nido suo immittentes videret, conatam omnibus modis pullos grandiusculos, involucres tamen, eripere mediis ex ignibus; tandem desperata omni ope & quasi conclamata, passis alis in nidum se præcipitem dedisse, pullisque toto corpore oblectis incumbere vitam fuisse, veluti deposita vitæ spe, ultro cum charissimis pignoribus mortem appetituram.

II. IBIS, *Ægypto* peculiaris. Dicuntur tamen & circa *Licham* in extrema *Apfrica*, ubi lacus quidam dulcis est, conspici. In duplici autem sunt apud *Ægyptios* differentia; *Candida* scilicet, quæ ad *Pelusium* tantum non sunt, cum in tota habeantur *Ægypto*; & *Nigræ*, quas *Pelusium* duntaxat alit.

III. PHOENICOPTERUS, *Gallis le Flamman* (à coccineo alarum colore *the Phœnicopter*. Hujus exuvias rite conditas infertatque mihi dono dedit prænobilis juvenis, *D. Thom. Crew*, Eques auratus, *Baronis Crew* filius natu maximus, ex *Academia Montpelien*si in patriam redux. Hic nobis candide notandus occurrit error quidam *Scaligeri* egregius. Is nimirum (*in Exercit. in Arist. histor. Animal.*) peculiare *Phœnicopteri* notas, quibus facillime à cæteris ex *Ardearum* genere volucris distinguatur, satis prolixè describens; *crura* ei *brevissima*, curtosque pedes attribuit, his verbis. "Crura pedesque alis habet concolores, sed adeo breves, ut, cum in homine *Galenus* agnoverit longissimos, huic omnium quæ nota sunt nobis, *Animalium* brevissimos attribuere potuerit. Atqui Avem hanc & cruribus & furis gradiri *longissimis*, omnium quotquot seu vivam seu mortuam contemplati sunt, oculi confirmant. Et quis precor, ullam aliam ex *aquaticarum fissipedum & piscivorarum* classe volucrem unquam conspexit brevibus pedibus instructam? Certe nemo. Neque consentaneum est, ut quas Naturæ consilium ad

ad pisces in stagnis & fluviorum vadis, non natando, sed grallatoriis veluti gradibus vadando, captandos destinaverit, eis crura concederentur tam necessario ad victum quærendum officio imparia. Adhæc, non aliunde fuit quam à proceritate crurum & colli, quod Phœnicopterus olim à *Juvenale ingens* diceretur, *satyra* 11. Ad dam quæ de eadem Ave refert *Gassendus in vita Piersesii lib. 3.* “*Va-*“*rio* factum obtulit ex linguis Phœnicopterorum; tametsi id per“*hyemem*, quoniam ea sola tempestate aves illæ maritimæ ad Are-“*latenses paludes* capiuntur. Parum aberat, quia eæ linguæ exæ-“*quarentur* hœdinis: & quia tamen esca videbatur suavior, nihil“*pronunciavit Varius*, neque divinavit, quousque *Peirescius* illud“*Martialis* extulit,

Dat mihi penna rubens nomen, sed Lingua gulosis
Nostra sapit.——

“Rogatus subinde fuit de sapore carnis Phœnicopteri: excepit au-“*tem* mirari se, cur illam *Apicius* apud *Plinium*, & Imperatores“*Caligula*, ac *Vitellius* apud *Suetonium*, *Helioabalus* apud *Lam-*“*pridium*, & nonnulli alii tantis in deliciis habuissent. Esse enim“*eam* injucundam, aut saporis certe non exquisiti, aquaticarum“*aliarum* instar, cum etiam piscem oleat; unde à Provincialibus ut“*plurimum* abjicitur, exuviaeque solum sunt usui, in fastuosis con-“*viviis*, carnibus aliarum avium obtegendis. Phœnicoptero mo-“*bilem* esse mandibulam superiorem, primus adnotasse videtur *Car-*“*danus*, idque verum esse comperit *Ol. Wormius in Museo pag. 309.* ubi“*capitis & rostri examen* legere licet accuratissimum.

IV. ARDEA (ab arduo altoque volatu) *ipadid*. (quasi *ipadidos*,“*avis* amoris & veneri propria) the *Beron*, aut *Hermhaw*. Quæ“*est* vel

1. *Cinerea major*, the *common*, aut *Alb-coloured Beron*. Est etiam *Cinerea minor*, ab Hollandis, apud quos frequens visitur, & nidulatur, *Quack* vocata, à voce obstrepera; & à Germanis *Nycticorax*, i. e. *Night-raven*, quod nocte præsertim clamat voce absona & tanquam vomiturientis, ut bene observavit cu-“*riofissimus D. Roy, in Itinerar. suo, pag. 38.* Avis hæc, prout à *Belonio* describitur, rostrum habet nigrum, concavum, oblon-“*giusculum*; lineam in fronte ab uno oculo ad alterum candi-“*dum*; in capite & dorso pennas versicolores; alas vero cine-“*reas*. Inter plumas verticem exornantes exoriuntur candidæ“*quædam*, longiores multo cæteris, exiles, aspectu jucundif-“*simæ*.
2. *Alba*, *Cochlearia*, *Plateola*, the *white*, and *spoon-bill'd Be-*
E c *ron*,

- ron, aut ~~Shobeler~~, aut ~~Wre-drumbel~~. Est & alia *alba*, Italica *Garzetta bianca*, rostro longo, gracili, acutissimo.
3. *Garzetta* Italicorum, *the Crvill*.
 4. *Egretta* Gallorum, *the Egret*, aut *red-legg'd Heron*.
 5. *Stellaria*, *Asterias*, *the Bitton*. Quæ hoc sibi peculiare habet, quod *Aspera Arteria* in ea tota continua est, *Larynx* nulla. Unde vox ejus incondita, cui similes illi soni dicuntur, quos *βυμνύς* vocat *Arist. in Problem. Sect. x.*
 6. *Squaiotta* Italicorum, cauda brevi, pedibus viridibus, rostro luteo, in extremo nigricante. Apex capitis triginta plumis constat, quarum mediæ albæ sunt, extremæ nigricantes, in tergo pinnæ elegantes, coloris rubicundi, in suis radicibus albæ.
 7. *Falcinellus*, sive Falcata, *the scythe-bill'd Heron*. Avis magnitudine & tota corporis specie Ardeam referens, eleganti colore, viridi fere, alicubi puniceo admixto, capite & collo fusco, superior pars colli antè albicat, maculis nigris intercurrentibus. Rostrum ei oblongum, tenue, & antè falcatum; unde nomen obtinuit.
 8. *Nigra* Aldrovandi (à colore per totum nigro, collo unice excepto, quod albo torque circumdatur.)

V. AVIS PUGNAX (quia inter mares tanta observatur contentio, ut continuo pugnent, & sese mutuo occidant, donec cum foeminis numero pares evaserint: unde *Belgi* vocantur *Kemperkens*, i. e. Angl. *the Duellists*,) *the Ruff*, si Mas sit (because in fighting they raise up their feathers on the neck, like a double Ruff) & *Reebe*, si foemina. Quotannis immenso numero ex Septentrione in paludes agri Lincolnienfis advolant, & post tres menses discedunt, nescio quo. Octo ipsorum genera, seu formas potius, descripsit & depingi curavit *Aldrovandus*.

VI. PORPHYRION, (à colore ita dicta) avis galli magnitudine, colore cæruleo, rostro ad caput vehementius obstricto, phoeniceo, longis cruribus, fissis pedibus; in quibus quinque digitos habet, & maximum illum, qui medius. Apud *Aldrovandum* duplex ejus exhibetur Icon.

VII. HORION, priori cognata, amatorio affectu flagrans, magnitudine *Herodii*, cruribus rubris, oculis cæruleis; sic à Musica instructa, ut naturæ munere suavissime cantet; sed nostris regionibus prorsus ignota.

VIII. HELORIUS, avis *Creci* perfimilis, & forte eadem.

IX. LIMOSA Venetorum, quæ ad lacum Verbanum *Giraldel*, circa Neapolim *Leverfina*, Germanis *etn Meer-han* dicitur. Arquata majori per dorsum est similis, maculis varia; tota parte prona, capite & collo præsertim.

X. BAR-

X. BARGE Gallorum, quam *Ægocephalum* facit *Bellonius*; the ~~Coat-head~~. Avis *Helorio* minor, colore vero non abfimilis, rostro breviori, & recto.

XI. HÆMATOPUS, (à rubro crurum pedumque colore,) the ~~Red-shank~~: in *Britannicis* littoribus admodum frequens.

XII. ALCYON, *Alcedo* (*ἄλκυον* & *ἐν ἀλκυον*) *κίτις*, the ~~Hal-~~
~~cyon~~. Paucissimis, inter mediterraneos præsertim, nota est. Omnium rarissimum est, inquit *Aristoteles*, (*Hist. Animal. lib. 9. cap. 14. apud Scaliger. cap. 21.*) vidisse Alcyonem. Descriptionem ejus petere licet ex *Johnstons*, de *Avib. pag. 156*,

XIII. ISPIDA, Alcyon fluviatilis, vulgo Piscator Regis, the ~~kings-fisher~~. Cujus generis videtur

1. *Ispida* ex *India* allata, Regulum magnitudine vix superans: ut &
2. *Rousserolle*, seu *Roucherole* Gallorum, *Bellonio* *Alcyon Vocalis* (quia dies noctesque cantu absumit; tam seria, ut vacillet, totoque corpore tremat.) Inter reliquas voces has imprimis præferre videtur; *Toro tret, fuis, buy, tret.*

Fissipedes INSECTIVORÆ sunt

I. MORINELLUS, the ~~Dotterel~~, (quasi *delirus*, ob delirantem stultitiam ita dictus. Hæ enim Aves imitatrices ad lumen candelæ pro aucupis gestu capiuntur; si is brachium extenderit, expandunt & illæ alam; si is tibiam, & illæ itidem: breviter, quicquid agit auceps, idem facit & avicula, donec reti obvelatur: ut scribit *Camdenus* noster in descriptione *agri Lincolnensis*.) Quæ stato tempore quotannis ingenti copia abundant in pluribus Angliæ locis; maxime vero in paludibus modo dicti *agri Lincolnensis*.

II. ARQUATA, Arcuata (ab arcuato rostro,) *Numenius* veterum (torte à *Neomenia*, quod rostri figura arcum Lunæ recens à novilunio crescentis in cornua repræsentat.) *Carlinus*, the ~~Curlew~~. Qui inferior est

Arquata Congener, seu Minor, the ~~stone~~ *Curlew*.

III. CREX, *Κρεξ*: (à voce *Crex*, quam ingeminat.) *Turnero* nostro the ~~Daher-Deu~~: Sed an recte, merito dubitari potest. Nam quænam avis sit, vix à recentioribus observatum est. Et *Bellonius* avem quandam circa Nilum visam, cruribus longis, rostro longo & nigro, nigris quoque tibiis & capite, collo, tergore, & pectore candidis; quæ è terra victum petit, & in mulcas debacchatur;

tur; & cum volat, magnum edit strepitum, *Crecem* veterum esse opinatur. Quod si verum sit, nullam talem habemus avem in *Anglia*.

IV. TOTANUS, *the pool-snipe*.

V. CHALIDRIS Bellonii, Fedoa, *the Godwitt*. Avis columbæ magnitudine, cruribus proceris adeo, ut equo insidere videatur; unde *Chevalier*, id est, Equitem, nominarunt Galli.

Hujus generis est

1. *Chalidris Cinerea*, *the Knot*; Italis *Gambetta* dicta; quæ in eunte jam hyeme adeo pinguescit, ut summis in deliciis habeatur eis, qui abdomini nati censum gulæ demergere gaudent. Nomen autem illud Anglicum *Knots*, deducit *Camdenus* noster à *Canuto*, Dano, Angliæ olim Rege; quasi *Cnote*, vel *Knot*: & deinde *Knot*: è Dania enim huc advolare creduntur.
2. *Chalidris nigra*, à *Bellonio* pariter descripta, nobis vero ignota; quamque proinde non eloqui est ore Anglico.
3. *Himantopus* (à flexilitate crurum) quæ eadem nobis videtur, ex *Gesneri* descriptione, cum *Himantopode*, *the Red-shank*.

VI. GALLINULÆ AQUATICÆ, Glareolæ (quæ hoc commune habent, quod eis sit corpus gracile & adductum) *viz.*

1. *Chloropus*, Fulicæ corporis figura, & colore persimilis, *the Moor-hen*.
2. *Erythropus*, Ralla Aquatica, *the Runner*; *Red-scanco* Turneri.
3. *Ochropus* (à colore totius fere corporis subviridi, sed sordido & obscuro sic dicta.) *Ardeola arenalis*.
4. *Holosericea*, (quod color ater in ea holoserici instar splendeat) *the Velvet Runner*, in agro Somersetensi quondam, ad stagni ichthyophylatici marginem, à me occisa.
5. *Porzana* Italarum, à *Strardin*.

VII. SCOLOPAX (à rostri figura, quod instar *pali* longum & rectum habet; nam *palum* Græce σκόλα dicunt) *Rusticula major*, plerisque populis *Beccassa*, *the Woodcock*.

VIII. GALLINAGO, *Scolopax minor*, *molliceps* Aristotelis, *the Snipe*.

IX. TRYNGA, *Gesnero* Turdus Aquaticus, *the Water Thrush*: quam juxta rivulorum margines in agro *Warwicensi*, visam fuisse affirmat D. Dr. *Merret*, in *pinace rerum natural. Britan. pag. 183*. Trynga minor, *the Sand-piper*.

X. JUNCO,

X. JUNCO, (quod in juncis libenter degat.) Gallis *Alouette de Mer*, i. e. Alauda Marina, the *Stint*, aut *Spar*, aut *Perr*.

XI. CINCLUS, *κίγκλος*, & *βυκολίον* (quod armenta sequatur) Bellonio *Gallinago minima*, Belgis *Half Schnepf*, nostratibus the long bill'd wagtail, & *Half snipe*, aliis *Water Swallow*. Aliquibus in Gallia *Deux pour un* appellatur. Duæ enim hujus generis pretio unius majoris veneunt. Huic congenere duas ponit *Aldrovandus*, earumque Icones exhibet *Ornitholog. lib. 20. cap. 36*.

XII. MERULA AQUATICA, quam volantem in Cumberlandia à nobili Viro, Domino *Willoughby*, in dignoscendis avium differentiis in primis curioso, aliquando visam fuisse tradidit *D. D. Merret*, *pinace rerum natural. Britan. pag. 183*.

XIII. VANNELLUS, (quod alis, instar vanni seu ventilabri, commotis concussisque strepitum edat,) Germanis *Pimp*, Gallis *Dixhuist* (utrisque à voce) nuncupatur: the *Lapwing*, aut *Bastard Plover*. Est columbæ magnitudine; *rostrum* longo, nigro. *Color* per totum dorsum virescit, maculis quibusdam purpureis utrinque partim viridibus, partim cæruleis. *Extremæ* vero & longiores *alarum* pennæ nigrae; quæ inversæ atro splendent colore. *Venter* & *alarum* interior pars plumas habent albas. In *capite* crista plumacea nigra, oblonga, retrorsum tensa conspicitur. *Gula* ex nigrore splendet, ut & *caput* summum, cujus partes laterales sub oculis candidæ sunt, tantillum rubentes. *Cauda* sesquipalmum longa, candida, extreme nigricat. *Pedes* rubent, unguibus nigris, digitisque nulla membrana conjunctis, sed terrestrium more divisis. In *Essexia* est Insula quædam haud magni circuitus, quæ ab ingenti avium harum copia, eo præcise ad diem Divo *Georgio* sacrum advolante, nomen suum, *Stoulness* nempe, hoc est *Avium promontorium*, sortita est: uti ex *Fullero* nostro notavit supra laudatus *D. Dr. Merret*. Huic Vannello Congener est

Capella, à *Æ. Arist.* (quod *capræ* similem vocem edat) vannello paulo procerior, sed corporis magnitudine inferior, pennis cæruleis, & altiori crista; in Cornubia nostra à Domino *Gunthorp* observata.

XIV. PLUVIALIS, Pluviarius (quia loca imbribus madida, & paludes frequentat) Gallis *Pluvier*, Germanis *Pluer*, Angl. the *Plover*. Quæ est vel

1. *Cinerea*, Italis *Montana*, the *grey Plover*, aut *stone Plover*. Quam Aristotelis *Pardalium* esse credit *Aldrovandus* (*Ornitholog. lib. 20. cap. 65.*) tum quod tota fere sit *cinerea*; quod de *Pardalio* prodidit *Aristoteles*: tum quod maculata, unde *Pardalio* nomen.

2. *Flavo-virescens*, the *green Plover*, & *whistling Plover*,

Ff

(à voce

(à voce *Huit, Huit*, sibilo, qui porrectis labiis edi solet, confimili;) quæ *migratoria* est: Æstate enim nulla apud nos cernitur, vere perpauca.

3. Huc refer illam, quæ *Pluvialis major* Aldrovando dicitur.

XV. CHARADRIUS, Hiatula, (quod circa fluminum alveos, & rivorum *hiatus* versetur.) Quænam avis sit ignoratur. Ictericos solo aspectu sanare multi produnt. Ponitur à D. Ray pro *Alauda marina*.

XVI. CERCIO, avis Indica, ad sturni magnitudinem accedens, variis coloribus picta, humanam vocem effingens, & Psittacis vocalior, & majori docilitate ac ingenio. Nomen habet ex eo, quod similiter caudam motitet, atque *Cinclus*. Forte aut *Indian Mock-bird*, sed specie differens à *Mimo*, seu *Garrulo Indico*, supra inter Picas memorato.

XVII. PICA MARINA, avis Curlinum & corporis magnitudine, crurumq; proceritate æquans, sed rostro prælongo ac flavo, ut & cruribus rubentibus, atque in tres tantum digitos sine calcaneo desinentibus pulcherrime insignita. Plumis pennisque Picam exactissime refert, unde apud nostrates vocatur, *the sea-pye*.

Fissipedum HERBIVORARUM Classẽ complent.

I. **G**RUS (ab incondita voce, quam edit) Poetæ *Polamedis* avis (quod is, Trojano bello, quatuor literas, *φ. ξ. χ. θ.* ordinem aciei, & tesseras, à Gruibus didicisse dicatur) Græcis communiter *γρᾱνός*, (quod colore cinereo, & quasi cano, tanquam *γᾱν*, appareat.) *the Crane*. Ejusque affines

1. *Grus Balearica*, Cirrhos in capite, more Pavonis, gerens. Qualis hodie solitaria spatiatur in *Vivario Regio*, Aulæ albæ vicino.
2. *Grus Japonensis*, quæ tota fere candicat, rostro, collo inferiori, pedibus & alis internis exceptis. Vertex capitis insigniter rubet, ac nigris maculis respergitur. Hodie visenda in Ornithotrophio Regio.

3. *Grus*

ad pag.



Grus Japonica

3. *Grus Crispa*, the Curled feathered Crane, *Ardea stellari* persimilis.

EXOTICÆ Rariores.

AD calcem jam perducto Avium in orbe veteri maxima ex parte degentium catalogo, istis subnectere visum est nonnullas ex ingenti illarum numero, quas ceu rariores, & quamvis appellationibus Latinis destitutas, scitu tamen nec indignas, nec injucundas,

F f 2

in

in *Novo* repertas describunt, qui de *rebus naturalibus Americanis*, seu propria, seu aliorum fide tractarunt. Hocque duplici quidem de causa. Primo, ne quid, quod ad *Onomastici* hujus nostri augmentum, aut *Tyronum* curiositatem aliquatenus facere censeatur, incuria segnitieve omisisse videamur. Deinde, quod ipsemet felicitatis eatenus particeps fuerim, ut haud paucas ex Avibus in hac quasi *Mantissa* mox nominandis, mihi vel in Augustissimi *Monarchæ* nostri, Serenissimique Domini mei CAROLI II. Ornithotrophis instructissimis, vel in Mercatorum, aliorumque nostratibus, ex *America* in patriam denuo receptorum, *καυμολογαμείαις* dudum cernere licuit.

Inter Exoticas TERRESTRES censentur

I. MANUCODIATA, *Apos Indica*, (non quod pedibus prorsus destituatur; nam nulla absq; pedibus in rerum natura datur avis, & nos hujusmodi aves vidimus cum pedibus fere palmum longis: Sed quod perpetuum volatum exercere eam falso creditum sit ab imperitis:) *Avis Dei Moluccanis*, & communiter *Avis Paradisi*, *the Bird of Paradise* (seu ob colorum venustatem, corporisque speciem: seu quod ubi locorum nascatur, unde veniat, quo se recipiat, ignoretur.) Cujus *quinque species* diversas tradunt depinguntque *Aldrovandus* & *Johnstonus*. Quibus omnibus id peculiare est, quod in cauda veluti fila quædam vel nervos obtineant, quibus facile arborum ramis se annectere & suspendere creduntur. Magni à *Moluccarum* Regulis fiunt, qui se, si illarum pennas portent, in prælio vulnerari non posse, etiam si in prima acie steterint, somniant.

II. DAIE, (forte ab Hebr. *Daia*, milvus, quod a *Daa*, volavit) Avis magnitudine Columbam vix excedens, ova tamen anserinis majora excludens, (unde pulli citra incubantis parentis opem atque teporem nati statim avolant, sibique prospiciunt) & elui expetita.

III. GUIT GUIT, avicula minima, Regulo similis, viridi colore, & suavi nutrimento. *Niërembergio Corvipeta* dicitur; quia ea est naturæ rerum vis, ut hæc tantula, & fere nulla avis audeat persequi Corvorum examina, eosque cogat ubilibet latitare.

IV. MAJA, cujus in colli postica parte caput, ventriculus, primumque nutrimenti receptaculum est. Gregatim in *Cuba* volant, & *Oryzæ* sata devastant. Extant avis hujus admirandæ exuviz, integro cum capite, inter *rariora SOCIETATIS REGIÆ* *Londonensis*.

V. XOCHITENACATL, avis Columbæ par, in *America* arborum floridarum mellagine victitans.

VI. TUPUTA, avis insolentis fæne naturæ. Nam viva tota vermibus

mibus farcitur. Hos (fædum nec minus mirum dictu) pro carne habet; his singula membra imbuta; præter hos & pellem nihil carneum. Cutim non perforant dehis exornatam pennis. Uti ab *Hernando* habuit *Nierembergius Hist. nat. Exotic. lib. 10. cap. 14.*

VII. QUAPACHTOTOTL, quæ risum humanum æmulatur, indeque *Ridibunda* vocatur.

VIII. TENTZON TOTOTL, avicula Passere minor, colore fusco, pilis quibusdam ad rostri radicem circumcirca propendentibus, barbæ instar. Unde haud incongrue appellari potest idiomate nostro, *the bearded Sparrow of America.*

IX. TRITONUS Hispaniolæ (quasi *tribus vocibus* cantans) avis pulcherrima, & mirifico colorum ornatu variegata.

X. HOACTZIN, magnitudine Gallinæ, cristam gestans ex plumis è candido in pallidum colorem vergentibus, sed dorsum earum nigrum est. Anguibus maximam partem vescitur: unde à Nautis nostris nominatur, *the Snake-eater of America.*

XI. XOCHITOTOTL, quæ forma æmulatur Passerem vulgarem. Multicolor est penna, pallet, nigrescit, candet; partim quoque fusca est. Ex arboribus nidum construit pendulum, ubi incubat ovis. Unde, *the Hang-Nest of America* dicitur. Nidum hujus habet inclytiss. SOCIETAS REGIA, in Gazophylacio suo.

XII. AURA, aliis *Gallinassa*, aut *Gallinasso* (forte à magnitudine gallinarum pari) Peruanis *Suguntus*, Mexicanis *Tropillotl*: *the Parrot-beak Crow of New Spain.*

XIII. GARAGAY, *the Mexican Kite*, devouring the *Crocodiles eggs.*

XIV. QUETZALTOTOTL, avis cristata, Columbæ magnitudine, Pavonis maxima ex parte vestita plumis: quæ maximi sane pretii apud indigenas habentur, & auri valorem superant. Unde Reginam plumarum dixeris, *the Queen of Tecolote*, quæ una est è provinciis Mexicanis.

XV. DODO Lusitanorum, *Cygnus Cucullatus* (caput enim habet magnum, membrana cucullum referente tectum) rostro crasso, oblongo, parte capiti proxima subflavo, extremo mucrone nigro. Magnitudine Cygnum æquat, *the Dodo*, aut *Dunk Swan of St. Maurice's Island*. Caput hujus cum rostro & cucullo cernere est inter rariora SOCIETATIS REGIÆ Londin.

XVI. CEOAN, seu *Avis Nivea*, Turdo viscivoro paulo major, & sermonem humanum æmulans, veluti irridens transeuntes.

XVII. POLYGLOTTA (quia omnes aves suavitate & arbitrio gutturis vincit, nullius non imitatur vocem, nullius non superat,) *the American Mock-bird*. Hujus generis duas nos *Regi* nostro *Augustiss.* dono transmissas ante quadriennium vidimus, quas A-

G g

viarius

viarius ejus diu in una cavea, ad blanditias auditus, ac naturæ ostentum servabat; quovis cibo contentas.

XVIII. TOMINEIUS, Oviedo *Passer Mosquitus*, (quia omnium avicularum minima est. Cantharum cinereum magnitudine vix superans,) **the Humming Bird** (à sono *Hur, Hur, Hur*, quem alis inter volandum perniciter vibratis concussisque edit.) Qui tantilli ponderis est, ut *Acosta* unum à se visum fuisse testetur, grana 24 tantum pendentem. Invenitur in montibus *Peruanis*, *Brasilia*, & *Nova Scotia*: melle, rore, & florum succo victitans, rosæ tamen nunquam insistens. *Gomara* exspirare mense Octobri, pedibus ex aliquo ramo appensum aprico loco, renasci autem Aprili, scribit. Generis hujus quatuor me donavit Nobilis Vir, D. Thom. Temple, Eques Auratus, & hodie Regius *Novæ Scotiæ* Præfectus. Avicularum harum octo species diversas in *Brasilia* existentes recenset & describit *Georg. Marcgravius, Hist. Brasil. lib. 5. c. 4.* Aiunt pulverem ejus intra corpus sumptum *Epilepsiæ* mederi. Pennæ, præsertim quæ in collo & pectore sunt, aureis staminibus à Phrygionibus intexuntur, & maximo pretio venduntur.

XIX. CUNTUR, avis vasta mole, & quæ alis expansis 15 aut 16 pedes occupet; rostroque instruitur tam duro, ut eo vaccinum tergus perforet. Plumis albis nigrisque mixtis ornatur. Cristam parilem instar novaculæ, & non ferratam instar gallinacæ, gerit. Duæ illarum vaccam occidere & comedere valent; nec ab hominibus abstinere. Pauciores sunt. Plures si reperirentur, pecus universum in *Peruvia* destruerent. Species quatuor in *Insula Maragnana* occurrere scribunt *De Laet. Hist. Ind. Occident. lib. 16. cap. 19. & Leri in Hist. Brasil.*

XX. JANDOU, *Struthiocamelorum* species, quæ proceritate staturam humanam superat: **the great Caridge of the Island Maragnana.**

XXI. TUCANA, *Thevetto Toucan*; avis magnitudine *Picæ*, flavo pectore, reliquo corpore nigro, rostro ingenti ad minimum palmum longo, extus flavo, intus late rubente. Hujus caput & rostrum extat in *Soc. Reg. Londin. repositorio*. Cicurari ita aiunt, ut sub recto pullos suos excludat.

XXII. PASSER STULTUS, (ex eo, quod manus apprehendentium nec fugiat, nec timeat, sed admiratur solum aut stupet) **the foolish Sparrow of Brasil.** Est tamen palmipes, & pisciculis vescitur.

XXIII. FUM HOAM, avis admirandæ pulcritudinis, quam ad Pavonum familiam proinde refert *Athan. Kircherus, in China sue illustrata p. 196.*

Inter

Inter EXOTICAS AQUATICAS feligantur

I. ANSER CHILENSIS, seu *Caput Nocturnum*, avis admirandi sane opificii. Assurgit enim illi à rostri exortu corona quædam, aut orbis in tres cuspides divisus, superiori parte mediocriter crassus, & è luteo rubescens: ab anteriori alarum bini aculei contorti exeruntur. His armis avicula imbellis adversus fortiores defenditur. Nostratibus dicitur **the spur-wing'd Goose of America**. Hujusmodi unus admodum cicur, & hominibus familiaris hodie degit in Vivario Regio, **St. James's Park** dicto: quem, quia dono accepit *Rex invictissimus*, à magnanimo illo Navarcho, & Equite Aurato D. *Roberto Homes*, ejus nomine insignivit.

II. TLAUQUECHUL, specie similis *Plateæ* aut *Pellicano*: sed coccineo pulcherrimoque universi fere corporis colore, aut ex albo rubescente, lato atque obrotundo circa finem rostro: **the scarlet spoon-bill'd Bird of America**. Vives duntaxat piscibus vescitur, mortuos non attingit. Circa littora maris, aut fluminum versatur.

III. GUARA *Brasilianis* dicta, quæ cum *Arquata* nostra figura & magnitudine plane convenit, sed colore prorsus differt. Tota quippe avis vestitur pennis elegantis coloris coccinei; remiges tantum alarum nigras habent extremitates. Colorem quotannis mutare dicitur. Nam primum exclusa coloris est nigricantis. Hiuc evadit cinerei, deinceps albi: Sensim autem rubescere incipit, & tertio ætatis anno coloris est in totum, quem *Columbin* vocant; quoque magis senescit, eo magis elegantissimum colorem coccineum acquirit. Viçtitat pisciculis, fluctibus maris in littus ejectis. *Brasiliani* è plumis hujus avis varia componunt corporis ornamenta, eaque magni æstimant. Hujus generis unam, quam **the scarlet Curlew of Brasil** vocavi, dono meo nunc possidet inclytiss. SOCIETAS REGIA Londinensis: in cujus Musæo locupletissimo illam cuivis ex Curiosis contemplari liceat.

Præter pauculas has, quas ob supra dictas rationes *Catalogo* huic nostro inferendas selegimus, restant adhuc aliæ *Exotice* quamplurimæ; quarum nomina, descriptiones, & icones studiosus harum rerum Lector videre poterit in *Marcgravii Hist. Natur. Brasil. lib. 5. in Musæi Wormiani lib. 3. & in Johnstoni de Avibus lib. 6.* Dum nos ad *Quarti* ultimique *Generis Animalia*, *Pisces* nimirum, ex methodo in principio proposita, progredimur.

PISCES

P I S C I U M Differentia & Nomina.

Generalis AQUATICUM Divisio.

OMnia Animalia AQUATICA, five in aquis degentia, sunt vel *Sanguinea*, vel *Exsanguia*.

SANGUINEA, Græce Νίχτα ἡαίματα (quod *natare* sit proprium Aquaticum sanguine præditorum,) *Pisces* Latine strictim dicta; varias sortiuntur differentias. Illustriores tamen ex nobis videntur, quæ desumuntur vel à *locis*, in quibus vivunt: vel à corporis *integumento*.

Pro *Aquarum* in quibus degunt *varietate*, *Pisces* sunt vel (1,) Θαλάσσιοι, *Marini*, qui in aqua Marina, seu *Salsa* vivunt; (2,) Ποταμιοί, *Fluviatiles*, qui in fluminibus; (3,) Λιμναῖοι, *Lacus-
tres*, qui in lacubus; (4,) *Marini simul & Fluviatiles*, qui in aquis tum salis, tum dulcibus alternatim versantur; (5,) Πισκί-
ονοι, qui in divitum piscinis potissimum aluntur; (6,) Τελματῆες, *Palustres*, qui in aquis desidibus, præsertim palustribus reperiuntur.

Tegumentorum ratione, quidam *Squamosi* sunt; quidam *Cute* tecti, eaque vel *Aspera*, vel *Levi*.

Præterea *Piscium* alii sunt ὄχλοιοι, qui *gregatim* semper incedunt, ut *Haleces*, *Scombri* &c. Alii Σποράδιοι, qui *Solitarii* natant.

EXSANGUIA generalius dispescuntur in (1,) Μολῖα, seu *Molluscula*; (2,) Κρυστακοί, (3,) Τελματῆες.

Quoad *Differentias* minus generales; **MARINI** seu *Pelagii*, ut ab his initium capiamus, sunt vel (1,) περσῆες, *Saxatiles*, qui inter saxa & promontoria vivunt; five semper ibidem stabulentur, five maxima ex parte, quandoque nempe excurrentes in alia loca, ut alimenta quærant: (2,) Λιμναῖοι, *Littorales*, qui non in aquis profundis, sed circa *Littora* versantur: (3,) Πελάγιοι, *Pelagii*, in alto mari degentes.

Deinde *Pelagii*, habita tegumenti ratione, subdividuntur in *squamosos*, & *Leves*. Cujus Divisionis habito respectu Pisces omnes, quos jam enumerare suscepimus, in suas distributos classes breviter percurramus: à *Pelagiis squamosis* exordientes.

Modernorum Anatomicorum nonnullis constitit, in genere Piscium, in oculis humorem Aqueum vel nullum esse, vel certe perexiguum, (in *Thynno* certe, ac *Pelanide*, *Musstella*, & quibusdam aliis, nullus unquam inventus est,) vitreum vero copiosum. Contra autem in genere Avium, & Quadrupedum, nocturna illa animalia, veluti Bubones ac Feles, plurimum aqueo abundare, paucissimum vitreo. Item in Piscibus, humor ChrySTALLINUS non lenticularis est, sed magis accedit ad globosam figuram; in volucribus vero minus.

Constitit etiam piscibus sanguine præditi rostrum superiori parte multis undique foraminibus pertusum esse; quæ compressa viscidum quendam & oleaginosum effundunt humorem. Unde in conspicuum se dat Naturæ solertia, quæ superficiem piscium quasi unxit, quo facilius obstantes aquas findant: in rostro vero copiosos esse voluit istius unguosissimi humoris fontes, ut ipsa resistentis aquæ vis, eum premendo, humorem unguosum inde exprimat. De hac re videatur solertiss. *Nich. Steno*, in historiis *Capis Carcharia*, & *Centerina* dissectarum.

Piscium Pelagiorum S Q U A M O S O R U M Classis.

E *Pelagiorum Squamosorum* numero sunt

I. **A S E L L I** (ab asinino forte colore) ὄρα & ὀρίωνοι. Quorum species sunt

1. *Asellus Major*, Hollandis Cabellian; Merlucius, quasi Maris Lucius; the Cod Fish, aut Cod; in partibus Angliæ Borealibus, a Helling; in Occidentalibus, a Speltwell vocatur. Exsiccatus osseam fermè duritiem contrahit, nec nisi fustibus prius verberatus coquitur: unde piscis *Fustiarius*, a Stockfish dicitur. Sale autem inveteratus, & salugine abluta, & nova aqua elixus, *Laberdanus* nominatur, *Paberius*, & *Battel-Cod*. Folliculus

liculus ejus glutinosus Icthyopolis nostris appellatur the ~~Sound~~.

1. *Asellus Minor* & *Mollis*, Romanis *Ficus*, Gallis *Merlang*, & nostratibus (ex argenteo colore) a ~~Whiting~~; & si sole exsiccatum sit, a ~~Buckthorn~~.
3. *Asellus Niger*, five *Mollis nigricans*, the ~~Coal-fish~~, ~~Coal-whiting~~, (quasi *Carbonarius*:.) & Cornubiensibus a ~~Pollock~~.
4. *Callarias*, *Galerida*, & *Galaxia*, piscis capitosus, Hollandis ~~Schell-fish~~, Gallis *Merluccius*, the ~~Haddock~~, allis ~~Haak~~, & ~~Poor-John~~.
5. *Asellus Barbatus*, Icthyopolis Londinensibus a ~~Pout~~.
6. *Molva Major*, Rondeletio *Asinus varius*; quia dorsum habet cinereum multis maculis nigris conspersum: aliis *Lingua*, forte quia linguæ formam exprimit, the ~~Ling~~.
7. *Molva Minor*, seu *Morhua*, the ~~Porchuel~~, cujus caro coctione, propter humoris tenuioris consumptionem, glutinosior evadit, ut butyro immersa adeo digitis adhærescat, ut vix inde avelli possit. Intestina & folliculi *Icthyocollæ* conficiendæ inserviunt.
8. *Gobergus*, qui duorum cubitorum magnitudinem superat, & colore est cinereo, ventre falcato squamis tecto, ore medio ocri sine dentibus, oculis magnis, cauda in uniceam pinnam definente.
9. *Asellus Fuscus*, Merreto a ~~Pake~~.
10. *Mustela*, Illyricis *Pegorella*, Bellonio Aristotelis & Galeni *Callaria*, Rondeletio *Asellus veterum*. Trium interdum palmarum est longitudinis, cruris humani crassitie, colore ex livido in opacum abeunte. Piscis est ex *Anguillarum* genere, longiusculus, crassus, capitosus. *Pelle* obscura aliquando subflavente, maculis & punctis innumeris, seu asteriscis, nigris & lutescentibus respersa. *Venter* albus est. *Pinnæ* donatur senis, lividis, maculosis: 4 ad branchiæ sitæ sunt, & quidem majores duæ ad latera, reliquæ minores in imo ventre: duæ solitariae, una dorsi, altera ventris; ambæ à media fere parte ad caudam perpetuè excurrentes. *Podex* in medio fere ventre situs. A *Mento* apophyses pendent longiusculæ ternæ; binæ aliæ minutissimæ ad latus ntrumque mandibulæ superioris, ceu vermiculi quidam, visuntur. *Oculi* cærulei, iride emicante aurei coloris. *Hepar* pallet maximum; cui jungitur *Fel* longiusculum, transparens, & instar smaragdi virens. *Lien* obscure rubet, triquetra fere figuræ, longiusculus.
11. *Tinea Marina*, (propter corporis cum palustri similitudinem sic dicta:) Italis *Pesce Fico*, (quod passus ficus instar mollis sit:) the ~~Sea-Tench~~.

II. **HALIEC**, (ab αλιός, i. e. αλμυρός, *salsus*; quia pisciculus est ad liquorem falsamentariorum idoneus, ut *Isid. lib. 12. cap. 6.*) **Τάριχος**, Germanis **Harengus**, Angl. **the Herring**. Qui hoc sibi peculiare habet, quod aqua extractus citissime moriatur; quia peramplam, pro ratione corporis, *Branchiarum* sortitur fissuram. *Britanniam* nostram immensis exercitibus circumnatare. Circa solstitium æstivum ex alto *Scotiae* littora petunt: inde *Anglicæ* littora adeunt, & ab Augusto medio ad Novembrem à castro *Scarborough* ad *Thamesin* capiuntur. Postea aliqua vehementiori procella in Britannicum mare deferuntur, & in eo ad *Christi Natalitiæ* piscantibus se offerunt. Hinc Hiberniam utrinque pernatantes, in Septentrionalem oceanum, circumnavigata quasi *Britannia*, se transferunt: & ibi ad Junium usque occultantur. Postquam foetificavere, redeunt. *Haleci* est intestinulum rectum, & excrementis vacuum. Harengus infumatus, *Ruburnus*, à **Hed Herring** dicitur, à rubente ob fumum colore. *Haleces* muratos crudos nonnulli pedibus *Podagra* infestatis imponunt, non infelici successu; præsertim si ortum habuerit ex pituita crassa seu congelata. Glutinosum enim humorem incidunt & attenuant, ac sua siccitate absumunt; congelatum vero dissolvunt, & dissolutum discutunt.

Littora nostra, Autumno præsertim, frequentat & aliud *Halecum* dicam, an *Leucomenidarum*, an *Alosarum* genus, priori haud multum dissimile. Latinorum aliis quidem *Harengi* minores dicuntur, *Alose* minores aliis: nostratibus vero nomine *Pylchatus* semper innotuerunt; nescio an ab Anglo-Saxonico *Pylce*, toga pellicea, & Belgico æro, natura, à *cutis* scilicet *levitate*. De his *Camdenus* noster in *Britannia* suæ in folio editæ pag. 135. his verbis egit. “Uber-
“rimus etiam quæstus his (de *Damoniæ* seu *Cornwalliæ* incolis lo-
“quitur,) existit è pisciculis illis quos *Pylchatus* vocant, qui ma-
“gnis quasi examinibus littora à Julio ad Novembrem circumfusi
“capiuntur, exenterantur, saliantur, infumantur, conduntur,
“premuntur, & in Galliam, Hispaniam, Italiamque infinita mul-
“titudine exportantur, quibus sunt gratissimæ merces, & *Fuma-*
“*dos* appellantur.

III. **LIPARIS**, (à pinguedine nomen invenit, quasi λιπαρός, quia sub cute pinguedinem loco carnis habet; & asservatus, totus in oleum abit: Germanis *Schmalz-fisch*. Hic *Capite* terrestrem cuniculum refert; ore est parvo quidem & edentulo, sed maxillis asperis munito. *Virgum* habet satis latam à capite ad caudam usque. Squamis contegitur exiguis. *Pinnas* ad branchias, & in ventre binas habet; aliam à podice ad caudam, aliam à cervicis loco ad eandem continuam, sine aculeis. *Cauda* in duas definit. *Rondeletius lib. 9. c. 8.*

IV. **APER**

IV. *APER Rondeletii*, piscis squamosus, fere Rotundus, compressus, corpore præduro, & aspera veluti ac villosa cute prædita; rostro suis instar oblongo & obtuso, sine dentibus; aculeis præacutis, duris, longis & rectis. Cauda in unam pinnam definit. Iconem ejus tradit *Salvianus tabul. 31. The Sea Boar.*

V. *SCOLOPAX* (à rostro oblongo & rigido: Gesnero *Serra* Plinii, quod radium versus caudam serratum habeat. *the Snipe Fish; or Trumpet Fish.*

VI. *Monoceros Clusii*, *the little Unicorn; or Saw Fish.*

VII. *GLAUCUS*, (à colore cæruleo seu cyaneo: & *ἰπὸλευκός*: Hollandis *Speer Sticling*, Ang. *the Sea Sticling*. Cujus apud *Rondeletium* tres species reperias; *viz.*

1. *Majorem*, Provincialibus *Cabrolle*, *Bicha*, & *Damo* dictum; tricubitalis quandoque longitudinis. Statim à capite aculeos habet; quorum duo, qui juxta caudam sunt, velut in vagina reconduntur. Ad branchias pinnæ aurei sunt coloris, & pro podice rimam potius quam foramen fortitus est. *Salv. Amiam* veterum esse credit.
2. *Minorem*, unde *Glaucidion* dicitur, qui septem aculeos in dorso, ad caudam spectantes, habet. A superiori branchiarum parte ad medium corpus linea tortuosa admodum dimittitur; hinc recta ad caudam protenditur. Provinciales *Liche* vocant, *Monspelienses Palamide* vel *Vadigo*.
3. *Sinuosum*, (sic dictum, quod linea à branchiis ducta, serpentum corporibus flexuosis gradientium instar, tortuosa sit,) cujus dentes sunt acuti, dorsum ex cæruleo nigrescit.

VIII. *HIPPURUS*, (seu a similitudine caudæ equinæ: seu quod equi more feratur & saliat:) *ἵπποφαινον*, à pinna, quæ à vertice incipit, in eoque veluti crista erigitur: *Gazæ Equilis*, Hispanis *Lampugo*; *the Horse-tail Fish.*

IX. *REVERSUS* Indicus Squamosus, *the Hagg Fish with reverse prickles*. Nomen inde accepit, quod *retractatus* venetur. Magnam Indis in venandis piscibus præstat operam. Tenui, sed valido funiculo alligatus, ad mare deferitur; blandis animatus verbis, in piscem conspectum, etiam magnum, emittitur, ejusdemque lateri seu ventri sese affigit. Sic extrahitur cum præda.

Pelagiorum LÆVIUM Classis.

E Pelagiorum *Lævium* numero sunt

I. THUNNUS, (ἀπὶ τοῦ θύνειν, quod est, magno impetu moveri, quia velocissimè natat: seu ab Hebræorum *Thannin*, quo Cetaceum piscem intelligunt: the Tunny-Fish. Cujus & varia nomina, pro diversitate ætatum; & historiam admirandam petas velim è *Johnstoni lib. de Piscibus, cap. 2.*

II. POMPIUS, (seu ὁ ἀπὸ γῆς πομπῆς, à transvehendo. Fabulantur enim, *Pompilum*, hominem πορθημία, portitorem, ab *Apol-line*, quod *Ocyrrhoen* puellam trajecisset, in sui nominis piscem transmutatum: seu quod navigantes in alto mari ad continentem usque comitetur:) aliis *Sacer Piscis*; quem *Rondeletius Pelamidi* similem, sed varium, squamisque carentem facit.

III. XIPHIAS, (à figura rostri ensiformi) *Gladius*; Alberto *Mites*, (quia gladio armatur:) the Sword-Fish. Ad decem nonnunquam cubitos accedere scribit *Rondeletius*. Viætat piscibus, quos rostri incursum interficit; nec prius comedit, quam spiculo prædam transfixerit. In Musæo Regio hodie asservatur Gladius hujus piscis tres fere cubitos longus; quem ego Regi Augustiis. Dono obtuli.

IV. REMORA, *Echinus*, *Remeligo*, *Naucrates*, (quia naves in medio cursu remorari vulgo, sed falso creditur,) the Remora, aut Ship-Balter. De quo nihil certi occurrit, adeo Authores in diversa scinduntur, de ejus forma, magnitudine, & causa facultatis navigia retinendi.

V. CETORUM Dux, ἡ γὰρ ἡγεμὼν, ὁ δὴ γὰρ, nonnullis *Mysticetus*, aliis *Musculus*; the Whales guide. Credunt enim Cetos hunc piscem in ducem habere, tum quod mole corporis oppressi tarde moveantur, & faciliè in cœnum, brevia, & angustias impingant: tum quod parum acute cernant.

VI. SERPENS MARINUS, *Aristoteli ὄφις θαλάσσιος*, Hydrus; the Sea-Serpent. Notabilis ipsorum quibusdam in locis magnitudo. Ejus ab *Æliano* traduntur in *Africa*, ut boves infectentur, & triremes apprehensas evertant. Circa *Norwegiam* 200 pedum longi visi sunt, tantas aliquando supra mare spinas erigentes, ut navis per unam transire possit; si *Ol. Magno* credimus.

VII. CONGER, κόνγρος, (forte à γρῶ, quod est voro: piscis quippe vorax est:) *Rittershusio ad lib. 1. Halienticor. Oppiani, Gryllus*;

lus; quibusdam (à corporis & coloris similitudine) *Anguilla Marina*; the *Conger*, & Cornubiæ incolis, the *Spilwet*.

VIII. OPHIDION, (quem *Salvianus* & *Beltonius* cum *Serpente Marino* confundunt,) *Oppiano Tragus*: Qui duorum est apud *Romæ* delictum generum. Unum *Barbatum*, (quod gemina barba à maxilla inferiore propendente instructum sit:) Alterum *imberbe* & flavum, de cætero superiori simile.

IX. MURÆNA, (ὄψις τὸ μύρειν, μύρεαι, quod præ pinguedine in summa aqua fluitent,) the *Murena*, Germanis *Mural* *Spanlein*, si mas sit; *Mural Weiblein*, si foemina; item *Murten*; *Meeren*. In tanto honore à *Romanis* fuerunt habitæ, ut iis magno sumptu Vivaria ædificarint, magno impleverint, & tandem magno aluerint.

X. MYRUS, μύρις, a great Sea-eel, more like a Serpent, than the *Murena*.

XI. REVERBUS INDICUS ANGUILLIFORMIS, the *Eel-like-fagg* fish of *India*. Cujus usus est, sicut prioris, in piscibus capiendis. Modus piscationis describitur à *Petr. Martyre lib. 3. decad. Ocean.*

XII. TÆNIA, (à similitudine fasciæ & vittæ:) *Gallis Flambeaux*, (quia flammæ modo, cum natat, movetur:) the *Stout-fish*. Cujus tres species recenset *Johnston. lib. de Piscibus. pag. 23.*

Pelagiorum C A R T I L A G I N E O R U M Classis.

CARTILAGINEI Pisces ii dicuntur, qui pro dorsi spina *Cartilaginem* habent. Græci *χορδράγαγγα* & *χορδοπύμα* olim dixerunt. *Aristoteles* *σελάχη* & *σελάχια* primus, à splendore cutis, qua noctu lucent, vocavit. Nos autem communiter *Chitilles* sives vocamus. Horum vero duo Genera constituuntur: Alterum *Longum & rotundum*: Alterum *Planum*.

Generis PRIORIS sunt

I. CANIS CARCHARIAS, *Oppiano* *ἀρπακτής*, (quia carne, & humana potissimum delectatur:) the *Shark*, or *Sea-hound*. Qui magnitudine *Galeos* omnes excedit. Inventus in quodam loricatus homo est. Alter curruī impositus, vix à duobus equis trahi potuit. Hujus piscis caput accuratissimè disseccuit *Nich. Steno*, & admiranda

miranda in eo quam plurima notata descripsit in tractatulo singulari; qui proinde perlegi meretur à curiosis. Idem in interiori ejusdem piscis mandibula tredecim dentium ordines observavit: quorum interiores inferiora versus recurvati, gingivarum sub molli & fungosa carne ita delitescabant, ut non nisi resectis gingivis in conspectum prodirent. Reperit etiam, Sclerodem oculi tunicam inter & interiorum ejus orbitam, *Cylindrum* quendam *Cortilagineum*, cui Musculi recti proxime incumbabant & affixi erant, quemadmodum in aliis Animalibus ipsum solent nervum opticum circumvestire: hocque fortassis eo solertissimæ Naturæ censilio factum, ne oculus non magnus in tam grandi orbita situs, nisi firmiori quodam fulcro subtineretur, sine certa lege fluctuaret. Ad hæc pluribus experiētiis, indeque deductis rationum momentis ostendit, eos à vero haud multum aberrare, qui *Glossopetras* illas, quæ pro lapidibus in terræ gremio sponte concretis vulgo exhibentur, revera non lapides, sed majores *Canis Carcharia dentes*, olim sepultos, esse arbitrantur. Id quod ipsa dentium horum forma suadere videtur; utpote quæ in omnibus cum *Glossopetrarum* figura convenit; ut utriusque plana planis, latera lateribus, basis basi quam simillima sint.

II. GALBUS, (ἀπὸ τῆς γαλῆς, id est Mustella terrestris; seu quod corporis similitudine eam referat: seu quod quædam cum Mustela Pisce communia habeat, inter quæ jecur adiposum, in oleum resolubile:) *Mustelus the Dog*, or *Dogger-fish*. Corpore est oblongo & rotundo, cinereo; & à podice ad extremam usque caudam gracilescit. Catuli ejus *Aristoteli* τὰ σκύμια dicuntur; *Hinnulos* vertunt nonnulli. Species ejus sunt

1. *Galeus Levin*, (à cutis lævore sic dictus:) Romæ *Pesce Columbo*, the smooth-skinned Dog-fish, Cornubiensibus a *Blusker*. Vix ad 20 libras pervenit.
2. *Galeus Asterias*, sive *Stellaris*, (quia dorsi maculæ stellarum speciem referunt:) *Pardalus Marinus* (quia maculatus:) the Sea Panther.
3. *Glaucus*, (à colore dorsi, qui cæruleus est:) the blue-backed Dog-fish. Qui est quatuor aut quinque cubitorum magnitudine; rostro acuto; ore in supina parte posito.
4. *Maltia*, bellua Marina, à *Cane Galeo* nihil differens, nisi quod alba oculorum macula destituatur; & rostro brevi sit, dentibus latis & acutis.
5. *Galeus Acanthias*, *Mustelus Spinax*, Scaligero *Mustelus Spinus*, (quia aculeis præditus est.) *Æliano* *Centrine*; the prickly Hound-fish. Nunquam 20. libras implet. Nonnullis dicitur *Doggy-fish*.
6. *Fulpecula Marina*, (vel à caudæ longitudine, vel inluavi ingratoque

gratoque gustu, vel ab astu ingenioque nomen sortitur,)
~~the Sea-For-hound.~~ Piscis est aliquando ad centenas libras ex-
 crescens.

7. *Simia Marina*, (quia Simiæ terrestri tum colore, tum facie
 similis: in hoc tamen differens, quod varie distinguatur,
 cervicemque & branchias ruffas habeat:) ~~the Sea-Ape.~~ Reperitur
 in mari rubro, & Oceano Germanico.

III. ΖΥΓΗΝΑ, (à capitis figura, qua τὸ ζυγόν imitatur, quo
 transversum librile, ex quo lances dependent, significatur, no-
 men obtinet:) ~~the Balance-Fish.~~ Massilienses *Piscem Judeum*, à
 similitudine tegumenti capitis, quo olim Judæi in Provincia ute-
 bantur, dicunt. Pisces obvios & homines natantes frontis suæ acie
 subvertit, & Leoni, quoad vires, ab *Oppiano* opponitur. Occur-
 sus ejus olim navigantibus habebatur infautus.

IV. ΜΟΛΑ, (seu quod informem molam repræsentet; seu quod
 rotunditate corporis molæ molendinariæ similis sit, ut *Rondeletio*
 placet,) apud Massilienses *Luna* (vel quod extrema corporis
 parte, quæ pinnis subest, crescentis figuram referat: vel quod
 demtis pinnis toto corpore plenæ instar sit.) ~~the Molebut.~~ Piscem
 hunc admirabilem *Rondeletius* exhibet pro illo quem veteres *Οφθα-
 γοειόχορ* vocarunt, (forte ob similitudinem quandam *Porei: nam La-
 cedæmonii* lactentem porculum; *Οφθαγοειόχορ* nuncupabant, quod
 mane prostant in foro vanales: & hiæ piscis, cum capiatur, *grun-
 nire* etiam, Porcorum more, solet:) & hunc in modum describit.
Piscis est maximus, longus, latusque, ovali prope figura. *Cute* in-
 tegitur aspera, argentei coloris. *Ore* est parvo, *dentibus* latis, con-
 tinuisque. *Oculis* parvis & rotundis. Pro *branchiarum* scissura for-
 amen est in medio circuli, veluti centrum. Ad branchiarum for-
 amina *pinnae* sitæ sunt breves, rotundæ ac latæ; ad sursum deorsum-
 que impellendum corpus: & prope caudam aliæ duæ, altera in
 dorso, altera prope anum; quibus corpus dextrorsum sinistrorsum-
 ve movetur. *Cauda* crescentis *Lunæ* figura est, superiore inferiore-
 que parte articulata est, ut tum in dextrum, tum in sinistrum latus
 moveatur, iterque dirigat. *Caro* hujus octa, glutinum ex tergo-
 ribus Boum confectum refert. In Cornubia ~~the Sun-fish~~ nomina-
 tur.

Posterioris sunt

I. TORPEDO, τάρπη σταλαρία (quasi stupefaciens) ~~the Torpedo,~~ aut
~~Cramp-fish.~~ *Venetis*, ne in foro piscario vendatur, Præfecti sani-
 tatis auctoritate cautum est: *Genue* tamen, *Massilia*, & alibi, à te-
 nuioris fortunæ plebe esui expetitur.

c *

II. PASTI-

II. *PASTINACA* Marina, (quod radio suo, ceu pastino, instrumento fossorio, fodiat & pungat:) veteribus *Aquila Piscis*; *the poppon Fish*, *the Fire or fierce Flato*, (quia radii ejus venenum ignis instar ictos adurit:) & *the Cat Fish*.

III. *RAIA*, (forte à *radendo*, spinas quippe gerit, maxime in dorso; *Βάτος* & *Βάτις* (à rubi quem *Βάτον* vocant Græci, similitudine:) *the Thorn-back*. Genus est piscis *plani* & *cartilaginei*, in tergo & cauda longas *Spinas* habentis. *Carnivora* est, & in locis victitat cænosis, nec longe à littore. *Genitale* fœminæ, simile muliebri est. *Coeunt*, non solum admotis mutuo partibus *Supinis*, sed etiam tergo fœminarum *supinis* marium *suppositis*. *Iis* testaceum *ovum* unicum tribuit *Arist.* quale revera habent. *Fætum* igitur unum, aut ad summum duos uno partu edunt, quod verum est: sed præter unicum illud ovum testaceum, aut duo, quæ jam perfecta in inferiore vulvæ parte cernuntur, ex dissectione comperit *Rondeletius* permulta alia, & fere infinita in Superiore vulvæ parte (in *Ovario* nempe) haberi, quæ tempore perficiuntur, ex quibus sæpius iteratis partibus, fætus excluduntur; *ἑξ ἑκάστης*, unus & deinde unus, suo quique tempore. Atque hæc miræ *fæcunditatis* causa est eadem quæ in *Gallinæ*, ut quotidie experimur, quæ unicum ovum unico partu ponunt, cum plurima alia in utero gestant, quorum singula deinceps, ut prius absoluta fuerint, ita prius eduntur. Ova primum sine testa concipiuntur, in superiore uteri parte; quorum alia Gallinæ *Ovorum* magnitudinem æquant; alia his minora sunt, quædam vix ciceris sunt magnitudine. *Affirmat Rondelet.* se plura centenis aliquando in *Raiis* singulis numerasse. Et sane tale est in testa sua *Raiarum* ovum, quale *Gallarum*, & *avium* omnium initio.

Hujus Species sunt

1. *Raia Levis*, *λεϊόβατος*, *Leviria*, (quia cutem habet ab aculeis nudam:) *Mucosa*, (quia muco scatet:) & (à lata fascia, qua mucus, seu potius *Coryza* in laborantibus excipi solet:) *Bavosa Romanis*: *the Skate*, or *Spawlyn*, & obsceno nomine *White-Cunt*, & *Flare*. Sunt qui *Rasam* vocent, à cute undique (excepta media dorsi linea, & cauda) glabra. *Ventriculus* huic generi parvus est, *ecphysis* gracilis & dura. *Intestina* breviora quidem, sed crassa. *Hepar* rubescit, in quo fel latet. *Rima* pro podice est, pudendo muliebri non abfimilis. *Raia* omnes odorem ferinum, & marinum quendam fætorem exhalant, qui in diutius servatis fere evanescit. Unde fit, ut longa vectura tenerescant, & suaviores efficiantur. Hyeme etiam minus insuaviter olent, observante *Rondeletio*.

2. *Unda-*

2. *Undulata*, (à maculis undarum more flexuosis) the wavy Skate.
3. *Oculata*, Gallis *Miralet*, (à speculorum parvorum similitudine; maculas quippe habet rotundas, & ad oculorum formam aliquatenus accedentes:) the Skate with spots like eyes.
4. *Oxyrinchus*, (à rostri acumine,) the sharp-snouted Skate. Quæ est Major & Minor.
5. *Asperias*, Stellaris, (à maculis stellatim dispositis:) *Aspera* (quia tota horret aculeis:) the starry-Skate full of prickles.
6. *Clavata*, Gallis *Raje Bouclier*; Massiliensibus *Clavade*; the Skate with large pricks like nails.
7. *Spinosa*, Gallis *Cardaire*, (quasi *Lanifica*, à spinis seu aculeis, quorum multi infixi sunt instrumentis, quibus lana carminatur:) the Card-Skate.
8. *Fullonica*, (quod in toto corpore frequentissimis aculeis conspersa sit, ad modum instrumenti illius, quo *Fullones* pannos poliunt:) the Fuller-Skate.
9. *Asperrima*, à præcedente eo tantum differens, quod in supina etiam parte tota aculeis peracutis ita horret, ut manu tolli non possit, nisi pinnulis cauda apprehensis.

IV. RANA PISCATRIX, βατραχὸς θαλάσσιος, the Monk, Toad, Pals, or Devil-Fish, or Fishing-Frog. *Rana* nomen ex eo forte meruit, quod *Gyrinos* sive ranulas recens ex ovis exclusas & imperfectas (oculis quidem & cauda notabiles, sed quibus postea demum accessuri sunt pedes & caudæ fissura) referat, à venandi autem solertia *Piscatrix* dicitur. Quippe inter saxa se recondens, aperto immani rictu, mentitum in Musculi cujusdam, ceu Cirri instar fili subtilissimi, ex nasi ejus pinna deducti extremo vermiculum in fauces suas conjicit. Quo viso, pisciculi ceu ad escam accurrunt, rictumque cavitatem alicujus saxi reputantes, subintrant. *Piscatrix* vero, retracto qui vellicatur hamo, orisque rictu clauso, totum pisciculorum gregem devorat. Internam ejus constitutionem si spectes, nihil non admirandum videbis. Omnia quippe viscera singulari quodam, & à cæterorum non solum planorum Cartilagineorum, verum & Animantium omnium aliorum more recedente artificio fabricata sunt: quemadmodum egregie ante biennium publice demonstravit Excellentiss. Vir, D. Georgius Entius, M. D. & Eques Auratus, in *Prælectionibus* suis *Anatomicis*, coram Augustissimo Rege nostro, in Celeberrimi Medicorum Londinensium Collegii Theatro, non sine summâ Auditorum admiratione, habitis. Quas nimia Auctoris modestia hætenus suppressit, haud exiguò Artis Apollineæ (quam tamen scriptis suis eruditissimis alias plurimum auxit ornavitque) detrimento. Sed sperandum est, eam

Literatorum continuo iteratis precibus aliquando iri superatum. Interim observatu dignum est, hunc piscem adeo *venenatum* esse, ut nisi à folliculo fellis probe liberetur, ejus particula vel cicēris magnitudine assumpta, tam horrenda symptomata inferat, ut mox ægro caligent oculi, mens vacillet, lingua tardescat, membrorum tremor, sudorque frigidus subsequatur, facultates omnes resolvantur & fileant, moxque veneno extinguantur. Sed benigna mater natura, præsens ac facile remedium huic pesti opposuit; *Cancros* nempe marinos: quorum unus contusus, & cum vino propinatus, malo medetur.

V. SQUATINA, *Squat*, (à squamis acutis:) *πῖν*, (à nafī acumine:) *Lima*, (quia cutis ejus aspredine lignum & ebur poliuntur.) Germanis *Peer Engel*; Ang. *the King-Stone*, & *File-Fish*. Massilienses, Galli, Ligures *Angelum* vocant, (à similitudine *Angeli* cum alis expansis picti:) Veneti *Squaquam*; alii *Squaiam*, alii *Squadram*; Burdegalenses *Creac de buch*. Media inter Mustelos & Planos à *Rondeletio* ponitur. Magnitudine ad centum sexaginta libras nonnunquam excrescit. Coloris est prope cinerei ad fuscum vergentis: cute asperrima, supine alba & lævis. Os prima parte positum, brevibus sed acutissimis, iisque aliter quam in aliis piscibus dispositis dentibus munitum. *Maxillarum* ossa in angulum obtusum desinentia: in lingua extrema carneum tuberculum. Ex superioris maxillæ extremo, quod cute non contegitur, *Apophyses* duæ, in alias divisæ demittuntur. Post oculos, qui in superiore capitis parte, ad latera parvi, *foramina* ad os usque patentia visuntur. *Pinnæ* utrinque binæ sunt, & utræque in lateribus. *Cauda* longiuscula in aliam pinnam lunatam desinit. Bis in anno *parit*, Vere nimirum & Autumno: singulis fœturis septenā aut octonā ova excludens. Ova exsiccata sistendo alvi profluvio profunt: & oleum ex hepate ad hepatis duritiem confert.

VI. SQUATINO-RAIA, *πινόβατ*; piscis ex *Squatina* & *Raia* promiscue coeuntibus procreari creditus: parteque priore *Raiam*, posteriore *Squatnam* referens.

VII. LAMIA, *ῥατὶ τῷ λίμῳ*, à gula, seu à voracitate insigni:) quæ, judice *Rondeletio*, eadem est cum *Cane Carcharia*.

VIII. LUMPUS Anglorum, (quasi massa informis,) *the Lump*. Piscis est marinus, littoralis, pedalem mensuram paulo excedens, ubique fere subrubens, sine squamis, crassus; dorso fere triangulari, tuberculis cutaneis sparsim quasi asperatus; in nostris *ichthyopoliis* frequens, sed à divitibus raro emptus. Pleniorē hujus descriptionem tradidit *Turnerus* noster, ad quem proinde curiosiores remitto.

IX. GIBBOSUS

IX. **GIBBOSUS** Piscis, *veridus* G., *Poger Lump* Germanis, the *Bunch-back Lump* Angl. In hisce Cartilagineis, ut Raia, Pastinaca, Canicula &c. in Ovario bina duntaxat ova simul maturantur, & utrinque à dextro & sinistro cornu descendencia, in utero inferiore foventur, excluduntque fœtus vitales, ut vivi paris contigit: in Ovario tamen infinitus pene ovorum numerus, diversarumque magnitudinum reperitur; observante *Harvæo*, de gen. Anim. exercitat. 3.

Marinorum Saxatiliū S Q U A M O S O R Ū M
Classis.

Absoluto Pelagiorum Elencho, sequuntur *Saxatiles*, & primo **SQUAMOSI**. viz.

I. **SCARUS**, (quod inclusus nassis, crebris caudæ ictibus, qui *σκάριμοι* seu *σκάρισμοι* vocantur, averfus fores laxat, & ita retrorsum erumpat:) *Meyrix* quoque seu *Ruminax*, ut *Scaliger* vertit, (quia latis utriusque maxillæ dentibus solus è piscibus *ruminat*;) the *Cud* aut *Chewing-Fish*. Cujus duo sunt genera. *Unum*, quod *ovias*, (quod alino concolor sit,) Germanis *Peer Brachsmen*, dictum est. *Alterum*, *Αιολ* G., (quod varii coloris sit:) Utrumque à *Bellonio* & *Johnstono* fuisse descriptum.

II. **TURDUS**, (quia macularum varietate Turdum avem æmuletur,) the *Sea-Carp*. Cujus duodecim genera ab *Aldrovando* notantur: quorum nonnulla apud nos reperiuntur, inquam plurimis *Cambro-britannia* locis, & prope Insulam *Anglesey* dictam, ut scribit doctiss. *Merretus* noster, ex observatione vere generosi Viri, *D. Willoughby*. Cornubiensibus *Diotites* dicuntur, & *Wasses*.

III. **PAVO** *Salviani*, (quia Pavonis avis more, variis coloribus depictus est, & corpus ejus fere totum inæquali varietate virefcit.) Romæ *Papagalo*, à Lusitanis *Budia*, Germanis *Peer Pfaw*, Angl. the *Peacock-Fish*. Solitarius est, & sæpe singuli capiuntur: verno inprimis & autumnali tempore. Forte quod æstate ob caloris hyeme, ob frigoris impatientiam in alto mari lateant. Ignobilis inter cibos censetur. In Cornubia nostra *Cuckow-Fish* dicitur.

IV. **LEPRAS**, seu *Pforus*, (quod iisdem rectus sit sugillationibus, quibus, qui lepra & pfora laborant, deformantur:) the *Leper-Fish*, aut *Canter*. Qui ex *Turdorum* genere videtur.

d *

V. M 1-

V. MERULA, κραιφν. & κέρνυς. (à colore ejus ex Indico & Cæruleo in nigrum tendente) *Bellonius* piscis *Afpratilis*; Venetiis *Tinca Marina*; a sort of Sea-Tench, distinguished from the rest by his deep blue colour. Hoc unum in ejus *Anatome* dignum memoratu occurrit; quod cum hepar habeat album, in duos lobos grandes divisum, *Fel* tamen exerat tenui vasculo inclusum; & revolutionibus duplicatum; cujus longitudo est sesquipedalis. Piscis *Merula* meminit *Merretus* noster, olim à *Turnero* visi in littore Angliæ occiduo, & à Piscatoribus illic vocati, a Cook Fish.

VI. JULIS, *Synefio* ἰυλός, aliis *Jurella*, & *Jura*; the Sea-Tunkertlin, aut Rainbow Fish, (quia tanta in tergore colorum varietate insignis, ut in eo iridem utrinque depictam videas.) *Rondeletio* digiti non excedit magnitudinem. Os veneno refertum habere, & in piscatu Urinatores & Piscatores pertinacissimè persequi, eorumque sanguinem appetere; clare ab *Oppiano* & *Æliano* affirmatur. Ægris tamen in albo jure elixari, sanis in sartagine frigi & assari, prodidit *Salvianus*; forte amputato prius capite.

VII. PHYCIS, (quod in Musco marino, φύνος βρύον ἐρυδὲς θαλάσσιον *Neophyto* & aliis nidificet:) *Salviano* *Percia* (ob magnam cum *Perca* marina similitudinem.) Cujus non unum genus esse ostendit *Bellonius*. Vidisse enim se fuscis, rubentes, virides, πολύχρους testatur. Idem esse videtur cum pisce *Ficu Romæ* (quod passi ficus instar, carnis sit mollissimæ & succi plenæ,) vocato. *Hippocrates* 2. de vict. rat. inter pisces raram & levem carnem habentes recenset; eumque viri mulierosi, seu ἀνδρὲς θηλυφρον. ἐπωνυμίαν & cognomentum à piscatoribus ferre innuit.

VIII. PERCA marina, (nomen à Colore, quem Græci πέρην dicunt, sortita est:) γραμματοειδής. *Aristoteli*, (quod transversis per tergus lineis conspergatur, quæ nota est ipsi cum paucissimis piscibus communis.) the Sea-Perch.

IX. CHANNA, *Hiatula* (quod mandibulas ita constitutas habeat, ut perpetuo, nedum moriens *hiare* videatur: unde *Epicharmus* μεγαλόχάμμοις vocavit.) the Gaper, aut Gilt Fish. Huic tantam cum *Perca* similitudinem tribuit *Bellonius*, ut pisces pene eodem esse credas, & pro iisdem vendantur. Hoc unicum in hujusmodi piscium historia memorabile occurrit; quod nullum *sexus discrimen* in eis deprehensum sit. Omnes enim Vulvas habere traduntur, & omnes ovis capiuntur gravidæ. Rem ita se habere, ex plurimarum sectione *Rondeletius* didicit; inusitatumque hunc conceptum ingenti horum piscium fecunditati causam assignat.

X. HEPATUS. (à colore & magnitudine Hepatis,) the Liver Fish; Germanis Leber Brasmen: piscis *Pagro* per similis.

XI. Mæ-

XI. **MBLANURUS**, (quasi *Nigricauda*, à caudæ nigredine:) *Athenæo* Μελανόγυραμνος, (quod nigrae lineæ latera ejus pingant.) the Black Eel. Palmi magnitudinem aliquando superat; nec amplius quam unam vel sesquilibram pendit. Quem *Aldrovandus* depingit, totus ex caeruleo amethystinoque nigricat; præter squamarum extremitates, caudæque initium; quæ auro resplendent; pinnæ nigricant. Uropygium supinum candicat, prorsum intense violaceum, & velut nigram maculam constituit. Germani *Wan* *Wan* vocant.

XII. **ALPHINSTAS**, (ab inveniendi, nescio quare, dictus:) *Cynædus*, (quasi præpostera libidinis studiosus. Ferunt nempe, semper binos capi, & alterum alteri ad caudam comitem videri.) Belgis *Stein-Fish*, id est Angl. *Stone-Fish*. Similis est Piscis, quem Lusitani *Salmonetam* vocant: Sed pedalem magnitudinem raro excedens.

XIII. **CORACINUS**, *Corvus* & *Graculus* Gazæ: *Salviano* *Corvinus*, (seu à colore nigro; seu quod τὰς ὀφθαλμοὺς, pupillas moveat,) Germanis *Steer Hap*, & *See Hap*, Angl. the Crow-fish. *Salvianus* duplicem dedit; *Unum*, qui Romæ simpliciter *Corvo* & *Corveto* dicitur: *Alterum*, qui *Corvo de Fortiera* ibidem nominatur, & *Niger* jure merito, ut prior *Albus* (quia multo minus nigricat) censendus est.

XIV. **EXOCÆTUS**, (quod in littore, seu sicco dormiat; nam in littore *Monspelim* stertentem sæpissime vidit *Rondeletius*;) *Adonis*; Angl. the Sleeper. De quo vide sis *Scaligerum Exercit.* 73.

XV. **SCIÆNA**, *Umbra*, (seu à colore umbroso: seu à lineis quibusdam obliquis, à dorso descendantibus aureis & obscuris, quæ aliarum apparent umbræ.) Germanis *Steer Schatten*. Piscis est *Cetaceus*, 60 plerumque librarum, quatuor plus minus cubitos longus.

XVI. **GLAUCUS** *Ballonis*, Genuensibus, apud quos frequens est, *Fogarus*; Venetis *Corbettus*; idem fotte, quem piscatores nostri *Sea-Bleak* vocant: à ceruleo dorsi colore. In Cornubia *Bleak-Spark* appellatur.

XVII. **ANTHIE**, *Callionymi*, (à pulcritudine:) quorum ab *Oppiano*, *Rondeletio*, & *Aldrovando* quatuor ponuntur genera.

XVIII. **GOBIVS**, *Gobio*, & *Cobio* marinus, the Sea-Gudgeon, aut Pink; & Cornubiensibus *Rock-Fish*.

XIX. **SPHYRÆNA**, (à σφύρα, quod stimulum, aut stylum, item teli quoddam genus bello Persico inventum significat:) Latinis *Sudis*, Romanis *Lucius Marinus*, the Sea-Pike, aut Spite-Fish.

XX. *A c u s*, the *Peetle-Fish*, *Peen-Fish*, *Gar-Fish*, & *Cornubie* incolis, an *Dol-Wife* (forte ob summam corporis gracilitatem, rostrumque longum & acuminatum.) Duplex est, *Major*, & *Minor*. *Major* a *Cirreck* vocatur: *Minor* a *Skipper*.

XXI. *F a b r i l*, (seu exinde, quod omnia instrumenta *Fabrilia* in eo reperiantur, teste *Salviano*: seu propter multiformes dorfi ac ventris aculeos, atque varia capitis ossa, quibus *Fabrilia* instrumenta repræsentantur:) Romæ *Citula*, Liguribus *Rotula*, Hollandis *Gallus Marinus*, & *Peer Schmidt*; Angl. the *Doree*, aut *Dorey*. Credunt nonnulli illum ipsum esse piscem, cujus ex ore *Div. Petrus*, jussu *Domini*, desumpsit monetam ad solvendum *Cæsaris* tributum.

XXII. *Petimbua*, *Tobacco-Pipe-Fish*.

*Saxatili*um L Æ V I U M Classis.

Saxatiles L Æ V I S sunt

I. A L A U D Æ	{ Cristata	{ Germanis <i>Peer Lerch</i> .
	{ Non-Cristata	

Angl. *Sea-Larks*, ob macularum cuti earum, consimili pene modo inspersarum ac *Alaudæ* avis pennis, similitudinem ita dictæ. Ad quas pertinere videntur (1,) *Piscis Gutturatus* (à magno gutture) dictus, Germanorum *Dick-hals*, id est Angl. *Dick-neck*: (2,) *Pholis*, (à muco, quem emittit, sic nominatus:) Germanis *Schleim-Lerch*, id est Angl. *Slimy-Lark*: & (3,) *Scorpioides Rondeletii*, (quod capitis forma *Scorpioni* marino similis sit:) Gallicis *Lepus Marinus*, (quia rostrum terreni leporis *περιτομή* sive fissuræ admodum simile habeat.) Quos omnes clare describit *Johnson. lib. de Piscibus 1. cap. de Alaudis*. Quæ omnes indiscriminatim à *Cornubiensibus* *Mulgrawks* vocitantur.

Littera-

Littoralium Squamosorum NON-PLANORUM
Classis.

Piscium, qui circa *Littora* versantur, alii *Squamosi* sunt, alii *Leves*: Squamosi rursus *Non-Plani*, & *Plani*.

E NON-PLANORUM censu numerantur

I. MULLUS, (seu à mollitie; est enim carnis teneræ: seu à colore Mulleorum calceamentorum, quibus priores Albanorum Reges, postea Patricii usi sunt:) *τριγλη* (quod ter pariat foemina uno in anno:) qui est vel

1. *Mullus barbatus major*, Romanis (servato fere ad literam Græco nomine, *τριγλη*) *Trigilia*, Massiliensibus *Triga*, Venetis *Barbone*, Burdigalensibus *Barbeau*; Gallis *Rouges*, *Barbet*, & *Surmulles*; Germanis *Grosser Kottart*, id est Anglice *Greater Redbeard*; Anglis *True Mullet*, & *Sutmullet*. Piscis squamosus, omni ab ævo, & ubique fere gentium in Europa summi honoris. Os parvum habet, & edentulum. Duo cirri cutanei, molles, rotundi, longi, barbæque similitudinem ferentes ex inferiori labro dependent. *Capite* est repando, & rostro fere carente. *Oculos* habet mediocres, *branchias* utrinque quaternas; ac binas utrinque pinnas, ad branchias scilicet utrinque unam, & alteram unam utrinque etiam in ventre: in dorso itidem duas, priorem cervice, posteriorem caudæ proximam: & rursus aliam unam à podice imo ventri affixam. *Cauda* vero in lunatam pinnam degenerat. Totius piscis figura oblongiuscula est, venter satis planus, & dorsum repandum. *Ventre* præterea est albo, reliquo corpore purpureo. *Ventriculum* rotundum habet & parvum, cum quamplurimis appendicibus: *intestina* mediocria, *hepar* subrubrum, *fellis* vesicam admodum exiguam, *Splenem* quoque exiguum & subatrum. *Ova* ter in anno parit, cujus rei eo argumento utuntur Piscatores, quod ejus partus ter quotannis in locis quibusdam parvus videatur, idemque testantur *Jellan*. & *Oppian*.

Accipiunt Trigla terno cognomina partu.

c *

Piscis

Piscis *Gregalis* est, *carnivorus*, vorax, omnia sibi obvia promiscue invadens, comedenſque; neque etiam Lepori marino, cujus caro cæteris omnibus piscium generibus lethalis eſſe perhibetur, parcens. *Nutrit* certe, cum probe confectus fuerit, omnibus aliis piscibus copioſius. *Salvianus*. Percuſſis à Paſtinaca marina Mullus medetur, ſi recens divulſus imponatur. *Dioſcorid. lib. 2. c. 23.*

2. *Mullus barbatus minor*, Germanis *Kleiner Rothbart*, id eſt Anglice *Smaller Red beard*; aut *Leſſer Pullet*. Qui à priori tum colore, tum magnitudine manifeſte adeo diſtinguitur, ut duo eſſe Mullorum genera apertiffime conſtet. *Major* enim rubro, *Minor* vero purpureo colore pingitur: & ut *ille* à capite ad caudam uſque aureis lineis inſignitur; ſic *iſte* hujusmodi lineis carens, lituris quibuſdam flavis atque liventibus notatur. Deinde cum *hic* nunquam palmum excedat, *ille* ad pedalem magnitudinem excreſcit. Quoad *Interanea*, in omnibus eum priore convenit.
3. *Mullus imberbis*, Occitanis (à rubore quo ebrioſorum facies inſicitur,) *Imbrago* dictus. Hic piſcis eſt marinus, rarus, *Hirundini* & *Cuculo* corporis figura ſimilis, ſed colore ſaturatius rubro. *Capite* magno, ſtellulis cæato; *Oculis* magnis; *ore* parvo, cujus pars interna cinnabaris colore eſt, ut in *Hirundine*, ſine dentibus. *Oſ* branchias operiens in aculeoſe terminatur ad caudam ſpectantes. Ad branchias *pinna* ſunt duæ rubræ, cum appendicibus aliquot: in ventre duæ aliæ. *Cute* aſpera contegitur & rubra in dorſo & lateribus: nam *ventre* eſt candido, ad quem à dorſo *linea* multæ ductæ cernuntur. A capite ad caudam dorſo medio duo ſunt acutiſſimorum oſſiculorum ordines, cavum efficienſes, à cujus medio *pinna* rubra aculeis conſtans erigitur, cujus *pinnae* aculei parum ferrati videntur; id quod in nullo alio piſce, præterquam in eo qui *Sagittarius* vocatur, comperi. Sequitur alia *pinna*, veluti ex mollioribus pilis conſtans. *Cauda* rubra eſt, *Scorpionis* caudæ ſimilis. Partibus omnibus *internis* cum Mullo barbato convenit. Carne eſt dura, ſiccaque, *Rondel*.
4. *Mullus Aſper*, (à Squamarum aſperitate:) Occitanis *Cavillone*, (à clavi lignei, qui *Caville* iis dicitur ſimilitudine) Angl. *Rough Pullet*; in noſtris littoribus hoſpes. Eſt corpore brevi, tereti, digiti magnitudine, colore inſigniter purpureo. *Capite*, branchiis, pinnis *Mullo* proxime deſcripto perſimilis: ſed *Squamas* habet exiguas, ferratas, oblique ſitas. A capite

capite ad caudam *lineam* ex squamis contextam. *Ventriculus* est parvo, cum appendicibus paucis. *Hepar* habet candidum, sine felle; longius quam in aliis hujusmodi piscibus: *Splenem* parvum, ex rubro nigricantem. *Branchias* quaternas duplices. *Carne* est dura, siccaque, & *Cuculi* carne non discrepante. *Rondel.*

II. *Hirundo*, *χελιδών*, perquam similis volucris *Hirundini*; unde idem nomen ab omnibus fere gentibus servatum est. Nam Romæ *Pesce Rondine* audit: in Occitania *Aroudelle*: maris Adriatici accolæ *Rondela* & *Rondola* vocant: Massilienses *Rondole*: Hispani *Volador*, *Bonito*: Gallorum nonnulli *Volant*, (quod avis instar, ad jactum lapidis aquam supervolet:) alii *Papilionem*; alii *Vespertilionem*, (quod colore, alarum magnitudine maculisque vespertilionem aliquo usque æmuletur. Angl. *The Swallow Fish*, aut *great banded Flying Fish*. Marinus piscis est, capite rotundiusculo; rostro acuto; ore parvo, ac prorsus edentulo; inferiore *maxilla* paulo quam superior prominentiore; *oculis* rotundis, & *maximis*, & *branchiis* utrinque quaternis. Prope quas binas *pinnas*, utrinque scilicet unam, latissimas atque longissimas habet; ita ut corpus totum longitudine æquent: aliasque binas his multo minores, magnas tamen, in ventree. In dorso unica pinna brevis est; nullis munita aculeis, & caudæ satis vicina: è cujus fere regione altera paulo minor imo ventri statim ab ano subest. *Caudæ* etiam pinna magna lunata est, cujus inferior pars superiore latior atque major extat. *Lineæ* à pinnis ventris orta, per imam ventrem ad caudam fertur. *Squæmæ* tegitur latis. *Venter* albicat: dorsum ex ceruleo nigricat. *Fellis* vesiculam habet seorsum à jecore intestinis commissam. Corporis *color* ut plurimum ex nigro rubescit. *Oris* partes internæ rubræ sunt, coloris jucunditate & splendore *Sandaracham* vel *Cinnabarim* superantes: Quibus nobis hæc videtur, que candentes carbones in ore continere. Unde à veteribus etiam *Laterna* nominatus est. *Ova* pariter rubra. *Volat*, quoties cavet sibi, extra aquam, ne piscium majorum præda fiat: inter volandum stridens, aëre forsan per angustas branchiarum scissuras celeritate emissio, & sonum quendam inconditum stridori similem efficiente. *Carne* constat duriuscula, ac propterea concoctum difficili: que elixa magis commendatur. *Salvian.* & *Rondelles.*

III. *Milvus*, *ἰεπας* Oppian. *ἰπας* Plin. *Milvago*, & *Lacerta*, (à volatu scilicet, & ab oris fulgore; volat quippe nonnunquam, & pinnis caudaque expansis *Milvum* avem quodammodo refert.) Angl. *The Mito Fish*. Qui sesquipedalcm mensuram vel maxime auctus non excedit. *Rostro* est perbrevis & recurvo, ore item parvo & edentulo, in inferiore rostri parte sito; *labiis* crassis; *acu-*

lis rotundis, magnis, & splendentibus; *capite* osseo, non lævi, sed cæato, quadrangulari fere figura, posteriore parte duobus *aculeis* magnis & robustissimis ad caudam spectantibus armato. *Branchiæ* utrinque quaternas, osseo operculo in longum, robustum & acutissimum aculeum desinente contextas habet, prope quas binæ sunt *pinnae*, utrinque scilicet una, Hirundinis instar, longissimæ & latissimæ, quibus volat. Aliis pinnis cum Hirundine convenit, ut & cauda. *Corpus* oblongum est & rotundum. *Squamis* osseis & triangularibus, inter se Serpentium more commissis munitur. *Ventre* est subalbido, capite & lateribus subrubris, *dorso* ex rubro nigricante. *Maculis* insuper ex cæruleo virentibus dorsum & grandiores *pinnæ* insigniuntur. *Lingua* ignea (inquit *Plin.*) per os exerta tranquillis noctibus relucet. *Ventriculum* habet mediocre, multis munitum appendicibus: *Hepar* pallidum, cui felle vesica commissa est: *Lienem* oblongum & subrubrum: *Uterum* rubentibus ovis refertum. Piscis est *carnivorus*, & *gregalis*; quippe per altum mare magno agmine volantes visi sunt. Ingratus palato existimatur: sed spectatu mirabilis. Si comedendus sit, elixari debet. *Salvian.*

IV. *CUCULUS* marinus, *κόκκυξ*, Gallis *Morruide* (ab ore, quia *morre* vocant os cum prominentibus labris:) Neapolitanis Græci nominis vestigia servantibus, *Concchou*; Danis *Kur*, (à *Sono* quem pinnis longioribus, dum capitur aut læditur, edit:) nostratibus *the gray Burnard*. (à Gallic. *Gourneau*; quod ambigit doctiss. noster *Skinnerus*, an deducere liceat à Lat. *Cornulum*, *Corniculum*, *Cornu*: quandoquidem piscis his *corniculis* quasi armatur.) Toto corpore *glaber* apparet, quamvis quidam minutissimis squamulis ad latera præditum putent. *Capite* est magno; osseo, cæato, anguloso, quibusdam in locis *aculeis* munito. Nam præter id, quod *rostrum* in duos arcus semicirculum constituentes terminetur, super utrumque oculum, supercilii loco, duo acutissimi extant aculei; posterior capitis pars duobus consimilibus horret; utrumque branchiarum operculum item, sed longiori armatur; statimque à branchiis alius omnium longissimus, utrinque prominet: aliquibus alioquin capitis partibus argentum æmulatur. In utroque latere à branchiis, sub majore illo aculeo, *pinna* est subrubra, magna; ex cujus regione in ventre altera minor utrinque & minus rubra exoritur. Ante has utrinque terni cartilaginei *Cirri* dependent. A capite per dorsum, fere ad caudam usque, duo acutissimorum aculeorum ordines deducuntur, in quorum medio duæ *pinnæ* conspiciuntur, una capiti proxima, brevior, sed latior; altera longior, sed strictior. *Ventre* est plano & candido: orificium excrementorum in medio ventre est; à quo alia exorta *pinna* fere ad caudam usque excurrit. Capite, dorso, lateribus & pinnis rubet,

ruber, dum recens est. Totus piscis rotundus, carnosus. *Branchiæ* habet utrinque quaternas & duplices. *Sonus* quem edit, indubie pinnarum concussu efficitur: vocalis alioquin nullus est piscis. Gustui haud insuavis ejus caro, utpote *Milvo* tenerior: unde inter salubres pisces à multis recensetur. *Monspelienſis* elixos in aqua & vino, ex aceto vel oxalidis succo edendos apponunt.

V. *HIRUNDO* *Plinii*, quem eum piscem *Aldrovandus* esse judicat, qui Romæ *Pesce Rondine*; Agathensibus *Falco Marinus*; Massiliensibus *Landola* dicitur; quique, si alas auferas ad *Mugilis Cestræ* inprimis accedit figuram; unde *Mugil alatus Rondeletio*. Cubiti magnitudinem attingit. Linea, quæ in cæteris piscibus à branchiis vel à capite per latera ad caudam ducitur, in hoc pisce à pinnis ventris orta, petiolum ventrem ad caudam fertur. Qua nota ab aliis facile distinguitur.

VI. *LYRA*, *λύρα* *Arist.* Romæ *Pesce forca*, (utrumque à cornibus è rostro protensis, quibus veterum *Lyræ* similitudinem exprimit;) Liguribus vero & Massiliensibus *Malarma*, & *Organo*, (ob sonum nescio quem surdum, attritu branchiarum, quas horridiusculas habet, aut partibus ventrem inter & fauces contentis editum;) Occitanis *Gronau* vel *Grougnaut*, (quod *grunniat*, more suis;) Germanis inferioribus *Lechan*, quasi gallus marinus: Anglis *the red Cornard* aut *Piper*. Piscis est marinus, teres, ruber. Caput habet osseum, angulosum, aculeis & eminentiis multis asperum: cujus anterior pars in duo longa, lata, & retula cornua desinit. Sub quorum exortu os est satis amplum, rotundum & edentulum. Inferiori maxillæ *cirri* quidam breves & cutanei hærent. Oculi magni sunt, superiore parte *aculeis* multis muniti. Branchiæ utrinque quaternas habet, quarum ossea opercula, non solum media sui parte, longa & aspera eminentia armantur; sed etiam posteriore, marini *Draconis* instar, aculeis muniuntur. Ceteris tam externis quam internis partibus haud multum discrepat à modo descriptis piscibus. Plus ossium quam carnis habet, quæ dura est, siccaque, non insuavis tamen, si elixa ex aceto, aut muria condita edatur.

In *Cornubia* nostra frequens est & alia *Lyrarum* species, quam à capite majore, breviori, ac depreſſiore, a *Tubb* vocant, & *Tubb Fish*, quod semidolioli figuram quodammodo repræſentet.

VII. *PHAGRUS*, seu *Pagrus*, (*φάγρις* π *φάγειν*, quia vorax est:) Germanis, *Kote Speer* *Braſmen*; Angl. *the Sea Bream* aut *Chad*. Superior ejus *Maxilla* in tubi modum cervici veluti infarcta est, neque cranio inhæret: ideoque cum piscis oscitat, exferitur; postea contrahitur. Quo signo distinguitur ab *Erythryno*.

VIII. ERYTHRYNUS, Ἐρυθρίπνεας, (à rubro pinparum colore:) Græcis modernis ἰσθρίν, Germ. ~~Koster Meer~~ ~~Bastmen~~, forte the ~~Sea-Koch~~. Ruber est, ut Mullus, dilatioꝛ tamen; unde ~~ξανθὸν~~ ~~Oppianus~~ dixit: latus, ut *Aurata*. ~~Palpi~~ ~~menturam~~ raro excedit. Minor est *Rabellione*; squamisque contegitur crassis, grossis, latiusculis; pinnis rubentibus, non oculis. Caro aristis referta, & minus proba.

IX. ACARNANES, seu *Acarne*, (forte quasi *excarne*, quia in æstate admodum extenuatur & gracilescit.) *Erythrina* adeo similis, ut pro eo vendatur: ~~another sort of Sea-Koch~~.

X. ORPHUS, *Gazæ Cernua*. Quis apud veteres piscis fuerit, difficile est conjicere; variant adeo Authores in ejus descriptione. Ex nomine *Cernua* tamen cum the ~~Sea-Koch~~ haud incongrue reddi posse crederem.

XI. SYNODON (ὄψις τοῖς ὀδύταις, quia magnis dentibus caninis instruitur: vel, si prima syllaba per *iota* scribitur, ὄψις τὸ ὀρεῖσθαι καὶ βλάπτειν τοῖς ὀδύταις, quod dentibus noceat.) *Dentix*, *Dentatus*, *Dentalis*, the ~~Sea-Koch~~, aut ut vulgo, sed minus recte scribitur ~~Koch~~, with ~~Dogs Teeth~~. Vulgarium pondus trium aut quatuor librarum esse solet: decem librarum pondere observavit *Salvianus*.

XII. SYNAGRIS, Germanis *Zin-Bastin*; Synodonti adeo similis, ut vix discerni queant; & *Rondeletius* sola ætate distingui judicet.

XIII. CHROMIS, & *Cromis*, (à grunnitu, quem captus edit, sic dictus:) the ~~Grunter~~. Vilem suam *Chromin* *Rondeletius* facit: *Bellonius* vero inter laudatissimos cibos censetur.

XIV. AURATA, χρυσοφρυς (quod iis in locis, ubi cæteris animantibus supercilia esse solent, aureo colore resplendat:) Germanis, ~~Gold-Bastmen~~; Angl. the ~~Gold-Beam~~, aut ~~Sea-Bream~~. Quæ ad denas libras, cum maxime adolevit, vix unquam pervenit.

XV. SAROUS, aliis ~~σαῦρος~~. (à multa carne; nam ad insignem magnitudinem excrecere affolet.) the ~~Bale~~. Rostro est acutior, lato corpore, dorso repando, ventre prominentiore, dentibus latis humanisque simillimis. Lineis quibusdam, unde ~~πολύγραμμα~~, & macula juxta caudam nigra, unde ~~μελανόγραμμα~~, & ~~ὀρθοπορογραμμή~~. *Aristoteli* dicitur, exornatur. Pinnæ, quæ ad branchias sunt, rubescunt. Hujus generis binos exhibet *Aldrovandus*, de *Piscib.* lib. 2. c. 16. & 17. illisque adjungit piscem quem pro *Melanurino* *Athenai* *Rondeletius* depinxit. Qui *Melanuro* similis est; tota corpore nigricat, circa caput ex nigro purpurascit.

XVI. SPA:

XVI. *SPARUS*, (forte à *Spas* à palpando, nescio quomodo:.) German. *Spatzfish*. Qui hand parvam eum *Aurata* & *Sargo* habet similitudinem, ut ex descriptione ejus apud *Johnston. de Piscibus, pag. 72.* legenda, constet.

XVII. *MORMIRUS*, Ovidio *Mormyr*. Piscis corpore quam *Aurata*, *Sparus*, *Sargus* & *Melampus* longiore, & ad latera minus compresso, capite item tenuiore & calato, rostroque acutiori; ex descriptione *Aldrovandi de Pisc. lib. 2. cap. 19.* Germani vocant *Spurto Wafmen*.

XVIII. *CANTHARUS*, *Gaza* & *Sarabans*; (forte à coloris hantici & ferruginei similitudine:.) Germanis *Wiant Speer Wafmen*; nec nobis incommodè *the Beetle Fish*. Squamis enim integitur parvis, ex indico splendidibus, ut a *Canthari Insecti*: & maxime versatur in conchaliis littoribus ac portibus, in quæ loca maris sordes fluctibus polluntur.

XIX. *SALPA*, *salpa*, *Phaerina* *sea*, *Bol*, & *Johnston* *Chrysopleurus* (ab *aureo*, quo per latera resplendet, colore:.) Germanis *Wolffstich*; Angl. *the Wolffstich*. Nam à corvico in caudam, per argentea latera, aureis rubentibusque lineis, certis intervallis distinctis, decentissime pingitur: unde in Gallia Narbonensi *Virgadelle*, id est, virgis seu lineis distinctum, nominatur.

XX. *STROMATEUS*, *Salpe* similis, & universo corpore aurea illacis productis distinctus, unde nomen invenit. Peculiaris est traditur Mari rubro. *Rondeletius* pro hoc depinxit Piscem, qui *Rome*, ubi frequens est, *FIATOLA* dicitur; quique *linguam* habet esopifera; *Delphini* modo, ad humanam accedentem, suisque partibus omnino absolutam, quod inter cæteros branchiis præditos solus habere videtur.

XXI. *SCORPIO*, (quia, ut aculeo *Scorpio* terrestris, quem habet in cauda, ita hic piscis spinis quibusdam in tergore & capite armatus est, venenum vulnerando infligit.) *the Scorpion Fish*.

XXII. *SCORPIA*, seu *Scorpiana*, (nam utrumque pro eodem pisce sumit *Aldrovandus*,) *Scorpioni* per omnia similis, nisi quod & multo minor sit, & venenum sui generis non habeat.

XXIII. *BALANUS*, (contracte à *Balanus*:.) *Athenæo* *Balan* (quod præ corporis crassitie brevis sit; *Balan* quippe idem quod *minutus*:.) *Plinio* *Bulbus*; & *Zacynthis* *Cepola*; (utrumque à *Cepæ* similitudine, propter turgidum ventrem: Germanis *Speer Wafmen*. Anglice dici potest, *the Duggon Fish*. Raro *Gobium* magnitudine superat.

XXIV. *PICULA* Romanorum, *Plinii* *Novacula* (quod dorso sit cultellato:.) *the Maser*, aut *Mazer Fish*. Piscis latus est, & *Fabri* instar compressus.

XXV. *APUA*, ἀπούα (forte ὡς ἀν' ἀπούας ἕσται, quasi νοκτα-
te, quia ex spuma mari oriri vulgo creduntur:) the *Spitting*, *Spuy*,
aut *Sea-Dace*. Cujus non una species est, viz.

1. *Apuia vera*, quam Græci proprie ἀπούα, aliqui ἀπυρία, *Apu-
ma* nuncupant. Pisciculus est auricularis digiti longitudinem
adæquans, oculis nigricantibus. Cujus duo genera; *Album*,
in Hollandia frequentius; *Rubicundum*, à *Bellonio* descri-
ptum.
2. *Phalerica*, (ἀπὶ τῶν φαληρῶν, quia hæc quoque alba est, &
spumea,) adeo mollis ac pinguis, ut si aliquandiu digitis tra-
ctetur, liquefiat.
3. *Membras*, Gallis *Cékria*, corpore admodum candido, ca-
pite auri colorem æmulante, *Sardino* valde similis.
4. *Gobites*, *Gobionaria*, Gallis *Logis de Mer*, Angl. the *Sea-Lach*,
ad Gobiorum magnitudinem nunquam accedens.
5. *Hephetus*, Gallis *Jovil*; digiti magnitudinis, argentei colo-
ris, corpore pellucido. Os ita fissum, ut inferior maxilla su-
periori sit prætensa.

XXVI. *TRACHURUS*, seu, ut *Oppianus* & *Galenus* scri-
bunt, Τραχῦρος, (proculdubio ab asperitate spinarum, quæ
prope caudam eminentiores sunt quam in aliis partibus:) *Hefychia*,
σκιθακός: Romæ, *Fricura*, quod plures simul in sartagine fri-
gantur: Gallis *Gascanes*, & *Maquereaux bastards* Id est *Scombrus* spu-
rius; Santonibus *Cichatou*; Anglis the *Spitchet* or *Anchovies*, (quia
muria conditus, eundem cum *Encrasicholis* saporem & teneritudi-
nem obtinet.) Qui dodrantalis longitudinis est, *Hæculæ* figura:
sed utrinque laterum à capite ad caudam ferrata spina armatur de-
orsum spectantibus uncinulis; ita ut à summo ad imum inoffenso
manus cursu tractare possis; contrario vero modo, non nisi læsio-
ne maxima. Iconem ejus, sub nomine *Sauri*; videas apud *Salvia-*
num.

XXVII. *ENCRASICHOLOS*, quod πολλὴν ἐν τῷ κρατὶ
& κεφαλῇ, bilis folliculum in capite gerere credatur; propter ejus
amaritudinem: the *Anchovy*; ab oris forma, λυκόσομος; Piscicu-
lus est digiti longitudine, aliquando paulo majore, sine squamis,
rostro acuto, ore maximo. *Dentibus* quidem caret, sed maxilla u-
traque ferræ modo aspera est. *Branchias* parvas habet, & duplices;
*pinna*s totidem. *Venter* est mollissimus, quam ob causam statim ab-
sumitur. *Ovis* scatent rubentibus: Pro corpusculi magnitudine,
sanguine abundant, & carnosius satis sunt: unde fit, ut delicatiores;
molliores, suaviorefque sint. *Spinis* carent, excepta dorso spina, quæ
tenuis

tenuis admodum est: ut dentibus negotium vix facessat. Sale conditi asservantur, & in garum vertuntur; quod ne corrumpantur, non nisi truncato capite condiuntur, quo cum fel, una cum hepate, cæterisque visceribus & intestinis tollitur & abjicitur. Magna istorum pisciculorum copia in *Provincia* capitur, noctu igne in naviculis accenso; magna item *Baione*; sed hi majores sunt, illi suaviores & molliores. *Rondelet.*

XXVIII. *ATHERINA*, ἀθερίνη, (ab *aristis*, i. e. spinis, quas multas habet, & *Sardinis* duriores:) *Monspelio Melet*; *Massiliæ Sanclez*, dicta; Angl. the *Prickle Fish*.

XXIX. *LAVARONUS* Bellonii, *Massiliensibus Cabassonus*, *Genuensibus Capassonus*, (à capitis magnitudine,) maximam habens cum *Atherina* affinitatem; sed grandiori capite, & corpore ad ventrem compressiori, nec spinis armatus.

XXX. *SARDA*, seu *Sardina*, & cum nondum adolevit, *Sardella*, (à *Sardinia*, unde olim in alias regiones magna copia evhebantur: seu, ad conjecturam *Marbodai* in *dactylothece*,

Sardius à Sardin est, à quibus ante repertus.)

De Spinat. *Rondeletius* τριγλὸν & τριγλῶν *Aristoteli* pro eodem pisce accipit, qui *sardine* vulgè dicitur, nisi magnitudine & ætate differant; quæ differentia duplex nobis nomen peperit, ut *Sarda* dicatur, quæ major sit, *Sardina* quæ minor. Pisciculus est (inquit) marinus, *Aphya Bælerica* omnino similis, nisi paulo major & spissior esset; à parva *Alofa* ore, branchiis, oculis, pinnarum numero, seu, squamis, cauda minime discrepans, excepto tantum quod *Alofa* sit latior. *Sardina* igitur squamas magnas, sed tenues habet; colore est varius, nimirum capite aureo, ventre albo, dorso cum viridi cæruleo, utroque splendido rutilanteque, dum viva è mari extrahitur, una cum vita viridis evanescit, cæruleo manente. *Intestina* habet parva & recta, *Alofarum* intestinis similia, *Felle* caret; ideoque non exenterata in cretula vel sartagine coquitur. Sale conditæ *Sardina* in annos duos servantur; fitque ex his *Garum*, sed minus laudandum ob squamarum copiam.

XXXI. *MÆNA*, *Mænis*, the *Cackum* (à cæcando): *Italiis* it is *lappete to the ear*, and purgeth the belly. Germani *Willing* vocant. A Liguribus, ac Romanis, servatis Latini nominis vestigiis, *Monola* hodie vocatur; à *Massiliensibus Mendola*; in *Gallia Narbonensi Jusde*; ab iis qui *Adriaticum* finem incolant, *Selave*. *Mæna* piscis est, marinus, ex squamulorum genere, vix palmum attingens. *Rostrum* est acuto, capite compresso, oculis minoribus quam *Boops*, dentibus parvis: maculis cæruleis toto corpore, & potissimum in capite & dorso sparsis. Cum foetu famina impleri incipit, maris color in varietatem quandam, & nigrorem mutatur, & pessima carne effi-

citur, vocaturque hoc tempore τεράρις, ob foctorem.

XXXII. S M A R I S, & *Maris*; *Leucomenides*, (quia semper albæ sunt, cum Mænz colorem mutant:) Gallis & Hispanis *Picarel*, the *lobite Cackerel*: Venetis *Giroli* & *Gerruli*:

XXXIII. B O O P S, βώξ, (quod βοὸς ὀφθαλμοὺς ἔχει, oculos bubulos seu magnos habeat:) the *Dre-eyed Cackerel*. Cujus tres species exhibet *Rondeletius*.

Squamosorum P L A N O R U M Classis.

IN PLANORUM numero scribuntur

I. S O L E A (à figura, quæ solo pedis ita subjicitur) γλωττα, *Lingulaca*, βέγλωττα, (non tam ob bubulæ linguæ figuram; quam ob longitudinem.) the *Sole*. Sex ipsius species ponit *Rondeletius*; *Soleam* nempe (1,) *Vulgarem*; (2,) *Oculatam*, (quod in prona parte magnas habeat maculas, oculorum effigiem cum iride & pupilla referentes:) (3,) *Cynoglossum*, the *Pole*, quæ ferini plane saporis est, inuaveq; quid & grave olet: (4,) *Arnoglossum*, seu *Arnoglossum lævum*, (quod quemadmodum Plantagini herbæ, à figura vel foliorum lævitate, *Arnoglossi*, id est *Agninz* linguæ nomen impositum est: ita species isthæc *Soleæ* *Arnoglossus*, à lævitate vel figura, recte nominari possit.) (5,) *Ligulam*, (quod sit in hoc genere omnium minima:) (6,) *Hippoglossum*, (quod cæteras Soleas magnitudine vincat:) Gallis *Flettam* dictam, quod fluitando natet.

II. C I T H A R U S, *Gazæ Fidicula* (à lineis quibusdam, à summo capitis vertice ad caudam usque, instar chordarum *Citharæ*, productis.) the *Dab*.

III. R H O M B U S squamosus, *Rhomboides Rondeletii* (à figura) the *Lurch*, *Bret-Cock*, *Bret*, aut *Pill*.

IV. P A S S E R niger, *Flesus æviatilis* Bellonii, *Flotuletus* Aldrovandi, Gallis *Flez*, Angl. the *Flounder*, aut *Flook*.

V. P A S S E R squamosus, Gallorum *Limanda*, qui idem videtur cum *Rhomboide*, in Norfolcia a *Bret* dictus.

VI. Passer Britannicus, the *Walput*, *Delbut*, aut *celbut*.

Littorali-

Littoralium LÆVIUM Non-Planorum
Classis.

Sicut Littorales *Squamosi* (quorum varia genera jam recensuimus) ita & LÆVRES (qui proxime sequuntur) pariter distribuuntur in *Non-Planos*, & *Planos*.

In NON-PLANORUM classe ponuntur

I. ANGUILLA DE ARENA, Gesnero *Ammodytes*, (tum quod longo gracilique corpore sit, ut Anguilla; tum quod sese occultura, sub arenam se citissime mergat.) the *Sand-Eel*. Quæ frequentissime in littoribus nostris capitur: ubi, quibusdam anni temporibus, seu majorum piscium injurias fugiens, seu occulto naturæ impulsu, aqua derelicta, sub arenam penetrat: indeque pedalibus & pectinatim incis lignis, ab incolis copiose extrahitur, pauperumque necessitatibus inservit.

II. DRACO, Græcis veteribus *Δράκων θαλάσσιος*, modernis *Seepuiga*, the *sea-Dragon* (quia post *Pastinacem marinam* summe exitiosus est, quod piscatorum aculeis ipsius ictorum lugubri experientia sæpius compertum.) Cujus duo ponit genera *Salvianus*, viz.

1. *Oblongum*, Gallis *Poignastre*, (quia *pugionis* formam æmuletur:) the *Dagger-fish*.
2. *Minorem*, sive *Dracunculum* Plinii; nam, cum Major crebro ad libræ unius, & duarum etiam aliquando magnitudinem excreseat; hic ne dimidiam quidem libram implet. His alia duo genera adjunxit *Aldrovandus*, qui proinde legendus est.

III. URANOSCOPUS, seu *Cæli speculator*, *ἡμεροσκοπῆς*. *Opiano* (quod interdiu dormiat, noctuque vigilet.) Cujus historiam lectu dignissimam fusc tradit *Aldrovandus*, de *Piscibus*, lib. 2. cap. 51.

IV. SCOMBRA, *Scombrus*, Horatio *Piscis Iberus*; Gallis *Maquereau* (quasi *Leno*; quod verno tempore parvas *Alaufas*, quas *Virgines* vocant, subinde insequi soleat:) the *Spackettel*. Hoc loco forsitan nec intempestivum erit, nec ingratum, si ἐν παλαιῷ monero, à veteribus Romanis laudatum in primis maximeque nobilitatum fuisse id *Gari* genus, quod ex intestinis branchisque

Scom-

Scombrorum, cruenta illorum sanie eliquata, in hunc modum præparabatur. *Scombrorum* scilicet intestina cum embrochiis, eorum cruore & sale confusa, in vase fictili menses ut plurimum duos sinebant tabescere; deinde, fundo vasis pertuso, id agebant, ut liquor iste in aliud vas illi substratum distillaret. Qui *Apitio* illo, artis culinariæ ad omnem luxum archimagiro, aliisque ætatis ejus *Asotio* tanti erat pretii, ut nullus eo liquor, præter unguenta, pluris constiterit; singulis millibus aureorum permutantibus congi-os Gari pene binos. Hinc liquamen istud fastuoso & superbo satis titulo appellatum fuit *Garum Sociorum*, vel (ut *Langio* magis aridet, lib. 1. *Epist. Medicin. Ep. 59.*) *Affociorum*. Unde *Martialis* in *Xeniis*;

*Expirantis adhuc Scombri de sanguine primo
Accipe fastosum, munera chara, Garum.*

Fastosum enim pro *fastoso* (ut vulgo habetur) recte legi, ex manuscripto probat *Hadrian Junius*, lib. 6. *Animadvers. cap. 17.* Hocque erat celebre illud Græcorum Romanorumque luxus obsonium: cui hodie *Botarge* (quasi dicas *ωατάρις*, hoc est *Mugilum Ova Salita*) & *Caviaro*, ex *Sturionum* ovis ad littus Ponti Euxini præparatum, successisse videntur in crapulæ lenocinium. *Diæ boni*, quantum hominum unus venter exercet! Gari hujus, sive liquaminis multiplex in usu fuit compositio: quod nomina declarant *Hydrogari*, *Eleogari*, *Oenogari*, *Oxygari* &c. inter veterum capedias hæc fuisse sciunt omnes, qui in Græcis & Romanis scriptoribus non hospites versantur.

Quid? illud sociorum garum, præciosam maiorum piscium sanem; non credis urere falsa tabe procordia? *Seneca. Epist. 95.*

V. *COLIAS*, *κολιάς* & *κολία*: *Aristoteli* (seu à *Pica* varia, quam *κολίς* aut *κολία* dici, nescio quo Auctore, credit *Bellonius*, quod latera habeat variegata; seu aliam ob causam:) Latinis *Lacertus*, (quia laterum dorsique maculis Lacertam terrestrem quodammodo refert.) the *Basard Spackrel*, spotted like a Lizard.

VI. *Saurus*, nonnullis *Lacertus*, (nam non solum ore, rostro, capite, atque reliqua corporis figura; sed colorum etiam varietate proxime adeo ad terrestris Lacerti accedit similitudinem, ut ei simillimus, si pedes exceperis, videri possit.) the *Lizard*, or *Haytick*. Cujus duo genera tradit *Ælianus*, *Nostræ* scilicet, quod *Acus* similis existit, si *Acus* illam rostri deimpseris tenuitatem, & *Hollandis* *Paer* *Paer* dicitur: & *Peregrinum* rubri maris, ab eodem *Æliano Hist. Animal. lib. 11. cap. 49. descriptum*. A Græcis *Εορπος* vel *Εαυπος* nominatur, à *Gaza Lacertus*, à *Gallis* quibusdam

dam *Aiguille*, acus (ob corporis gracilitatem:) ab aliis *Becasse* (à rostro oblongo & acuto.) Piscis est marinus, nullibi ad flumina adnatans pedalem mensuram nunquam excedens, admodum rarus, solivagus, carne vescens, nec à putridis abstinens. Posteriore corporis parte *Scombrum* refert, anteriore vero *Acum*; ideoque à *Rondeletio* *Acubus* subjungitur.

VII. *CORAX* *Rondeletii*, Romæ, nomine cum *Lyræ* communi, *Capone* (à capitis magnitudine) dictus, Germanis *Peet Kapp*; the *Croto*, aut *Katen Fisk*. Quem *Aldrovandus* clare describit, de *Pisc.* lib. 2. cap. 56.

VIII. *MILVUS* ejusdem *Rondeletii*, Gallis *Lucerna* (quia noctu lucet) Germanis *Molisch*, Angl. the *Fly-gander*, *Mitsch*, quasi Anser volans. Cujus duas icones videas apud *Aldrovand.* de *Pisc.* lib. 2. cap. 58.

IX. *ARANEUS*, *Scorpius* *Aldrovandi*, the *Weaver*, aut *Waver*. à Gallico *Viver*: Græcis *Δεξιων θαλάσσιος*, *Draco marinus*, Siculis & Neapolitanis *Tragina*, corrupta voce pro *Dracena*. Piscis in arena & littoribus degens, & gregalis: in mari Mediterraneo palmum majorem raro excedens, in Oceano nonnunquam cubiti magnitudinem attingens. Falcato est *ventre*, dorso recto, colore vario: dorso enim fusco est, ventre candido, lateribus lineis aureis transversim ductis pulere distinctis. *Capite* *Percam* marinam æmulator, *ore* aperto & hiantem, *dentibus* parvis densisque. *Oculi* est sursum spectantibus, & adeo splendide virescentibus, ut smaragdum pulcherrima viriditate superent. *Branchiarum* opercula in aculeos terminantur, ad eandem spectantes. In *cervicibus* quinque aculeos habet nigros, tenues, præacutos, membranula nigra conjunctos: quibus venenatum vulnus infligit, unde *notum* suum sortitus est.

Littoralium Levium P L A N O R U M

Classis.

EPLANORUM numero sunt

I. *PASSER LEVIS*, (à colore passerum) *Platæ*, Aufonio *Platea*, aliis *Pecten* (quod ejus pinnæ rectæ & parallelæ *pectinis* speciem præ se ferant) Hollandis *Scholle*, Angl. the *Plais*. Bina eorum genera sunt apud Gallos: *Unum*, quod communiter *Plya* vocatur,

atur, & magnitudine excellit: *Alterum*, quod alibi *Cariet*, alibi à quadrata corporis figura, *Quarrellet*, Quadratuli nomen sortitum est. Utrumque à *Rhombis* differt. Si *hos* ita in latus componas, ut oculi in coelum suspiciant & mentum deorsum versus spectet; pars supina erit dextra: sin *Passerem* similiter constituas, supina pars erit sinistra. Supina parte albicat, prona infumatus seu fuscus est, & terrei coloris. *Pinna* totum fere corpus ambiunt. *Cauda* in unicam latamque definit.

II. *Р Н О М Б У С*, (à figura quadrata, cujus latera sunt omnia æqualia, anguli vero obliqui:) *the Turbut*. Qui est vel *Aculeatus*, *the Thorn But*: vel *Lavis*, & sine Aculeis, *the Common Turbut*. Utrumque genus, Galli nunc *Lozange*, nunc *Turbot* vocant; Normanni *Bertoneau*; Itali omnes & Massilienses, *Rhombos*. *Aculeatus*, piscis est planus, litoralis, parte prona fulcus, in qua multi extant *aculei*, maxime circa caput, & à capite caudam versus. *Os* magnum habet, hiansque, sine dentibus; sed horum vice maxillas asperas obtinuit. Ab inferiore maxilla propendent *appendices* duæ, tenues, barbæ instar. Non procul hinc *podicem* habet. E regione *pinna* incipit magna, ad caudam usque continua. Huic similis *alia* statim à capite. Hæ totum fere corpus ambiunt, in medio ampliores, ut *rhombi* figuram efficiant. *Branchias* quatuor habet, duplices. *Cor* compressum; *ventriculum* magnum, oblongum, in superiore parte complicatum, dorso annexum: quem *intestinum* excipit, duas *apophyses* magnas habens, sed breves. Quæ ventriculi cum intestinis conjunctio, in hoc *Rhomborum*, & *Passerum* genere tantum reperitur. *Ova* rubra sunt, & ventriculi modo replicata: facit enim ventris brevis, ut omnia fere interna replicata sint. *Carne* vescitur, maxime *Canceris*; vorax est, piscesque multos ingerit. Rhombum inter delicatissimos cibos habuit veterum luxus. *Lavis* est Aculeato cum figura, tum partibus & externis & internis omnino par; demtis tantum aculeis, quos nullos habet.

Marinorum

Marinorum simul & Fluviatilium

SQUAMOSORUM

Classis.

Tertij generis Piscium, eorum scilicet, qui in Mari aque ac Fluminibus post certa temporis intervalla degunt, & ad fluviorum usque origines quasi peregrinantur; alii sunt *Squamosi*, alij *Leves*.

SQUAMOSORUM classem sibi vendicant

I. **SALMO**, (cujus apud Græcos nullum invenio nomen, & piscis hujus solus inter veteres etiam Latinos *Plinius* mentionem facit.) *the Salmon*. Qui in omnibus Britanniae fluminibus quotannis copiose capitur. Dicitur etiam Σάλαγξ. Dorsum ejus purpurascit obscurius supinum, ad latera dilutius & suavius cum splendore, punctis nigricantibus passim conspersum. Venter totus albet. Branchiæ quaternæ utrinque, coloris sanguinei. Pinnae vi suntur in dorso quatuor, quinæ in ventre. Oris rictus est parvus. Lingua alba, ossea, spinosa. Oculi iris subrubra papillam claudit nigram.

II. **LUPUS Marinus**, (à voracitate:) λαβραξ (ωσαύτην λαβραγίτην, ab ipsa vehementia:) Germanis *Wetter Walfisch*, Angli. *the Walfish*. Nam mire vorax mordaxque animal est, & dentibus suis terribile. Anchoram enim siprehendat mordicus, sonum edit & strepitum, ac vestigia conspicua relinquit. Ex dentibus ejus molaribus fingere solent Gemmarii fraudulentis *Lapides Bufonios*, & magno pretio divendere.

III. **LARUS**, piscis grandis, 200 sæpe librarum magnitudine, Nilo proprius.

IV. **ALOSA**, *σπίνα & σπρίνα*, (forte quod aculeis aliquando soleat inhorrescere: *Aristofus*, quia spinis sive aristis scatet innumeris, & vescentibus admodum molestis: Gallis *Alose*. Quæ duplicis Generis est, *Major*, *the Shad*; *Minor*, *the Pilchard*, nostro idiomate dictæ. Uberrima est minorum captura in littore nostro *Cornubienfi*, unde sale conditæ in *Italiam* & *Hispaniam* vehuntur.

V. **ZIOA**, piscis quidam *Albi* Fluvio proprius, ubi à Piscatoribus (ab aureo circa caput colore) *Gold Fitch* dicitur; & capitur ut plurimum à Festo Pentecostes usque ad D. Johannis diem; quo tempore *Sturio* migrat.

h* 2

VI. Mu.

VI. MUOIL, (à *Mucus*; Græci nempe *μύξα* dixere, quasi *mucosum* seu *muconem*: siquidem *κόσμεται τὴν μύξαν ἀπ' αὐτῆς*, *mucosuo vescitur*, ut causam Etymi explicat *Arist. in Hist. Animal. lib. 8. cap. 2.*) Cujus quinque sunt species apud eundem *Arist.* Scilicet (1,) *Cestreus* proprie dictus: (2,) *Cephalus*, cognomento *Chelon* seu *Labeo*: (3,) *Cephalus Percas*, sive *Transitoranus*. (4,) *Sargus*, sive *Sargo*; & (5,) *Myxo* seu *Meuco*.

VII. MUGIL IMBRABIS, the English Mullet.

VIII. CAPITO *Anadromus* Gelneri, *Albinus Nasus* (quia & albicat, & nasutus est:) Misenis *Zerta*, Germanis *Elbnasen*, & *Speernasen*, Angl. the *Sea-Chub*, aut *Pollard*. Quem accurate descriptum videre est ab *Aldrovando*, de *Piscib. lib. 4. cap. 7.*

IX. CARPUS seu *Capriscus*, (ex eo, quod aculeos duos post caput gerat, cornua *Caprina* haud male referentes:) Romæ *Pesce Balestra*; Angl. the *Saw-Fish*, quia in dorso fere medio tres, membrana inter se juncti, reperiuntur aculei robustissimi & magni, quorum prior reliquorum duorum triplus est, quosque omnes non solum, ubi vult, deprimit, sed in fulcum etiam ossium, in dorso ob id sculptum, recondit. Depressi autem & reconditi uti quam facillime simul eriguntur: ita eorum unus duntaxat erigi nequit. Plura & majore digna admiratione, de *Serra* hujus, sive aculeorum fabrica, loquitur *Johnston. de Pisc. pag. 110.*

X. STURIO, (quasi *Sturion*, quod rostro suo proræ puppis rostratæ speciem gerat:) *Acipenser*, Germanis *Steuer*; Angl. the *Sturgeon*. *Sturio* nomen Gothicum esse, asserit *Jul. Cæs. Scaliger*; & ab ea gente in reliquam Europam translatus, quod facile sibi persuasit *Olavus Wormius*; quia *Stur* vel *Steer* magnum notat in lingua *Danica*. At de nominis hujus origine, recentiores haud minus inter se pugnant *Critici*, quam veteres de natalitio *Homeri*: adeoque variant eorum conjecturæ, ut nonnulli non solum cæteris censeantur, verum sibi etiam ipsis, repugnare. Exemplo enim præsto est ipse *Salmasius*, criticorum facile princeps. Hic enim (*Plinian. Exercit. pag. 1316.*) nodum istum solvere, simulque insignem *Plinij* errorem detegere aggressus; animo nunc huc, nunc fluctuat illuc. Primo *Sturionis* nomen existimat à *Thursione* *διεφθαρμένου* deductum; his verbis: *nomen hoc ipsum videtur corruptum ex Thursione*: licet aliud sit *Thursio* (frustum scilicet salitum caniculae piscis, quam Græci *καρχαρία* vocant.) paulo post tamen ab ista sua sententia ultro recedens, aliam, eamque ipsam quam diu ante protulerat *Jul. Scalig.* amplexatur, sed melius *Sturionem* inquit, ex *Gottico* esse *Stur*. Quod equidem hic *ἐν καρχαρίᾳ* adnotandum duxi, non ut tantum, & sine termino eruditum virum inconstantia infimularem, (absit, à me procul absit tam stolidi calami

calami procacitas:) ast ut illustri quodam exemplo subinnuerem; quanta sint caligine vetustatis obducta nominum quorundam, olim Animantibus inter se discriminandis accommodatorum, primordia. Sed unde digressus sum, eo revertor. *Ova* piscis hujus sale condita & in massam coacta, *CAVARE* vocant Itali, Saponem nostrum viridem plane colore & substantia referentia. A quamplurimis in delitiis habentur: sed in iis nihil ego, quod delicate sapiat, deprehendi. Piscis est *anadromus*, *cartilagineus*, *solitarius*, ex *Galeorum* genere, tegumento aspero armatus, Delphino non multum dissimilis, demta integumentis asperitate. Teres est, trianguli seu prismatis fere figura, coloris obscuri, *μᾶκρορῖνχόνπος*, *rostrum* longo; *branchiæ* utrinque quaternis, *operculo* osseo scabro contextis. *Oculi* parvi. *Os* in prona parte rotundum, semper hians, absque dentibus, magis ad sugendum, quam masticandum accommodatum; ante quod propendent *appendices* carnosæ quatuor. *Venter* planus. *Ventriculus* ei crassior, ut avium. *Hepar* magnum, dulce. *Cor* ut ovis. *Pinnæ* subalbidæ; quarum binæ ad branchias, totidem ad ventrem sitæ sunt, unica dorso, non procul à cauda, inest. A capite per dorsum ad caudam usque; intar medullæ, *funis* seu nervus, digiti crassitudine, excurrit, integrum piscem roborans & firmans: coqui, dum mactare volunt, eum extrahere solent. In mari degit, ubi parit, & educatur: tandem aquæ dulcedine allectus, in flumina excurrit, & capitur. Aerē & vento puro eum nutriri asserunt: quidam limo & arena: alii pisciculis. Verum quoties secus, in ejus ventriculo nihil præter spumam & mucum deprehendi. Piscis in primis nobilis, pinguedine flava abundans, palato, Apiciorum gratissimus. Apud veteres Romanos Piscis fuit maximi pretii, & summæ nobilitatis; adeo ut eum à coronatis ministris, cum tibiis, quasi quædam non deliciarum sed Numinis pompa, in convivium inferri consueverit. Unde *Martialis lib. 13.*

Ad Palatinas Acipensera mittito mensas,

Ambrosias ornent munera rara dapes.

Plura qui cupit, *Schwenckfeldum* consulat, & *Rondeletium*.

Hujus species videntur.

1. *Galeus Rhodius*, sive *Vulpes Rondeletii*; qui frequens reperitur in *Pado* & *Rhodano*, & pro Sturione venditur: neq; ab eo distinguitur, nisi ab exquisiti gustatus hominibus.
2. *Cataphractus Schonveldij*, Germanis *Salber* dictus; qui piscis est palmorum ditorum longitudinis ad summum; de cætero Sturioni non multum absimilis. Frequenter & per totum annum,

num, in ostio *Albis* & *Edera* capitur. Incolis *Steinbicker*, *Pul-*
ter, & *Bursul* vocatur.

L Æ V I U M Classis.

AD LÆVIUM classem pertinent

I. *Huso*, (à *domo*, quasi *Hauso*, Germanis dictus; forte ab ingenti magnitudine; nam tantæ molis est, ut vix biga à tribus vel quatuor equis trahi possit.) the *Haufen*, aut *Lar* (ob spinæ dorsifilii cartilagineæ laxitatem) Idem piscis videtur cum *Antaceo* *Æliani*.

II. *EPERLANUS*, *Perla* (à nitido splendidoque colore) *Viola* (quia violæ odorem expirat, & gratissime redolet.) the *Sweet* (because of his sweet smell.) Optima & frequentissima capitur in multis *Angliæ* fluviis: major tamen proventus circa vindemiarum tempus, quando delicatissima est.

III. *LAMPETRA* (vel à *fulgore*, quasi lampas petræ; vel à lambendis petris: vel ab *Alabeta* Plinij, quæ ἀλαβῆς dicitur, quod manu propter lubricitatem capi non possit.) the *Lamprey*. Piscis est marinus & fluviatilis, veteribus (nisi forte sub *Muræna* nomine, quod opinatur *Rondelet*.) incognitus; lubricus, colore cæruleo subnigro; septem parvis *fistulis* seu foraminibus, mirabili ordine distinctis, aquam reddens. Os ei patulum figura fere orbiculavi, sine dentibus: suctioni quam masticationi accommodatus. Veris initio fluvios ingreditur, ut illic ova pariat, in mare deinde rediturus. Verisimile est, hunc piscem vilem fuisse olim, nec mensis lautioribus apponi solitum; cum nulla ejus mentio à quoquam veterum facta fuerit. Hodie in delitiis habentur à Magnatibus. Apud nos in *Sabrina* flumine, circa vernum tempus, ingenti copia capitur: esui mire expetitus. Hujus non unum Genus est. Sunt quæ à mari flumina subeunt: sunt quæ à falsis aquis omnino abstinunt. *Marinarum* tres species recenset *Johnstonus*, de *Piscibus*, pag. 118. *Fluviatiles* sunt (1.) *Major*, the *Lamprey*: (2.) *Minor*, apud Herefordienses the *Stone-Grigg*.

IV. *ANOUILLA*, (ab *Anguis* similitudine:.) Græcis veteribus ἰχθυόλη (ἀπὸ τῆς ἰλῦς, quod commoto cœno facilius capiatur:.) modernis ἀχέλυ the *eel*. Ortum earum quod attinet; quanquam *Aristoteles* (*Hist. Animal. lib. 6, cap. 15. edit. Scaliger*) expresse affirmet, in disiectis neutrum sexum, nec ova vel semen deprehendi

deprehendi posse: nonnullas tamen ex iis, majores potissimum, viviparas esse, nos plusquam una dissectione edocti sumus. Et memini, me semel ex Anguillæ prægnantis utero undecim Anguillulas exsecuisse, singulas suis secundinis inclusas. In Anguilla, retro caput circa initium Spinæ dorfi, *cavitas* quædam reperitur in ipsa cute; unde utrinque ad latera descendit *meatus* quidam, qui ubi ad locum ventrem inter & spinam fere medium pervenit, recta inde ad caudam usque per media piscis latera decurrit, quo loco *linea* conspicitur exterius à capite ad caudam usque extensa. In hoc meatu utrinque ad cavitatis magnæ latera, *tres alie cavitates* existunt, ad aliquod intervallum à se invicem distantes: pars *meatus* inter singulas cavitates intercepta, cartilaginea substantia est incrustata, quo modo ductus totus ejusdem meatus utrinque ad caudam usque ex plurimis *tubulis* durissculis compositus est, quos inter tubulos certæ *papillæ* eminent, eo modo perforatæ, ut flatui pateat exitus facilis; stilus autem introitum difficulter inveniat. Inflata media cavitate, quæ pone caput est, intumescunt cavitates, quæ illam inter & mediam laterum lineam intercipiuntur: sed nullum aër exitum invenire potest, nisi in papillis descriptis. Cui autem *usui* tot foraminibus pertusus meatus inservire possit, determinare non ausus est accuratissimus Anatomicus, *Nich. Steno*, qui ipsum primus observavit: quandoquidem vacuum illum invenerit, nullo pituitosi humoris ne vestigio quidem apparente. *Mari* caput est majus, rostrumque obtusius: fæminæ minus, acutiusque rostrum.

V. **O R B I S** (quia rotundus est, & sine squamis, totusque capite constat.) *Peet Laube*, *Peet Flach*, *Kugel-Fish* Germanis; *the Globe* aut *Skull-Fish*, Angl. (quod ad crani humani formam magnitudine, rotunditate, & dentibus similibus accedat:) qui est vel

1. *Vulgaris*, figura, si caudam demseris, sphericus, squamis prorsus destitutus, cuteque admodum dura, & aculeis multis aspera textus. Os habet parvum, dentes vero magnos & latos, utrinque binos.
2. *Scutatus*, sive *Scutifer*; piscis rarus, *naculus*.
3. *Echinatus*, (quia aculeis totus riget, ut manu tollere non possis, nisi cauda extrema apprehensa,) & *Muricatus*, *the Hedgehog-Globe-Fish*. Idem forte cum Plinii *Sagittario*.
4. *Stellatus*, sive *Asterias*. (quod totus conspersus sit asteriscis:) *the Starry Globe-Fish*.

Hiscæ annumeravit *Gesnerus Orbem Britannicum*, sive *Mucoquem*, à muco, quem, cæterorum Orbium more, ore emittit: unde nostris etiam dicitur *the Snout-Fish*.

VI. **HOLOSTEUS** Bellonii (quasi *totus ossis*) seu *Ostracion* Gefneri (ex corii duritie, qua testam fere Ostraceorum imitatur:) qui forma ad pentagonum accedit, & penicillum in cauda habet. Duo ejus genera exhibet *Johnstonus* (*de Piscibus*, pag. 124.) *Americanum*, & *Niloticum*.

Fluviatium S Q U A M O S O R U M
Classis.

HActenus de Piscibus *αἰαδέρμιοι* & *καταδέρμιοι*: sequuntur *ποτάμιοι*, **FLUVIATILES**; qui in Squamosos, & *Læves* dividuntur.

Inter *Fluviatiles* **S Q A M O S O S** sunt

I. **TRUTTA**, seu *Trocta*, (à *trudendo*, quoniam semper in adversum & impetuosum flumen nitatur, adversas undas superare:) *Italica* *Torrentina* (quod in torrentibus & rivis montanis abundet.) *the Trout*. Varius admodum est piscis, *Squamulis* minutissimis contextus, purpureis seu rubentibus *maculis* totum corpus pingentibus, *carne* intus rubra; quemadmodum in *Salmone*. *Lingua* ossea & spinosa. *Ventriculus* longiusculus, cui parte inferiore ac intestino *Appendices* longiores adnascuntur, quarum superiores ventriculum ipsum attingunt. Extra aquam citissime expirat; indubie ob amplam branchiarum scissuram. *Pinguedo* Mariscis & anifissuris utiliter illinitur. Hujus species sunt

1. *Trutta Fluvialis Vulgaris*, *χρυσόσκιος*.
2. *Taurina* (ab insigni magnitudine) apud nos in Northumbria, a *Bull Trout*; & in aliis Provinciis, a *Grey Trout*; in aliis a *Skurf*.
3. *Minor*, Cornubiensibus a *Shute* dicta, agri Lincolnienfis incolis, a *Shard*.
4. *Salmoneta*, parvus *Salmo*, a *Salmon Trout*. Reliquæ differentiae à coloribus duntaxat desumptæ videntur.

II. **THYMALLUS**, (à *Thymo*, quem olet; unde Bellonius *Thymum* vocavit.) *χρυσόψαρος*, *Aurivorus*, (seu quod minutula auri

auri fragmenta propter splendorem appetant : seu quod, cum majori pretio veneant, obsoletorum aurum absument, & loculos exhauriant.) Aesch Germanis, a kind of Trout, smelling like Thyme; a Grayling. Piscis est spectatu dignissimus; squamis durissimis argentei coloris tectus; ad latera juxta caudam æris rubedine splendens. Pinnis donatur subcæruleis; notis rubentibus maculatis. Lien sanguineus. Ventriculus longior crassiorque; rugosus intus, foris candidus, cartilaginis instar durus, appendiculis plurimis, ceu lumbricis, donatus.

III. UMBRA Fluvialis, (à colore umbroso:) the Umbel. Idem piscis Gesnero cum *Trutta fluviali*; & certe ex *Truttarum* genere.

IV. BARBUS, (à cirris qui ex utroque ipsius labro dependent; & obeandem rationem *Mystivatus*, the Barbel. *τρίγλη* Arist. *μυσός*, *μυσαός*. Barbatulus Ciceroni. Barbatus Varro. Est capite parvo, acutiusculo. Color dorfi fuscus, latera ex fusco flavent, ventre candidus. Pinnas habet senas, singulas in dorso & ad podicem; in ventre medio, & ad branchias duplices, ex rubro liventes, maculis nigris coloratas. Oculi centrum nigro-cæruleum, iris angusta aureo micat fulgore. Appendices ori adnatæ quatuor: binæ superiori, totidem inferiori labro carnosæ, lividæ. Jecur est pallide rubens, in hærente vesicula fellis rotunda, cærulea. Splen exiguus, sanguinei coloris. Cor triangulare, latiusculum. Muscis, vermiculis, mucò & pane vescitur. Ova venenata creduntur, adeo ut si largius comedantur, eos qui hauserunt, in magnam vitæ periculum adducant. *Schwenckfeld*, ex *Rondeletio*.

V. CAPITO Fluvialis, (à magnitudine capitis:) *Squalus* veteribus: Gallis *un Villain*, (quia coeno & sordibus vescitur.) the Chub, Chevin, aut Pollard. Qui est vel *Majör*, vel *Minor*, vel *Rapax* Gesneri.

VI. ORFUS Germanorum, seu *Capito ruber* Gesneri, a kind of Chub, with a reddish back, frequent about Aispurg in Germany and there called an Orf.

VII. LUCISCUS, modernis Græcis *λευγεῖς*; Bellonio *Albicella*; the Dar, aut Dart, apud nos in Fluvio Trent dicto satis frequens.

VIII. OXYRINCHUS *Rondeletij*, Gallis *Bectassa*, utrumque nomen à nasi longitudine venit: Antuerpiensibus *Pautin*, the Spinnose.

IX. CORVUS NILOTICUS ejusdem *Rondeletij*, corporis figura *Mugilibus* per similis, sed caput, pro corporis proportionem (longum enim dodrantes duos) parvum habens, & maxillam inferiorem superiori breviorē. Hujus descriptionem & iconem exhibet *Aldrovandus*, de *Piscibus*, lib. 5. cap. 23.

X. *Nasus Alberti magni*, (ab oris figura, seu *Naso* valde crasso:) Germanis joculari nomine *Sriba* (quia venter ejus intrinsecus *nigerrima* membrana ambitur,) dictus, & *Leuciscus fluviatilis* jure merito adscribendus. Nominatur etiam *Σίπας*: Geineri, *Platytyrinchos*, *Labeo*, *Chelon fluviatilis*, *Naso*, *Nasutus*. Capitoni fluviatili non dissimilis est. *Latero* & *Venter* argentei sunt candoris. *Dorsum* ad cæruleum tendit; circa *caput* subflavet. *Oculi* iris aurea. *Pinnas* habet miniati coloris sex; singulas in dorso, & juxta podicem; duas ad branchias, & totidem in ventre medio. *Cauda* ejusdem coloris; sinuata. A capite utrinque per medium piscem excurrit *linea* fusca ad caudam usque. *Osc* ejus veluti labra habere videtur. *Labrum* seu rostrum superius crassum, finum, obtusius. *Nares* patulae sunt. *Branchiae* octo, utrinque quatuor. *Viscera* tunica *nigerrima* involvuntur. *Intestina* replicantur, quibus adjacet *hepar* longiusculum, sine felle.

XI. *Gobio* Fluviatilis, *Fundulus* (quia degit in fundo:) the *Gudgeon*, aut *Pink*.

XII. *Gobio* non Capitatus, Germanis *Krebling*, aliis *Leutesser*, (quod cadaveribus submersis vescatur:) the *Grepling*.

XIII. *Gobio* Capitatus, (à Capite pro corporis ratione maximo:) the *Bull-head*, *Cull*, aut *Willers thum*. Apud nos sub saxis in rivulis plerumque stabulatur. Carnivori creduntur, & à se mutuo devorari certum est.

XIV. *Gobites* Barbatus, Gallis *Lota*, the *Loch*.

XV. *Asper* *Pisciculus*, (à maxillarum squamarumque *asperitate*, *Rondeletio* ita dictus:) the *Sharpling*.

XVI. *Asper* major Danubianus, Germanis *Zindel* dictus. Quem *Gesnerus* optime describit.

XVII. *Cobites* Fluviatilis *Rondeletii*, Gallis *Loche Franche* (vel quod totus laevis sit, & aculeis careat: vel quod mollior sit, & salubrior: the *Groundel*. *καβίς*, *κίχλη*. *Pisciculus* est spithamam longus, ut plurimum laevis, cirris tenuibus rostro, barba modo, pendentibus. *Ventriculus* longiusculus, *Phaseoli* fere magnitudine & forma. Hujus species sunt

1. *Cobites Aculeata*, (duos enim habet in branchiis aculeos, utrinque unum, ad caudam spectantes, dentium *Cerastris* *Serpentis* longitudine; quibus se impellit, ut minima inter lapides foraminula subeat:) Germanis *Steinbeis*, & *Schmerlein*, Angl. the *Smeltin*. *Pisciculus* priori cognatus, rostro acutior: coloris ex fusco viridantis, maculis & lineis nigricantibus varius, non autem rotundus, sed quasi columnalis compressus. In branchiarum operculis *aculeum* utrinque habet. Non solum *Loche*, sed etiam *Perce* à Gallis nominatur. *Rondel*.

2. *Cobites*

2. *Cobites Barbatula*, (à cirris tenuibus è rostro, barbæ modo, dependentibus.) the bearded Ecommel.

XVIII. *PHOXINUS* squamosus *Aristotelis*, quem *Rondeletius* sub nomine Gallico *Rosiere* describit. Piscis nobis invisus. Itali *Bambelam* vocant.

XIX. *BUBULA* Bellonij, fordidus admodum & vilis pisciculus; Gallico vulgo è re ipsa *Bauviera* dictus; aliis *Peteuse*, etymologia à bombis obscenis tracta. Est *Seguana* fluminis alumnus, non tamen usquequo frequens.

- XX. *RUTILUS*, seu *Rubellus Fluvialis*, (à rubro pinnarum colore:) the Kesh.

XXI. *CARNUA* Fluvialis; aliis *Perca minor*, the Kough; vel (sicut vulgo, sed minus recte scribitur) *Kuff*. Nomen, quippe ab aculeis asperimis desumptum videtur.

XXII. Pisciculus *VARIUS* *Rondeletii*, the *Opomus* (quasi dicas Franco-gallice, *le poisson menu*, piscis minutus vel minimus.) *Perca* Galli vocant, quasi *variam*, à variis coloribus quibus depictus est: eandem ob causam, *Pardilla* ab Italis: ab aliis *Sanguinorot*, à rubore: à Romanis *Marella*, à nigrore dicitur. Græci quidam, ab oculorum colore rubro, *ἰσθῆς πορφυρά* nominant. Est ex *Phoxinorum* genere. *Parte* enim circa littora fluviorum & rivo-
rum, & quantumvis parvus capiatur, ovis plenus reperitur. *Dorsum* aurei coloris est cum splendore, *venter* argentei, *latera* purpurascunt. *Cauda* in pinnam auream & latiusculam deficit. *Pinnas* in dorso, & in ventre totidem habet, quot reliqui *Phoxini*. *Pellis* multum habet, quare non nisi evisceratus coquendus. Longitudinem digitem excedit nunquam.

Fluviatilium LÆVIUM

Classis.

INTER LÆVUS censentur

I. *ARTIUS* Padi, Piscis grandis, & Cartilagineus; & *Stracioni* magna ex parte respondens: in *Pado* inertia pinguescens, ad mille aliquando libras catenato captus hamo, nec nisi boum jugis extractus, ut *Plinii* verbis utar. Describitur ab *Aldrovando*, de *Piscibus*, lib. 3. cap. 1.

k 2 *

II. AN-

II. *Antacæus Stellaris*, Piscis etiam cartilagineus, asseri-
fcis quibusdam pallidi coloris in dorso insignitus; de cætero
Sturioni non abfimilis, rostro tantum excepto, quod longius
& gracilius. Accedit ut plurimum ad 25 libras. Huic cognatus
est

Antacæus Borysbenis Rondeletii (à flumine *Borysbene*, in quo na-
scitur & vivit) qui *Sturionem* pariter tam internis, quam ex-
ternis partibus refert, hoc dempto, quod pro eminentioribus ac
callosis tuberculis, quibus *Sturio* præditus est; hic stigmatis
tantum lividis, sessilibusque maculis in cute minus aspera, ad
latera sit distinctus. Præterea unicam duntaxat pinnam ab
ano ad caudam gerit: *Sturio* autem duas habet.

III. *ICHTHYOCOLLA* (quia glutinosum habet corium, ex
quo gluten illud *Ichthyocolla*, ~~Anglase~~ dictum, conficitur) *Tanaïs* flu-
minis, ubi frequens est, accolis *Barbota* dicta, (quia è superiori
maxilla quatuor apophyles carnosas, *barbe* instar dependentes ha-
bet.) the *Glen-fish*. Quem diligenter describit *Bellonius*, lib. 2. de
Piscibus.

IV. *GLANIS*, *Glanus* & *Glanus Aristoteli*, (à *Glanide Italia*,
& *Cune* fluvio, ubi crebro capitur:) *Aliano Silurus*. Piscis immo-
deratæ magnitudinis. Nam non solum 200 librarum, sed major e-
tiam nonnunquam capitur, *Gesneri* testimonio. Descriptionem
qui desiderat, adeat *Schonfeld. Ichthyologie*, pag. 69. Unde hoc uni-
cum excubere mihi visum est. *Cornua*, quæ supra & infra os habet,
quotannis decidunt, & rursus nova succrescunt, sicuti *Cerdus*. An-
glis dicitur *Sheat-fish*, & *River-whale*.

V. *BARBOTA Gallorum* (non à barbis, inquit *Bellonius*, aut
à runco; sed ex hoc, quod Galli *barborare*, coenum & lutum rostro,
anserum modo, commovere dicunt,) quæ cum *Lota Lugdunensium*
convenire videtur. Vide sis *Bellonium de Aquatilibus*, lib. I.

VI. *MUSTELA* Fluvialis, *Mediolanensibus Botta* (seu
quod utri similis sit, ut *Cardanus* deduxit: seu quod capite ranas re-
ferat.) the *Cel-pout*.

VII. *LAMPETRA* Fluvialis, the *Lampern*. *Tholosanis*
Chatillou (à titillatione, quod cum manu tenetur, quasi titillatio-
nis sensu, variis flexibus videatur contorquere se & elabi) dici-
tur.

VIII. *PHOXINUS lævis*, seu *varius*, Romanis *Morella*
(quod nigris punctis & tenuissimis lituris fugilletur:) *Insubribus*
Sanguinerol (à rubore) the *Penot*, aut *Penoe*.

IX. *SALMERINUS*, seu *Salmero*, (nomen à *Salmone* detor-
tum est, quo cum carnis rubedine, & forte genere quoque conve-
nit.) the *Salmon Peal*. Horum in nonnullis *Cambro-Britanniæ* flu-
viis

vis tanta reperitur copia, ut nullius ferme pretii habeantur, & Piscatores quos vendere nequeunt porcis nonnunquam projiciant.

X. *ALOSA* Fluvialis, seu Clupea, the *Skye*.

Piscium, qui præter fluviös, alias quoque
aquas dulces incolunt,
Classis.

Inter *λιμναίαις*, five *LACUSTRES*, hoc est non solum in fluviis, verum in lacubus etiam, stagnis, piscinis, aliisque aquis dulcibus degentes, numerantur.

I. *DISCICULUS* aculeatus, (ut à pisciculorum omnium minimo exordiamur,) *Pungitius* *Alberto Magno* dictus (à lanceolis five aculeis, quibus horret:) Germanis *Statelsch*, aliis *Spinochia*, *the Kniffichle*, aut *Reichling*. Rivuli, lacus, imo & fossæ aquis stagnantibus irriguæ, horum pisciculorum copia abundant. Generis autem duplicis sunt; *Majoris* nimirum, & *Minoris*.

II. *PERCA* major, *πέρκα*, *πέρκα* (vel à *παραίρειν*, id est *variari*, quod variis coloribus depicta sit, vel quasi *Porca*, à spinis quibus in dorso, instar setarum suillarum, munitur.) Gallis & Anglis *Percy*. Piscis & amni & lacui communis, toto corpore squamosus & argenteus, virgulis lineisque, seu potius maculis ex cæruleo subnigricantibus, à dorso ad ventrem descendentes quasi undulatus. *Pinnæ* & *Cauda* rubescunt. *Branchias* habet utrinque quaternas, easque duplices, novissima excepta. *Pinna* duæ in dorso erectæ sunt, quarum prior major est; duæ sunt ad branchias altiores quam in reliquis fluviatilibus; duæ in ventre, unica est post anum aculeo innixa. *Os* ei parvum est, dentibus armatum minoribus. *Podex* in medio fere corpore situs. In dorso impares eriguntur *aculei*, testui inter se membrana conjuncti. *Ventriculus* amplior longiusculus, sub cujus medio enascitur *intestinum*, tribus *apophysis* donatum. *ιχθυοφάγος* est; omnis generis pisciculos devorans, nec suo generi parcens. Lapillos (vulgo quidem, sed perperam (nam ossæ substantiæ sunt, cranique partes) sic dictos in capite gerit binos & rotundos, juxta spinæ dorsi initium; qui contra *Lithiasis* commendantur.

III. *PERCA* minor, quibusdam *Cernua*, Trago *Aurata* (quod extra aquameducta, ac suo humore viscido liberata, aureo fulgore in cæruleum abeunte insignis sit:.) *Cato* nostro *Aspredo*, (quia alper

asper est pinnis spinosis;) the *Maugt*. Ob uberrimum horum piscium proventum, apud nos percelebris est fluvius quidam, *forte* dictus, non procul *Norwica* in *Norfolcia* fluens; ut à *Camdens* nostro (in *Hist. Norfolciae*) olim notatum.

IV. SCROLLUS Danubianus, Germanis *Schrollen*, ab *Aldrovando*, de piscibus, lib. 5. cap. 35. & 36. descriptus.

V. ALBURNUS *Ausonii*, ἐρυθρόφαλμος. (ab oculis magnis rubescentibus) circa *Vercellas*, inquit *Ballonius*, in amne *Lagogna* Ticinum influente, à piscatoribus *Scavardin* dictus; the *Bleth*, aut *Blets*, aut *Bleak*. (forte à Græco *Βλάξ*, qui piscis quidem inutilis exponitur, & certe hic pisciculus oppido vilis est.) Gallis *Able*, Græcis *λευκίσκος*, ab albido & pallido colore. Latiusculus est piscis, *Brama* fere similis, at tenuior; cuius pinnae posteriores, cum cauda ex rubro livent, superiores fuscae. Capite parvo, squamis mediocribus, albicantibus: unde *Alburni* nomen fortitus est. Caro spinis referta, non admodum improbi succi. De hoc observatu dignissimum piscatores memorant, confirmante *Sebuenckfeldi* μυροφία, quod nimirum *Alburnus*, non solum sui generis pisciculos pariat, verum etiam *Anguillas* procreet. Aprili mense (inquit idem *Sebuenckfeld*) branchiis ipsius innascantur minutissima quaedam animalcula 4, 5, vermium specie, filii candidi instar contorta seu convoluta, quæ, cum moveri incipiunt, in aquas abscondunt, celeriter vivunt, & adolascunt, & *Anguillarum* formam nanciscuntur. Hujus apud nos observantur duæ species, quarum prior tergore fere ad castaneæ colorem vergit: altera ad cæruleum. Ultrisque vero pinnae & cauda etiam ad castaneam inclinant. Cætera argenteo colore resplendent.

VI. EPERIANUS *Ballonii*, qui *Sequanicum* cognominat, à *Sequana* fluvio, ubi abundat; additque sic vocari, quasi *Excellentus*, à præstantia, quæ cæteros sui generis pisciculos excodit. Ego quidem crederem eundem esse cum *Eperlano*, the *Sunk*; tum quia & odore & colore nil ab invicem discrepant; tum quod ovis semper prægnans sit uterque.

VII. LUCIUS, (vel à Græco nomine ὁ λύκος quod *Lupum* significat; quia hic inter fluviatiles sit voracissimus & edacissimus, quemadmodum inter marinos *Lupus*, cui Græci à voracitate λαβερκος nomen dederant: vel à lucendo:) Gallis *Brochet*, vel ab aliis *Bequet* seu *Bechet*, à rostro prominente. Angl. the *Pike* (vel ob similitudinem rostri cum *hasta*, vel quod se instar *hastæ projectæ*, in aqua promoveat: unde Franco-gallice etiam *Lanceron*, à *lancea* appellatur:) & dum adhuc parvus est, *Pitcher*. Branchias habet senas, utrinque ternas. Oculi coloris aurei sunt æmuli, maxime ad *Iridem*. Palato ejus natura duos denticum ordines infixit, quoniam in superiore maxilla nulli sunt: inferior maxilla dentibus acutissimis, impari-

imparibus, & duplioi, interdum triplici serie extantibus, in os recurvis armatur, ut in *Cane Sarcharia*. Cor sub brachio minucum sature rubet. Hepar longiusculum, simplex, pallens sul anteriore parte Fel jungitur majus, ceruleum. Vada petunt, cum parturiunt: ac saepenumero singulas feminas mares. 12, 13, aut 14, sequuntur.

VIII. CYPRINUS, Oppiano *νοτιον*; (forte à Cypride, quod fecundissimus sit:) aliis *Carpa* & *Carpio*, Athenis *Ανιδάρι* (à squamis seu latissimis & maximis, seu ita firmiter vallatis, ut lapidis ictus ab his facile repellatur) the *Carp*.

IX. ABRAMUS, *Cyprinus latus*, Italis *Scarda* seu *Scardula*, the *Bream*, aliis *Barn*; & ubi in maiorem molem excreverit, Cornubiensibus à *Bala*.

X. PALLERUS Aristotelis; *Holland*, apud quos cum obtopiam, tum quod per se insipidus sit, vilissimus habetur, *von Blope* dictus. Qui *Cyprino lato* tam similis est, inquit *Rond. letius*, ut parum cantis pro eo saepe vendatur: sed ab eodem magnitudine corporis & squamarum differt, & pinnarum caudaeque colore. Confulo *Aldrovandum*, de *Piscibus*, l. 6. 5. cap. 44.

XI. TINCA, *Merula fluviatilis* Scaligero, the *Tench*. *Martianus* dictam putat quasi *timēta*, sc. subviridi & nigricante colore. Piscis latusculus, utrinque quasi compressus, squamosus, cauda lubricus, ad nigredinem tendens, pinnis cartilagineis. Celeriter ad justam magnitudinem accrescit. Tinea umbilico imposita *Mertiam* sanat, vulgi experimento. Plantis pedum per medium secta, supposita, in *pelle* venenum divertit; nec non calorem febrialem. Fel aurium affectibus, flatibus, & vermibus efficax medela.

XII. LOT A Gallorum, quam ex descriptione *Rondeletii* eandem esse conpicio cum *Gobio barbata*, the *Loach*.

LACUSTRIUM, proprie sic dictorum, Classis.

I. UMBRA, (quasi *umbra*, seu quod haud exiguum cum Umbra pisce fluviatili similitudinem habeat: sed quod tergus praemulto livore opacum & veluti umbrosum appareat:) *Rondeletio Salmo Lacus Lemani*, (quod corporis specie, pinnarum numero situque, & partibus internis Salmonem referat.) Helvetiis *Rosale* (à colore circa ventrem rubicundo.) à *Salmonis* *Lemni*. Quae est vel

vel *Major*, vel *Minor*. Utraque à *Bellonio*, de *Aquaril. lib. 2.* descripta. *Rondeletius* tertiam addit speciem, quam *Lemanus* lacus accolæ *Umble Chevaliere* vocant, forte ob magnitudinem, præstantiam & robur.

II. *TRUTTA* lacustris, the *Lake Trout*. Cui affinem judicio Piscem illum apud nos, a

III. *CHARE* dictum, à *Camdeno* nostro (in descriptione *Agri Lancastriensis*) his verbis celebratum. "Inter hos montes lacus totius Angliæ maximus, nunc *Williamus Per*, à tortuoso forsitàn meatu, per decem plus minus millia, fundo quasi continuo laxo constricto, ripas incurvat, immensæ alicubi, ut accolæ ferunt, profunditatis; pisce sibi peculiari, quem accolæ *Chare* vocant, fecundus. Est enim *Truttis* per omnia similis, excepta tantum magnitudine, quæ pedalem raro excedit. Idem piscis esse videtur, cum *Carpione Rondeletij*, quem tanti faciunt Itali, ut vix unum alium vel marinum, vel fluviatilem cum eo conferendum putent. Hoc tantum à *Truttis* differt (inquit *Rondelet.*) quod ventre sit paulo prominentiore, & rostro longiore. Cæterum partibus internis, carnis suavitæ & substantia *Truttas* optimas refert.

IV. *LAVARETUS* *Allobrogum*, (à munditiæ & candore, quod nunquam sordidus sit:) quem *Bellonius* ad *Truttarum* familiam refert. Nunquam pedem excedit, neque crassior est eo, quod pollex & index capere possunt.

V. *BIZOLA*, *Bisula*, *Lavareto* non admodum dissimilis, nisi quod colore minus est candido, ad cæruleum inclinante, rostro acutius, capite minore, ventre latiori, & prominentiori. Nullum piscem reperias, cum quo melius comparari possit, quam cum *Alavengo*, quem in marinis descripsimus.

VI. *CARPIO*, qui piscis sit, apud veteres ignoratur. Moderni quidam in solo *Benaso* lacu reperiri, & à carpendo auro dici aiunt. *Lacustri* potissimum *Trutta* congener statuitur ab *Aldrovando*, de *Piscibus*, lib. 5. cap. 30. unde descriptionem petas. Anglis, à *Chare*, de quo supra.

VII. *ALBULA* *Parva* & *Minima* *Gesneri*, Germanis *Beglings* & *Ganglthes*: accurate delineatæ ab *Aldrovando*, de *piscibus*, lib. 5. cap. 35.

VIII. *ALBUS Salviani*, piscis *Alburno* magna parte persimilis, sed majoris longitudinis, & squamis amplioribus confectus.

IX. *FARRA*, *Fora* & *Pala* quoque dicta, *Lavareto* à *Rondeletio* assimilata, & descripta ab *Aldrovando*, lib. de *Pisc.* 5. cap. 56. Apud nos capitur & in lacu quodam *Cambrobritanico Pala* dicta, ubi ab eximio candore *Quintia* vocatur, & prope oppidum *Præst* in *Cumberlandia* situm, ab incolis *Schelles* nominatus: observante *D. Ray*, *Itinerar. pag. 430.*

X. *PI-*

X. **P I G U S**, *Pici*, *Pigi*, & *Picqui* Verbani lacus accolis dictus, (quod clavis suis seu aculeis pangat.) Rondeletio *Cyprinus Clavatus*, Alberto *Vergiliades*, (quod Vergiliarum ortu apparent,) quem lingua nostro appellare liceat, *the Pickly Carp*. Nam *Cypri-no*, describente *Rondeletio*, ita similis est, ut, demtis quibus horret aculeis, *Cyprinum* esse affirmes.

XI. **S C H I L U S**, *Nagemulus*, Germanis *Pag Maul*, piscis forma non dissimilis *Lucio*; sed squamarum magnitudine, ordine & asperitate *Percam* referens. Reperitur in *Ambrosii* lacu *Bavaria*; sed raro capitur, quoniam raro altius natando evehitur. Lege *Aldrovand. de Pisc. lib. 5. cap. 59*.

XII. **S A R A C H U S**, *Sarachinus*, Bellonio *Aco* (ab offciculis sine dubio illis acutis, quæ alperam spinosamque in ejus ventre lineam constituunt, & veluti acus sunt:) alicubi forte *Sardanella*, vulgari *Mediolanensium* idiomate *Agonius*. Quem cum generibus suis descriptum videre est apud *Bellonium de Aquatilibus, lib. 2*.

Hucusque Pisces enumeravimus *Oviparos*; quibus, præter *Ovarium*, nulla alia pars generationi dicata est. Horum enim ova foris incrementum sumunt; nec utero ad hanc rem opus est. Videturque ovarium hoc testiculis, aut vesiculis seminalibus anologon: non solum quod in eo loco reperitur, in quo maribus testiculi nasci solent, (nempe prope cinctum corporis, juxta ingressum arteriæ *Cœliacæ*, in *Pennatis*;) sed etiam, quia in utroque piscium sexu, generationis tempore, duo folliculi per totum ventrem ducti, situ, figura & magnitudine pares insunt: qui simul adaucti, replentur; in mare quidem materia similari, spermatica, lactea (unde *Lac Piscium* dicitur, nostratibus vero, *the soft Rotte*,) in foemina vero, granulis innumeris, præ exiguitate visum effugientibus; adeo ut in conceptionis initio (propter arctam eorum compagem) corpus simile; & tanquam maris lac regulate coagulatum appareant; posteaque tanquam minutæ arenulæ invicem intra folliculum coherentes videantur, ut *Harvaus, de gener. Animal. Exercit. 3*.

Piscium CETACEORUM
Classis.

Aquatilia Sanguinea ab Aristotele in Pisces & Cetos optime distinguuntur; non quod Ceti è Piscium numero excludi debeant, utpote qui in aquis pariter degunt; nec quod magnitudine excellant, siquidem in genere Piscium adeo magni reperiuntur quandoque, ut quosdam Cetos mole superent: sed & quia *Organum habent Respirationi dicata*, quibus carent Pisces, pulmones nempe, arteriam asperam, collum, aliasque partes cum Quadrupedibus communes, ut renes, vesicam, testes, penem, mammam, & quia *vivos pariunt fetus*. Cum igitur de illis jam dictum; hoc ut nunc contemplemur necesse est.

Inter PISCES: CETACEOS numerantur

1. *BALÆNA*, *Balena*, *φάλαινα*, (vel *βαλαιν*, hoc est, *ejicere, emittere*, nempe quia altius aliis belluis marinis undas jacit: vel, à *φάλαξ*, quo vocabulo Græci meatum in galeis militariis, cui plumas olim inferebant, indigitant,) *the Whale*. Cetorum quamplurima esse Genera videntur, & ut ego cum *Ol. Wormio* existimo, omnia nobis nondum satis sunt explorata. Extat enim, inquit idem *Wormius*, *Musei sui pag. 279.* liber manuscriptus, prisca nostra *Danica* nempe lingua exaratus, quem *Speculum Regale* vocant, cujus autorem fuisse Regem *Sueonem* multi putant; in quo supra viginti species Cetorum enumerantur, in mari Norwegico observatorum. Quorum Catalogum exscripsit *Wormius*.

E notioribus autem sunt

1. *Balena vulgaris*, *the common Whale*. Cujus generis plurimæ circa Islandiam, Gronlandiam, & vicina Septentrioni loca, à Biscainis, Anglis, Hollandis, circa solstitium æstivum, quo tempore sinus recessusque maris paciores quærunt, capiuntur. Referunt quidam, qui harum belluarum capturæ in mari Aquitanico interfuerant, oculos ipsarum vix esse humanis majores; gutturque adeo angustum, ut vix potuisset capere simul duos scombro.

2. *Phy-*

2. *Physeter*, & *Physalus*, (αἰσὶν τὸ πρὸς αὐτὸν ab effluendo, quod copiosiore aquarum eluvie præ cæteris efflare dicatur,) the puffing, aut spouting Whale. *Turnerus* noster ingentis & fere portentosæ magnitudinis hunc facit, & singulos se eorum tantum aquæ è fistulis, quas in capite habent, ejaculantes vidisse adjicit, ut singuli singulas naves onerarias aquarum copia in profundum submergerent.
3. *Cetus Dentatus*, à *Carolo Clusio* (*Exot. lib. 6. cap. 17.*) descriptus; in cujus capite reperitur liquor ille pretiosus, qui vulgo *Sperma Ceti* vocatur; Hollandis Walrus dictus, the Sperma-Ceti Whale. Talis fuit bellua illa, quæ ante annos circiter viginti, in littus nostrum, non longe à *Norwico* in *Norfolcia*, magna maris tempestate appulit. Nam in capite ejus *Spermatis Ceti* tantum repertum fuisse audivimus, quantum dimidium dolii, in quo asservari solent *Haleces* saliti, replet.
4. *Pastor*, (à *secando*, quod perniciosissime nater, undasque quasi secat,) the Smith Whale, quam *Carol. Clus.* (*Exotic. lib. 6. cap. 19.*) optime descripsisse videtur. Reperitur plerumque in Oceano Occiduo, & *Canem Carthariam Aristotelis* formæ æmulatur.
5. *Orca*, (à vasis olearii aut vinarii similitudine,) the Shark; nautis in mediterraneo Oceano haud infrequenter obvia. Hujusmodi belluam olim in portu *Ostionis* visam fuisse, & oppugnatam à *Gladio Principe*, retulit *Plinius*; qui eam plene describit.
6. *Monoceros*, *Unicornu Marinum*, Septentrionalibus *Narbal*, cujus dens hætenus pro vero Unicornu à Magnatibus & aliis habitus fuit, the Unicorn Whale. In freto *Davis* hæc animalia haud rara esse retulerunt nautæ, qui ea ibidem viderunt. Capitur etiam interdum circa *Greenlandiam*. Ceti hujus iconem exhibet *Ql. Wormius*, in *Musei sui* pag. 182.

II. *PRIETIS*, *Serra*, (quia rostrum ejus & longum est, & serræ in modum utrinque dentatum,) the great Saw-fish. Quæ Delphinum magnitudine superat.

III. *DELPHINUS*, Græcis δελφίς & δελφίς, & si minutus, δελφινάριος, (à δαπέξ, *Porcellus*, & similiter) plerisque Europæ nationibus *Porcus Marinus*, (quia dorso repando porcum terrestrem refert;) & nautis nostris *Harengivorus* (quia *Harengos* persequitur;) the Dolphin, aut *Champus*. Quoniam tam terrestrium, tum aquatiliū velocissimos recte dixit *Aristoteles*; ocyores volucre, ocyorestelo. Nam cum fame concitati, & fugientem in ima vada piscem insequuti, diutius spiritum continere, ut arcu emissi ad respirandum emicant. Dentibus centum & sexaginta, post

m 2 *

rostri

rostri cuspidem, os communium habet. Fistulam inter oculos gerit, per quam & aërem trahit, & aquam rejicit. Præter communem piscium modum, palpebras habet, & meatus auditorios.

IV. *PHOCÆNA*, the *Porpus*, aut *Porpes*; Delphini species, brevior tamen crassiorque corpore. Præter istas duas Delphinorum species, quæ sola magnitudine videntur inter se discrepare, est & *alia* quidem eodem nomine insignita, sed branchiis utrinque instructa amplissimis, ideoque ad Ceraceorum classem neutiquam referenda. *Dorada* mare esse asserit *Marcgravius* (in *pisc. Brasiliens. Hist. lib. 4. c. 11.*) qui scite depingit. "Piscis est compresso corpore, & latus, licet non ita crassus; capite in figuram fere quadratam definente, fronteque ita in aciemeducta, ut facilius fluctus maris natando secare posset. In sex aut septem pedum longitudinem excrescit: latitudo, ubi maxima, nimirum versus anteriora & pone caput, sesquipedalis. Os habet haud ita amplum, pro magnitudine corporis; mandibulas compressissimas, denticulos acutos. Oculos habet magnos, rotundos, pupilla chrySTALLINA; sitos autem paulo supra os, & inferiori loco; forsane in aquis imperiose ageret, qui alias Linceus. Pinnae septem, unam scilicet insignem à summitate capitis per totum dorsum extendensque ad caudæ exortum, latam in medio 7. aut 8. digitos, quæ sensim minuitur, constans membrana ad tactum coriacea, & spinis mollibus sustentata: hanc natans in æquore erectam tenet. A medietate infimi ventris ad caudæ initium item pinna protenditur, sed vix unum digitum lata. Post utramque branchiam, pinnam habet oblongum 8. vel 9. digitos: sub his in infimo ventre duas alias paulo longiores. Cauda circiter sesquipedem longa, in duo cornua ampla distenditur. Squamulis minimis vestitur totus, quæque ad tactum vix sentiuntur: ita ut glaber videatur. Color in capite, dorso, lateribus ex viridi & argenteo mixtus, uti & in pinnis; in ventre vero albicat. Per totum autem corpus maculis est variegatus cæruleis. Velocitate natandi Porcos marinos sive Phocenas superat, & eodem modo saliendo progreditur. Vescitur ut plurimum pisce longo, quem Brasiliiani *Petumbo* vocant. Carnem habet siccam, boni saporis. Cæterum isthæc descriptio *Marcgravia*, cum illa *Aurata* sive *Dorada* veræ à *Rondeletio* (lib. 5. de piscibus cap. 11.) tradita diligenter collata, minime convenit.

V. *SCOLOPENDRA CETACEA*, cujus *Ælianus* solus meminit *Histor. Animal. lib. 13. cap. 13.* Effigiem unius exprimit *Johnstonus*, de piscibus, pag. 221. Tab. 44.

VI. *PHOCA*, Græcis *φώκη*, (forte ex *βώκη*, boatu quem edit: unde *Servius* apud *Virgilium*, *Phocas*, *Boves Marinos* interpretatus est, & rectissime, siquidem & *Plinio* dicitur *Bos vel vitulus*

lus marinus) quibusdam *canis*, vel *Lupus Marinus*; Danis *the Seal*; Noſtratibus *the Seal*; aut *Sea-Calf*. Corio tegitur duro, folido, piloſo; colore nigricante & cinereo, quandoque maculoſo; capite brevi & parvo; pro corporis ratione; dentibus ſerratis & verſicoloribus. Nautæ & Piſcatores noſtri haud raro hoc amphibium capiunt, in arenolis Inſulæ *Velli* littoribus ſomno ſopitum, & deinde cicur reddunt, ut lucrum faciant ex ſpectaculo. In Cornubia Phocæ majores *Sells*, minores *Sells* vocantur.

VII. *Waxrus*; aliis *Mors*, Danis & Iſlandis *Rosmarus*; (quod in Septentrionali oceano ſaltem reperiatur, ut credit *Ol. Wormius*, in *Muſeo*;) nonnullis *Vacca Marina*, nobis *the Poys*, aut *Sea-Poys*. (quia monſtroſum animal eſt & amphibium, bobus noſtratibus, ubi adolevit, interdum majus.) Cute tegitur piloſa, nec à Vitulo Marino multum abhorrente. Dentes duos habet, è ſuperiõri maxilla propendentes, & ante recurvos, cubiti nonnunquam longitudine: quorum uſus ac pretium Ebori comparatur. Ex iis enim varia conficiunt, annulos contra ſpalmum (*Cramp Rings*;) manubria gladiatorum, framearum & cultrorum, & *Iſlandi* Icunculas, quibus in ludò *Stacchico* utuntur. Hos dentes eſſe arbitror, qui vulgo pro dentibus *Hippopotami* venduntur. Animalis hujus accuratiſſimam Iconem delineari curavit *D. Joh. de Laet*, *Deſcript. Ind. Occid. lib. 2. cap. 6.*

VIII. *MANATI* (Piſcis Cetaceus; ab Hiſpanis in *Hiſpaniola* ſic nuncupatus; quod pinnas ad caput, & veluti binas manus habeat, quibus natat,) Belgis *Vacca Marina* (cum quod capite terreſtrem Bovem referat; tum quod ejuſdem more herbis in terra paſcatur,) *the Manati*. Adeo magnus eſt, ut jugo boum opus ſit, ad unum vehendum. Animal hoc gemino in terris & aquis victu eſt, & amicum hominis; ut tali hiſtoria patuit. *Caramataxius*, *Cacicus*, id eſt *Regulus*, quidam in provincia *Nicaragua*, parvulum *Manati* quondam captum viginti ſex annos in Guainabo lacu, ædibus ſuis vicino, velut in vivario, panis fragmentis aluit. Hiſ allectus piſcis adeo cicur evaſit, ut Delphinos veterum ſcriptis celebratos manſuetudine vinceret. Nam quocunque diei tempore in-clamatus ab Reguli domeſticis, *Matto*, *Matto* (ea vox Indis *magnificum* aut *generoſum* ſonat) velut ad familiare ſignum, ex imo advolabat; paſtusque è manu, præbebat conſenſuro dorſum: adeo ut egreſſus in ripam, paſtum in ædes ventitaſet, & cum pueris colluderet. Si qui forte animi gratia lacum tranſmittere vellent, decem nonnunquam exceptos dorſo indefeſſus tranſvehebat: referente *Petrò Martyre*, *Ocean. dec. 3. lib. 8.* Hic Piſcis Lutræ prope formam referens, XXXV. pedes longus, XII. craſſus eſt: capite & cauda bovem referens; exiguis oculis; pelle dura & piloſa, coloris Veneti; pedes duos Elephantinis ſimilis habet.

n *

ejus

eius generis, ut vaccae, catulos pariunt, eosque gemino ubere alunt; ut *Hieronym. Benzon. Hist. Novi Orbis lib. 2. cap. 14.* scribit. Lapidēs seu ossa in cerebro bina gerit, parvæ pilæ palmariæ magnitudine, & orbicularia; quæ Colicæ passioni & doloribus Nephriticis valide adversantur, si primo adusta, contrita & per calicrum transmissa, in vino, drachmæ unius quantitate, assumpta fuerint.

IX. HIPPOPOTAMUS, *Equus Niloticus*, (quia Nili fluminis alumnus, & Equo cum specie situque partium, tum vastitate similis,) the Miver-Hout. Quem verum Jobi Buiumotum esse, longa rationum serie non ita pridem probavit mirabilis ille Linguarum Orientalium thesaurus, D. Samuel Bochartus, *Hierozoki part. post. lib. 5. cap. 15.* Monstruosum Piscem hunc nemo minorem facit *Aristotele*, qui tribuit illi μέγας ὁ ἥλιον ὄν, asini magnitudinem. At in *Herodoto* Hippopotami statura est ὅσον τε βῆ, ὁ μέγας, quanta maximi bovis. Neque de nihilo est, quod bovi comparatur; quem non solum pastu & cibo, sed & mole refert corporis, & forma capitis & pedum. Unde Itali *Bomarin*, id est *Bovem Martinum* appellant. Qua de re legendi sunt ex veteribus, *Herodotus* & *Diodorus*; ex recentioribus *Gesnerus*, *Bellonius*, *Aloisius Cadenastus*, *Leo Africanus*.

P I S C I U M M O L L I U M

Classis.

ENumeratis jam Sanguineis Piscibus, succedunt in ordine *EX ANGUIA AQUÁTILIA*. Quæ ut supra innuimus, dividuntur in tria genera; viz. *Mollia*, seu *Molliuscula*. (2.) *Crustata*. (3.) *Testacea*.

MOLLIA, seu μάλακτα ab *Aristotele* dicta, 4. de *Hist. Animal. cap. 1.* sunt sanguine carentia Animalia, formæ carne obducta, solidum quid intus continentia. Huc spectant

I. *POLYPUS* (qui nomine gaudet Græco; cum Latino destituitur, nisi cum *Alberto* *Multipedem* reddere placuerit; à multitudine pedum & flagellorum sic dictus:) nonnullis *Ostapodus* (quia, ut cætera ejus generis, octo habet pedes seu flagella, seu brachia, quibus quoties tempestates urgent, ad saxa aliqua adhæret, & se velut

lut anchoris jactis stabilit; quin & tanquam manibus & pedibus utitur:) Germanis *Pol-Kuttel*; nobis the *Pour Couteil*, & insulæ *Pectis* incolis *Poor-Cuttle*, aut *Pyete*. Datur & alia Polypi species, *Abrovanda* Boliræna dicta; & *Wilkinsio* nostro the *Sweet Polypus*.

II. *SEPIA*, (quod atramento, veluti putrida quadam sanie, quam Græci *Σινδώρα* vocant, abundet:) the *Black Cuttle*, aut *Cuttlefish*, aut *Cutl*. Cui hoc proprium est, præter fistulam inter caput & alvum prominentem, quod atramenticopla luxuriat, & vel ideo quam in cæteris reperitur majori, quod vitam littoralem traducat, & nihil aliud quo sibi auxilietur habeat; cum *Polypis* & brachia, & mutatio coloris inserviat: Unde fit, ut atramentum illud, sive cruorem suum atrum per aquam effundat, cum se peti animadvertit, & piscatoribus iter veluti præsepiat. Habet & *Sinor* in dorso, robustum & latum, inter spinam & os mediam præ se ferens naturam, spongiosam inter se complectens corpulentiam: quod Aurifabri nostrates, qui eo præcipue utuntur, *Cuttlebone* vocant; Pharmacopolis vero *Os Sepia* dicitur. Apud *Rondeletium* reperias & minorem speciem, quam *Sepiolam* vocat.

III. *LOLIGO* (quasi *Voligo*, à *volatu*: quia efferre se ab aquis, intervallaque haud parva transmittere volatu solet; teste *Scaligero*, in *Histor. Animal. Arist. lib. 1. cap. 44.*) Græcis *Τύθο*, ab Italis & maris Adriatici accolis *Calamar* (à thecæ scriptoriæ similitudine.) Quæ duabus quasi partibus constat. Una instar thecæ est, in quam se recipit, in extremitate plane triquetra, duabus quasi alis prædita, reliqua parte concava, in quam reliquum corporis recondit. Hanc tubam, intervallo unius pollicis, mox excipit caput oblongum; cui utrinque oculi clari & chrySTALLINI insident: rostrum vero durum & nigrum habet, simile *Psittaci*; quod cirri seu flagella ambiunt octo, utrinque quatuor. Præter atramentum *Sepiæ* quoque commune, & alium quendam sucum *purpureum* habet; quo tanquam proprio signo ab aliis *Molluscis* internoscatur. Male itaque à quibusdam cum *Sepia* confunditur. Est autem duplicis generis; *Major* scilicet & *Minor*. Hæc simpliciter *Sepia* dicitur, illa vero à colore subrubro, *Red-Sepia*, & in Cornubia *Cuttlefish*.

IV. *LEPUS Marinus*, (à colore Leporis terrestris, quem *ῥαπιδιον* vocant:) Monspelienfibus *Ebrinus*, (quod vivus colore ex rubro nigricante sit, quali plerumque ebrui conspiciuntur.) *De Sen. Pare.* Cujus tria genera descripsit *Rondeletius*. *Ællanus* addit & *Indicum*, quod ex omni parte ad terreni Leporis similitudinem accedit, præter pilos, qui spinosi & erecti. Omnia veneno suo exitialia esse, certissimum est. Iconem videas apud *Jobstsonum*, de *Pisc. Tab. Mollibus dicata*.

C R U S T A T O R U M

Classis.

CRUSTATA seu Crustacea, *Philosopho Μαλακόεσσα*, id est *crustis tenuibus* contestata, quæ nempe tegumentum non æque durum ac densum habent ac *ὀστέακοδερμα* (quæ ὀστέα, hoc est, testa dura & filicea integuntur) neque molle, veluti squamosi pisces, vel ij qui Molles nominantur; sed medii inter utrumque temperamentum, *durius* Mollihus, & *tenuius* Ostracodermis. Hoc Aquatiliū genus quidem varium admodum est & multiplex, multas sub se comprehendens species, non solum figura, asperitate, lævitate, magnitudine, &c. sed locorum etiam, vitæque genere diversas: omnibus tamen illud commune est, quod partem solidam *foris*, mollem vero & carnosam *intus* habeant, contra naturæ morem in plerisque aliis animalibus observatum, in quibus ossa vel cartilagines, firmamenti loco, carnibus substeruntur.

Commune etiam illud est, quod omnes Pisces Crustacei, licet ex numero *τῶν ἀναιµων*, sive sanguinis expertum sint, *Branchiis* tamen donentur multiplicibus ac amplis, Pulmonum munere defungentibus: ad quas cum *vitalis* humor, repetitis perpetuo circuitibus afferri commode possit, idcirco eæ non ut in lumbricis, aliisque terrestribus Insectis, per universum corpus disperguntur, sed *extra* corpus in utroque latere, sub tunicæ loricatæ margine constituntur. Et quoniam ad harum Branchiarum motus reciprocos seu expansiones & contractiones alternatim perficiendas, in Crustaceis costæ laterales, musculi pectoris, alique aut plane defunt, aut ob partium vicinarum rigiditatem sunt inepti: ideo mechanica admiranda effectum est, ut dum Branchiæ, maximam partem solutæ, facileque mobiles relinquuntur, singulis earum fasciculis, circa bases pedunculi ossei cum musculis intra ipsorum cavitates inclusis, veluti totidem costæ penfiles, ultra corporis truncum longe productæ, affigantur: quæ tanquam tot distincta *pendula*, musculorum quos inclundunt ope, fere perpetuo vibrata, continuas branchiarum quoque *Oscillationes*, hoc est, ad aerem inspirandum *diastolas*, & ad eundem mox expirandum *systolas* præstant. Id quod in locusta marina, & in Astaco maxime conspicuum est; non ita pridem demonstrante solertissimo Naturæ indagatore, *Willisio*, de anima Brutor. cap. 3. Nam in piscibus non Cetaceis Branchiæ, quæ sunt veluti pulmones vicarii, seu potius inversi, extra thoracis cavitatem ita collocantur, ut vasorum ductus omnes, & oscula

bſculā exterius conſtituta, dum branchiæ dilatantur, ex aere undis permixto nitroſum quoddam excipiant, atque in ſanguinem ipſum deferant; idemque mox effoetum, per branchiarum contractionem foras amandent: ut hoc pacto ſanguinis vita ſive flammula perpetim renovetur. Ac idem etiam in Cruſtaceis pariter atque Teſtaceis, à branchiis ipſorum penſilibus fieri, vel ex eo patet, quod in ſingulis Aſtaci branchiis, tres reperiantur ſinus ſeu canales, quorum bini humorem vitalem circumferunt, & tertius aquas affluentes excipit egeritque: quem autem in ſinem, niſi ut interim ſpiritus Nitro-aereus per aquam diffuſus, & branchiarum miniſterio inſpiratus, humori vitali inſpiretur, ut, ad continuandam vitæ flammam, pabulum neceſſarium? De harum Branchiarum in Cruſtaceis penſilium fabrica & uſu, plura qui ſcire cupit, conſulat *Williſium* modo laudatum. Interim nobis cum Clariff. illo naturæ interprete, ad huiusmodi Cruſtaceorum reſpirationem in tranſitu reſpicientibus, inde inferre liceat; ſuas his etiam exanguibus, ideoque frigidioribus aquarum incolis *Animulas* ineſſe, aut plane *igneas*, aut ſaltem ad ignis, in ſecreto leniter miſcantis, naturam quam proximè accedentes: utpote quæ ex Atomorum ſubtilium, ſuæque naturæ maxime mobilium moleculis ſive ſyſtematibus conſtat, & accenſione, hoc eſt, motu rapidiſſimo agitatur, duplex alimentum ad ſuam ſubſiſtentiam neceſſario requirunt; alterum ſcilicet *Sulphureum*, è ſucco vitali jugiter ſuppeditatum; alterum verò *Nitroſum*, ex aquis per reſpirationem proleſtum. Horum enim utrovis forte deficiente, *Animulæ* iſtæ etiam ſimul deficiunt, & in auram diſperguntur.

Præterea, quandoquidem omnibus plane conſtat, Naturæ *ὑποβοιά* in eo præſertim elucere, quod, ut non omnia Animantium genera in unam mundi huius adſpectabilis regionem congeſſit; ſed alia in terris, in aere alia, aliaque rurſum in aquis degere voluit; prout uniſcujuſque peculiari temperamento ac genio convenientiſſimum eſſet; ita & ſingulorum *Animas* effecerit loco, cui assignantur, certo quodam modo analogas ſive convenientes: cumque experientia compertum habemus, ex ignibus *Græcis*, vulgo ſic dictis; dari nonnullos, qui ex *Sulphure Nitroque* debita proportione commiſtis conſecti, atque accenſi, mediis etiam in undis exardeſcant: his inquam conceſſis, quid obſtat, quin arbitrari liceat, *Piſcium* quoque *Animas* ex conſimili *Sulphurearum* particularum, cum *Nitroſis* certa quadam proportione commiſtarum, ſyſtemate conſtari? maxime quum evidentiffime appareat, Piſcium omnia genera & cito putredinem concipere, & putreſcentia, cum graviffimum naribus humanis emittere odorem, tum in tenebris nonnunquam inſigniter lucere: quæ omnia non aliunde videntur provenire, quam à *Sulphure*, quod eorum ſucco vitali copioſe ineſt, & per putre-

putredinem resolutum, effluviis suis nares oculosque ferit. Et quantum ad *Nitrum* attinet; illud etiam ad constituendas Piscium Animas concurrere, vel hinc suspicari licet, quod omnes aut Branchiis, aut aliis Pulmonum vicariis organis præditi sunt, ut eorum spiritus vitalis (in cujus accensione singulis momentis renovata, ipsius vitæ, hoc est, Animæ sensitivæ actus primarii tenor consistit) perpetuo spiritus Nitro-aerei affluxu recreetur. Unde contingit, ut Pisces in aquis vel gelu constrictis, vel intensiore solis ardore incalescentibus, vel ad putredinem quomodocunque dispositis inelusi, cito intereant: idque non alia forsitan de causa, nisi quod spiritus Nitro-aerii aut satis copiosi, aut puri, & ad vitæ sustentandæ usum commodi, affluxu depriventur.

Cæterum rationi videtur consentaneum, Piscium Exanguium, maxime qui crusta vel testa conteguntur, Animulas ex sulphuris crassi ac terrei multo, cum modico Nitri commisto accensoque constare. Ita enim compositæ, mediis in undis, pacatiori, & per consequens diuturniori flammula micare possunt; quemadmodum ignes quidam Græci, ex copioso sulphure, Nitrique exiguo comtemperati, subter aquas diutius exardent vivuntque, Plura hujus rei argumenta in unum congeffit Doctiss. noster *Wilfisius*, de *Anim. Brutor. cap. 3.* quo curiosiorem lectorem candide remitto; ne latius expatiari videar, quam instituti mei angustię patiantur. Absoluta itaque hac digressione, ad varia Crustatorum genera breviter describenda revertor. Horum quatuor sunt summa genera, viz.

I. *L o c u s t r a* marina, (quasi *longa hasta*, si fides *Isidoro lib. 12. cap. ult.* quod pedibus sit longis: seu verisimilius, uti *Perottus* conjicit, quod tactu multa urat, morfu vero omnia erodat:.) Græcis nunc *καράβοι* (πὰρ τὸ τῇ κατὰ βαίνειν quod capite incedat multum prominente;) nunc *γραψαῖς* (ab aculeis, πρὸς τὸ γράφειν καὶ χαράττειν, ad scribendum & sculpendum idoneis;) Germanis *Sperrstolze*, Liguribus *Lanchrina*, Monipeliensibus *Langouste*, indeque Ichthyopolis nostris *Lang-Dittet* dicta. Astaco marino per omnia similis est, nisi quod hirto asperoque corpore sit, & cornua habeat majora, initio aspera & aculeata, deinde rotunditate præpilata, & quæ in tenuissimum cirrum desinunt. Pedes habet utrinque quinos, annumeratis extremis *Chelis*, quas *Gaza* modo forcipes denticulatos, modo brachia forcipata interpretatur; nostrates vero *Claves*, sed incongrue vocant. Nam *χηλή* proprie est ὁ ὄνυχ, *ungula*, & dicitur ἐπὶ τῶν διανύχων ζῴων, de animalibus quibus bifida est *ungula*, quasi *χηλή*, ἀπὸ τῆς διχοτομίας, ὡς ὄπλῃ, ἐπὶ τῶν μονοτύχων. Inde igitur accepta significatione, *Chelis* dixerunt in *Crustatæ*, non unico aculeo constan-

tes,

tes, sed duplici & articulado veluti in forcipe. Differt *mas* à femina, quod feminae primus pes duplex, mari simplex: & quod in caudæ supina parte femina appendices pinnis similes, duplices habeat, ad contegenda & conservanda ova; *mas* vero simplices & parvas. *Coecant* juxta terram; ova gerunt tribus mensibus, Maio, Junio, Julio: deinde ova appendicibus illis in supina Caudæ parte dependentibus (quomodo, adhuc inquirendum restat, dorsum enim omnino rigidum est & incurvabile) affigunt; quæ progressu temporis animata, vermium more augentur. Locustis omnibus *vita* diuturnior est; *cræstæque* quotannis exuuntur, quemadmodum angues senectute: quod consulto à Natura factum. Crusta enim densior facta motum impedit, eique velut graviori oneri succumbentes Locustæ, longe segniores ad motum redduntur. Ea igitur succi alibilis parte quæ in crustam veterem impendebatur; in aliam gignendam subter affluente, formaque à superiore accepta; illa nutrimento sensim destituta, siccior efficitur, facillimeque duris affricando colliditur. *Testacei* autem idem non evenit; quia locum non mutant, sed stabili in sede vivunt. Locustæ denique *carnivora* sunt, Murænas interimunt & vorant: contra à Polypis vincuntur.

II. *Astacus* marinus (quasi *ἀστᾶτος* non destillans, sed abunde fluens; quod tubercula plurima, tum alba, tum purpurea, guttarum sive lacrymarum specie, forcipibus inspersa habeat.) quibusdam *Gammarus* marinus, sed *Rondeletii* judicio improprie, nam *Gammarus Squillarum* species erat veteribus Romanis. A Gallis & Normannis *Homar*; à Romanis hodiernis *Gammora*, vel *Cambro di mare*; à Venetis *Astasc*; à Genuensibus *Lumbardo*, ab Occitanis, *Langreut* vel *Esferveico de mer*; à Danis *Hummer*; ab Anglis *lobster* (ab Anglo-Saxon. *Eoppeþne*; *Astacus*) nominatur. *Crustaceum* est animal, *cubre*, dum vivit, *nigricante* & ad *cæruleum* tendente; dum coquitur, in *rubicundissimum* transit, sed paulatim, ubi exsiccatur, ad *albedinem* vergit, *pedibus* præditum octonis, quos excipiunt *Chela* seu forcipes majores, utrinque unus dentatus. *Pedum* autem quidam bifurcantur in extremitatibus, quatuor nempe superiores caput versus, reliqui in acutum desinunt. *Cornea* seu flagella ante oculos duo tentia; longa, sectionibus multis distincta; quibus viam prætentat, super quæ alia minora; oculos parvos; prominentes, duriusculos defendentia. E media fronte existit aliud parvum, utrinque serratum, tam ad propulsandas, quam ad inferendas injurias idoneum. *Cauda*, ut in *Locusta*, ex senis tabellis contexta, in quinque pinnas definit, sed duriores. *Dentes* duos habet ad oris latera sitos; carunculam pro lingua, quam sequitur gula brevissima. Hanc *ventriculus* membraneus excipit, cujus ostio tres infixi sunt denticuli, duo ad ver-

si,

fi, reliquus infra. Piscis hic Crustaceus (ut & alii affines) uti *retrouatilis* est, ita & viscera fere omnia, aliorum respectu animalium, aut *inversa* habet, aut *præpostera*. Nam ejus ossa carne non conteguntur, sed contra ossibus carnes. Pedum nempe, brachiorum, capitis, dorsi, caudæ, aliarumque partium Musculi fere omnes, (exceptis tantum Temporalibus) integumentis undique crustaceis includuntur: forte ut Animal inter Scopulos & aspera saxa degens, armatura sua protegatur. Porro ne munimentum illud crustaceum, partes subjectas duritie aut compressione lædat; concavum ejus ubique *mucro* crasso, purpureo, tanquam panno subditio, obducitur. Cætera in admirandi hujus Piscis extispicio notanda, petas velim ex *Cl. Willisi lib. de Brut. anima cap. 3.*

Ad hujus generis differentias pertinent

1. *Astacus major*, à quo non multum discrepat
 2. *Astacus fluviatilis*, *Gammarus*, Athenæo καμάρου, the Crevass, à Gallico *Escrevice*, ideoque scribere nos quoque debemus, *Crevice*. Media ætate *crusta* exuuntur, quemadmodum Angues senectute: quod consulto à natura factum est. Crusta enim densior ætate reddita motum impedit. Quo tempore crustam deponunt, in capite duos gerunt *lappillos*, albos, rotundosque, lenticulari figura, singulari Naturæ providentia, ad crustæ substitutionem; qui dein, exuto integumento veteri, rursus paulatim absumuntur, & in crustam abeunt. Exempti, riteque servati ad usus Medicos, *Oculi Cancrorum* appellantur.
 3. *Astacus medius*, seu mediæ magnitudinis, *Aldrovandi*, *Literatus Wormio* dictus: quod in crustis caudam tegentibus literarum quarundam grandium & quasi Hieroglyphicarum notas ostendet. De quo *Ol. Wormius, in Museo*.
- III. **SQUILLA**, Græce *καρίδης*, *Πατών*. Quarum quatuor diversa genera sunt, viz. (1,) *Squilla lata*, sive *Ursa* (porrecta enim Ursi corium quodammodo representat:) the *Ursa* aut *Bear-Paton*. (2,) *Gibba* (propter gibbum, quem habere videtur, dum se incurvat:) the *Bunch-backt Paton*. (3,) *Mantis* (à similitudine bestiolæ cujusdam è Locustarum genere:) the *Sea-Crasher*. (4,) *Parva*, seu *fluviatilis*, quam nos a *Schump* vocamus, forsan à Teut. *Schump*, ruga, à *rugis* in dorso.
- IV. **CANCER**, καρκίνος (quasi *καρκινος*, quod *καρκιν* id est pupillas & oculos mobiles habeat, the *Crab*. Horum alii extra Conchas alienas in aquis salis degunt: alii in alienis Conchis, ideoque *Wong-petis* nominati. Pri-

Prioris ordinis sunt

1. *Cancer marinus vulgaris*, the Common Sea-Crab.
2. *Maia* (à magnitudine; nam *μαία*, quæ amitam & nutricem significat, aliquando etiam pro natu grandiore sumitur) *Hippocarcinus*, the great Crab, aut *Porter Crab*; Cornubiensibus vero the Spanish Crab.
3. *Pagurus* (ὅσα τὸ ὑπεῖν καὶ φυλάττειν ἐν ναυῶν, id est, ἀπομυῖθαι τόποις, quod in locis præruptis versetur) Italici *Granciporro*; Ithyopolis nostris, the *Purger*. Crusta ejus in gyrum novem crenis, imbricis modo, incisa est. Adolefcit quandoque in calvæ humanæ magnitudinem, sed non æque orbicularis evadit: Canceris reliquis longe major. Apud nos enim visus, qui decem libras penderet. In Cornubia *White Crab* nominatur.
4. *Eques*, ὄρουμν, *Cursor* (à velocitate cursus) the Swift Crab. Hi Amphibii sunt, & in maximis ardoribus meridiano tempore è mari egrediuntur, diemque sub sole transigunt; circa vespæram mare repetunt. Tanta velocitate fecerunt *Belonius*, ut ne unum quidem unquam cursu consequi potuerit. Hujus generis esse videtur *Cancer latipes*, quem *Dr. Wormius* describit, *Musei sui pag. 250*.
5. *Flavus undulatus*, (à colore & lineis; quæ in prona parte sunt sinuosa undarum modo, non aliter quam in CAMELOTO vulgo nuncupato, nomen sortitur est.) the *Channel Crab*. Capitur circa Antipolim, & Lerinum locum.
6. *Marmoratus*, sive *Varius* (quod testa tegitur leviter perpolita, & maculis viridibus, ceruleis, albis, nigris, cinereis, Iaspidis instar & Marmoris, conspersa.) the *Spotted Crab*. In saxi *Agathes* littoris degunt.
7. *Cancer cordis figura*, qui in majorum Astellorum ventriculis sæpe reperitur.
8. *Canceri fluviales*, qui eo à Marinis differunt, quod testa sint durior & crassior; tibus asperioribus, & ex musso nigrescant. Præterea multas crenas in gyrum circa chela habent.
9. *Cancer Heracleoticus* (ab urbibus *Heracleis*, quarum una *Ponto*, altera *Propontidi* adjacet, ubi frequens est, à *Bellonio* sic dictus) nonnullis *Gallus Marinus* (quod brachia ejus in cristæ galli modum tornata videantur) qui dorso tuberculis exasperatur, & coloris est miniaci. *Sea Cock*.

10. *Cancer Pilosus* (pilorum nempe densitate Urfi corium refert) qui in mari *Tyrrheno* & *Adriatico* reperitur, sed in *Oceano* maximus.

Sunt & aliæ Cancrorum horum *Differentiæ*, à varia *Chelarum longitudine* desumptæ; de quibus videatur *Johnstonus de Piscibus*, pag. 29. part. de *Exanguib. Aquatic.* Interim illud hoc in loco notatu dignissimum occurrit, quod curiosissimus noster *Glissonius* in immortalis suo de *Ventriculo & Intestinis*, cap. 23. tractata, observavit; nempe in hujusmodi exsanguibus, succum vitalem qui in loco sanguinis est, spiritibus ejus sopitis, subito coagulari. Hocque evidentissimum esse in *Cancris* & *Astacis*. Si enim extremitatem cujusvis branchiarum eorum transversim præcideris, copiosus mox effluit vitalis succus, primo tenuis & pellucidus, sed simul ac refrigeratur, instar gelatinæ concrevit, ita ut in frustra scindi queat. Constat itaque, spiritum vitalem; ejusque calorem esse, qui sanguinem fluidum sibi que ipsi unitum conservat. Alioquin enim habet in se partes satis pronas ad secessum ab invicem moliendum: nec mirandum, si, exhalatis spiritibus, eæ mox ab invicem actu secedant.

Posterioris censentur

I. *CANCELLUS*, quibusdam *Bernhardus Eremita* dictus; *πιννίφουλαξ* (quasi ὁ τῆς πιννὸς φύλαξ, quia pinnis & conchis insidet) *Shellie Soldier-Crab*. Nam à *Conchis* nudi nascuntur, sed *Purpuras* & *Turbines* suis pellunt conchis, iisque vescuntur, ut eorum occupent domicilia. Cum in amplitudinem majorem excreverunt, quam ut primis testis capi queant, in testam ampliorem, tanquam domum novam migrant.

II. *CANCELLUS* in *Buccino* degens, the bigger *Soldier-Crab* dwelling in the *Sea-Trumpet*, the *Hermit-fish*.

III. *SCYLLARUS*, five *Cancellus*, in *Nerite Concha* degens.

IV. *CANCER PARVUS*, qui pinnis innascitur; estque longo corpore, *Locustis*, non *Cancris* simili. Hujus generis sunt, qui in *Ostreis* interdum reperiuntur, & crusta superna faciem humanam repræsentant.

TESTA-

TESTACEORUM Turbinatorum Classis.

INter Exfanguia *tertium* locum sibi vendicant TESTACEA, Aristoteli ὀστράκωδερμα, quæ testis duris & fragilibus muniuntur. Distinguntur in (1,) *Turbinata*. (2.) *Univalvia*, *μολύβδωδερμα*, & (3,) *Bivalvia*, *διδύμωδερμα*.

TURBINATA, Græce Στρομβώδη & ἑλικωσίδῃ, sunt illa, quæ in volutas & anfractus seu spiras, quales in prælis & torcularibus visuntur, testas suas quoquo modo reflectunt. Horum autem *duo Genera* constituuntur. Vel enim *Helicem* in testa habent: vel sunt *σφαιροσίδῃ*, *Spharica*, seu in globum circumacta.

Prioris Generis sunt

I. NAUTILUS, Græcis veteribus ναυτικός, modernis ναυτίλος, (quod navis effigiem referat) the Nautilus, aut Sailer. Quippe, in summa æquorum pervenit, ita se paulatim subrigens ut emissa omni per fistulam aqua, velut exoneratus sentina, facile naviget. Postea prima duo brachia attollens, membranam inter illa miræ tenuitatis extendit. Qua velificante in aura, cæteris subremigans brachiis, media caudâ, ut gubernaculo, se regit. Ita vadit alto, Liburnicarum ludens imagine, & si quid pavoris interveniat, hausta se aqua submergens. *Duo* ipsius genera sunt; *Unum*, cujus testa Pectunculo similis est, cava, neque ei connexa, ideoque is nonnunquam è concha sua delapsus, nudus capitur in arena: *Alteram*, quod in testa tanquam Limax est, nec ex ea unquam egreditur, sed interdum brachia exerit. Est & *tertia* species, *Cochlea Margaritis Æmula*, *Wormio* dicta (quod sit Unionum colore & splendore) ex *India* & sinu *Persico* nobis allata. Quæ glabra omnino & lævis est, parte interna infinitis prædita interstitiis. Superficies externa mira colorum varietate splendens, subinde circumagentibus se in purpuram candoremque maculis. Qui exterior Cortex ubi detractus fuerit, plane substantia Margaritas refert. Ex ea in frustra dissecta, imagunculæ, globuli ad numerandas preces, monilia & alia ejus generis nonnulla conficiuntur: Vasa quoque potatoria eleganti artificio.

II. PURPURA, Græcis πορφύρα, *Politiano Concha Herculeæ* (quod tincturæ auctor *Hercules* credatur,) the Purple-shell. Cujus Concha

Concha, parte turbinata pluribus mucronibus seu extuberantiis horrida est, superficie exteriori modo candicans, modo flavescens, interiore modo violacei, modo rubicundi coloris; in anfractus in mucronem desinentes contorta. Animal cornuâ duo Limacum modo attollit, atque eodem ritu serpit; iisdemque cornibus viam prætentat. Aquam marinam haustam asservat, qua pluribus diebus fovetur & sustentatur. Hepar habet viscidum tenaci lentore præditum, quod *Arist. Papaver* vocat, alii *Cor*; ad cuius latus existit *mucus Purpureus*, in recentibus Purpuris illico extorquendus, cum totus in demortuis pereat. Hoc sacco olim tingebantur lanæ. *Differunt Purpuræ* magnitudine & aliis circumstantiis. Præcipuæ autem species sunt

1. *Magnæ*, quæ ad *Sigeum* & *Lothum* *Idæ* promontoria gignuntur.
2. *Parvæ*, quas *Euripus* fert & *Caria*.
3. *Pelagiæ*, quæ magnæ & scabræ sunt, quarumque *Flos* magna ex parte niger, sed nonnullis pusillum rubidus.
4. *Littorales*, quæ parvæ & flore rubro sunt.
5. *Echinatæ*, quæ vel pluribus spinis maxime in postica parte horrent, vel rarioribus, minoribus & brevioribus.
6. *Rubræ*, ut in *Austrinis* partibus.
7. *Nigræ*, in *Aquiloniis*.
8. *Livide*, in *Occidentalibus* & *Orientalibus*.
9. *Marmoræ*, quæ longis undique tuberculis, at minime acutis, sed obtusis plenz.
10. *Pentadactyle*, qualem *Gesnerus* descripsit, ex *Adriatico* mari acceptam.

III. *Buccinum* (à similitudine buccini, quo sonus editur, rotunditate oris in margine incisa, ut *Plinio* visum.) Græcis *βύκιον*, & *σπόμβος*, & *κέρυξ* (forte à cera, quam mucro similem mutuo attritu salivant; quod Græcis est *κρίπαις*) the *Trumpet*. Variat magnitudine, *Buccina* enim

1. *Major* in tantam quandoque excrevit magnitudinem, ut ad *Cartejam*, teste *Bellonio*, decem capiat Cotylos.
2. *Minor* ut plurimum ovi magnitudinem non superat. Strias quandoque quinas aut plures in tergore habet, plerumque in gyrum tuberculis obtusis & brevibus obsepta, frequentioribus quam in *Purpura*.

IV. *Murex* (ab asperitate murorum quibus includitur; longos enim firmosque aculeos habet, per intervalla eminentes) Qui est (1,) *Marmo-*

(1.) *Marmoreus*, à candore & duritie sic dictus, cujus testa gravis est, densa, solida, aculeis multis horrens, figura inter Buccinam & Conchylium media. (2.) *Triangularis*, altera parte planus, altera fere rotundus, sed ita ut utrinque sint duo latera. Aculeos habet breves & firmos (3.) *Lacteus*, à lacteo colore nomen sortitus. (4.) *Orthocentrus*, qui totus forinsecus & intrinsecus rubet, turbine candicat. (5.) *Coracoides*, *Rondeletio* ab infirmis, & rostris Corvorum similibus, aculeis dictus. (6.) *Aporrhaides*, quos quidam inter *Lepades*, quod ut istæ faxis adhæreant, ponunt, sed male: faciunt enim & *Neritæ* idem, quæ tamen toto genere ab iisdem differunt.

V. CONCHYLIIUM, cujus operculum est *Blatta Byzantia* Serapionis. Est autem ea parte latius, qua in turbinem deticit, sine aculeis tuberculifve ullis.

Posterioris sunt

I. TURBO, qui ex amplo & lato paulatim in mucronem desinit, multis voluminibus constans pro corporis proportionem, variorum colorum, foramen rotundum habens, & rimam per quam excrementa excernuntur. Est (1.) *Magnum*, qui multis volutis constat, margine spisso & aspero, testa alba, lineis tuberculisque aspera. (2.) *Auritus*. (3.) *Tuberosus*. (4.) *Angulosus*, quod testæ volumina ita à se discreta sint, ut in medio angulos efficiant, sic dictus. (5.) *Muricatus*, quia testa est intus purpurea, foris alba & quasi calce illita, sic nominatus. (6.) *Pentadactylos*, quia quinque appendices longas & acutas, si extremum Turbinis annumeres, habet. (7.) *Qui spongiæ delectantur*. Quorum omnium *Icones* videantur apud *Aldrovandum*. Adde Turbines *notis Musicalibus insignitos*, ab Ol. Wormio, *Mus. pag. 259.* descriptos.

II. TROCUS (ita dictus, quod similis sit instrumento ligneo, quod pueri scutica in orbem agitant: unde merito in Turbinorum classem refertur) qui distinguitur in (1.) *Magnum*. (2.) *Pyramidalem*. (3.) *Niloticum*. (4.) *Indicum*. (5.) *Album*. (6.) *Maculosum*. Omnes vero leves sunt & varii.

III. NERITIS (à *Nereo*, Deo Marino, quod is forte tali concha, tanquam elegantiore bucina, usus esse fingatur) the *Peregrina* *Trumpet*. Cujus concha rotunda est, in spiram desinens exigua, lineis frequentibus per universum corpus perreptantibus; quarum vestigia etiam in ore apparent, quod altera parte striatum, altera exiguis punctis horridum conspicitur.

IV. COCHLEÆ, *Sea Snails*, *Whelks*, aut *Porwinckles*, & *Perwinckles*. Quarum tanta ubique varietas est, ut singulas explicare

care & exprimere opærosum foret. Præcipue vero sunt (1,) *Calata*. (2,) *Echinophora*. (3,) *Cylindroides*. (4,) *Depressæ*. (5,) *Rugosæ*. (6,) *Umbilicatæ*. (7,) *Sarmaticæ*. (8,) *Oleariæ*, quod iis oleum decapularent veteres Romani, sic dictæ. Quas omnes accurate descriptas invenies ab Ol. Wormio in Museo sui pag. 260, & 261.

V. ECHINUS (vel ἄντιρρᾶσιν, ἀνὰ τὴν μὴ δύνασθαι ἔχειν δαῖτα τὰς ἀνάνδας, quod manu retineri non possit, propter aculeos; vel, ut Vossio satius videtur, ἐν τῇ ἔχειν ἑαυτὸν, ἀφανῶν τῶν σαρκῶν ὅσων, quod ita se cohibeat, ut nullæ carnes appareant.) aliis *Erinaceus Marinus*, the Sea-Urchin, aut Sea-Hedge-hogg. Quibusdam *Aurantium Marinum*, quod spinis ablatis pomum Aurantii quodammodo referat. Hujus tota testa aculeis forinsecus, intrinsecus foraminibus parvis plena est; per quæ movendi facultas aculeis communicatur. Hujus species præcipuæ sunt

1. *Echinus Spatagus & Brissus*, nostratibus, ob pudendi muliebris similitudinem, inhonesto nomine, a Cæsaribus; & maritimis *Cambrobritannia* partibus, *Spereopatus* vero dictus. Qui, ut, à Rondeletio describitur, vix à cordis figura recedit, aculeis parvis & raris oblitus.
2. *Echinometra*, quam Rondeletius tantæ magnitudinis exhibet, ut ambabus manibus quaquaversum extensis vix capi possit.
3. *Echinus minimus* pelagijs, Italis *Un Judeo* vocatus (quod perpetuo nigrescat & sordescat) spinis grandibus, longis & præduris. Testam juglande majorem non promittit: estque reliquis omnibus vividior. Nam si supinum ponas, mox suas spinas deprimit, & se in pronam partem convertit. Hic spinis spoliatus, & exsiccatus, vernacule dicitur the Sea-urton. Omnes in Cornubia sicut audiunt. In Echinit nihil est quod cibum præbeat, præterquam ova, quæ in iis reperiuntur quinque-partita, subraffa, ad stellæ imaginem formata; quæ interdum eduntur, sapore non injucundo, licet ad amaritiam accedant. Testæ crematæ sordida ulcera purgant, carnem luxuriantem reprimunt, strumas discutiunt. Ad expellendas secundas sumit Hippocrates tres Echinos marinos tenuiter tritos, & in vino odorato exhibet. Ol. Wormius in Museo, pag. 261.

UNIVALVIUM

Classis.

E Conchiliis UNIVALVIBUS sunt

I. LEPADES (quasi *Squame*, quia petris, aliisque corporibus adhærent, instar squamarum) Patellæ, *Lymptus*, *Lymptes*, *Aristophan*, in Pluto. τὸ γραιδιον, ὡς τὰ λεπὰς, τὰ παρακίω πρὸς γῆν; anicula, tanquam concha, adolescenti adhæret.

II. CONCHA Veneris (ob communem cum *Venere* originem è mari: vel à pulcritudine; vel quod prædendum muliebri figura exprimat) aliis *Concha Porcellanica* & *Levigatoria* (quia ad chartas & alia læviganda iis utuntur Itali) Cæus varia sunt genera, colore & magnitudine differentia.

III. CONCHA PERSICA, quæ à loco nomen sumit, estque majore sui parte rubicunda, cætera candida. Margaritas proferre proditur: ac proinde *Spottet of Pearl* dicta.

IV. PENICILLI, *Tubuli Testacei*, in quibus vermes latent *Wormshells*. Sunt & qui molli quadam & laxa substantia saxis alligantur, ita ut aquarum undis cedat & agitetur. Reperiuntur nonnunquam in *Ostreæ* vulgaris & *Gaderopoda* testis.

V. BALANI, Latinis *Glandes* (ob similitudinem glandium arborearum; nam ut glandis pars altera lævis est, in acutum definens, quædam aspera: sic hæc, quæ saxis adhæret, partim lævis est, partim aspera.) *Center-shells*.

VI. CONCHÆ ANATIFERÆ, vulgo *Barnacles*, aut *Barnacles*; in Scotiæ littoribus frequentes, & navibus ex India Orientali reducibus sæpe adhærentes. De generatione Avium ex his, lege *Of Worm. in Musæi sui pag. 257*.

VII. DENTALIA, *Tubuli* quidam candidi, teretes, striati in acutum definentes, una aut altera linea transversa inæquali cincti. *Tellinæ* adnasci solent quandoque ut *Balani* aliis crustaceis.

VIII. ENTALIA, quibusdam *Antalia*, conchula nimirum parvula, ejusdem substantiæ cum *Veneris*, aut potius *Cylindricis*, niveæ, læves, ritulam habentes. Ingrediuntur compositionem *Unguenti Citrini*; quod vi abstergendi sine acrimonia & caliditate polleant præclara. Hisce affines sunt *Conchala Striata*, cum *Veneris*, quoad figuram, affinitatem quandam habentes; ex quibus monilia conficere solent.

IX. AURIS Marina (quia aurem exacte refert) ab *Aristotele*

λεπὰς

λεπὰς ἀγρία dicta, Bellonii *Patella major*. Cum Lepade confunditur ab *Hippocrate*; λεπὰς ἀγρία, ἢ καλεῖται θαλάττιον ὄυς. *Patella fera*, quam vocant aurem marinam.

B I V A L V I U M

Classis.

BIVALVIA, Græcis διζυγά, Conchæ sunt duabus præditæ testis, iisque vel *asperis*, vel *lævibus*.

Inter Conchas **ASPERAS** sunt

I. **MARGARITIFERA**, Mater *Perlarum*, & *Indica* (quod apud *Indos* reperiatur potissimum) the *Pearl-Oyster*, aut *Spotter of Pearl*. Hujus Conchæ licet multa sint genera, eam tamen hic intelligimus, quæ grandis est, modice cava, spissa, figura *Pectinibus* æmula, una saltem parte aurem habens & parva foramina, quæ non penetrant; interius Margaritæ aut Unionis instar splendens. Hæc interdum tam grandis in India invenitur, ut ferant in mari Borneo inventam pondo septem & quadraginta librarum. Testa ad varia Utenfilia accommodatur; nam capsas, pocula, cochlearia, mensas, scipiones hisce exornant; imo cochlearia integra, manubria, icunculas inde conficiunt: quorum exempla haud pauca in **REGIÆ SOCIETATIS** Musæo asservantur.

II. **IMBRICATA**, seu *imbricatim undulata* (sic dicta, quod testis ad undarum sese attollentium similitudinem distincta est) *Tridacnæ* (quod tantam habeat carnem, ut non nisi tribus vicibus deglutiri possit) quæ haud raro longitudinem attingit pedalem.

III. **STRIATA**, cui striæ testam percurrentes nomen dedere. Hujus varia genera fideliter descripsit *Ol. Wormius*, *Musæi sui* pag. 253.

IV. **ECHINATA** (quia forinsecus hirsuta est Echinorum modo) quæ *Pectini* similis est; testis admodum concavis, striatis, in ambitu incis. Uniones in ea reperiuntur testatur *Plinius*, *H. N. lib. 9. cap. 35.*

SQUAMOSA, quæ lineis semicircularibus, squamarum in morem, est exornata.

VI. **LONGA**, cujus duas species exhibet *Rondeletius*: *Unam* colore vario, in medio albescente, intus cum lævitate candido: *Alteram*

Alteram testa alba, aspera, lineis multis distincta, quam *Plinij* longam esse putat.

VII. PICTORUM (quod testæ ejus olim pro conficiendis coloribus raderentur.) quæ crassitudine cæteras omnes multum excedit, & florem foris habet. *Aldrovandus* unam attulit colore Cinnabaris, figura minorum Ostreorum.

VIII. CORALLINA (quod Corallium colore imitetur) quæ externa testarum parte Pectinem refert; sed lineis est aspera, tuberculis rubris inæqualis, intus lævissima, candidi Marmoris colore. Post diutinos Austri flatus, & Caniculæ exortum in littus ejici solet.

IX. RUGATA, non ab imo ad summum, sed transversim multas rugas ductas habens. Veneti *Biveronem* vocant.

X. RHOMBOIDES, *Rondeletio Musculus striatus*; quæ elegans est, oblonga, qua testæ cohæret recta ferme, altera parte sinuata: Caput vero testæ in angulum prominet, ut tota Rhombum haud ineleganter referat.

Inter LÆVES ponuntur Conchæ

I. GALADES, omnium maximæ & lævissimæ, intus vero candidissimæ, non admodum concavæ; Nostratibus *Long Differs* dictæ.

II. NIGRA, prioribus similis, nisi quod intus & foris nigricat.

III. FASCIATA (quod quinque veluti fascias latas à latere in latus ductas habeat) cujus testa est admodum lævis, dura & marmorea. Harum plures depinxit *Aldrovandus*, de *Fiscibus*, lib. 3. cap. 55.

IV. CRASSÆ testæ, quæ fasciis & rarioribus, & latioribus insigniuntur.

V. TENUIS testæ, quæ extra sunt colore foedo, lutulento, cinereo; intus argenti modo resplendent.

Huc referuntur etiam

VI. CHAMÆ (à Græco verbo *χαῖ*, seu quod hient; unde quibusdam *Hiatule* dicuntur, & *Plinius* Conchas quasdam pandere se dixit quadam oscitatione: seu quod earum conchæ admodum concavæ sint, & capaces) Gallis *Flamme* & *Flammata*; Italis *Peverazæ* (quod pipere condiantur) a sept. of *Cockles*. Quarum aliæ *Asperæ* sunt, aliæ *Læves*.

VII. OSTREA (vel ὀστρεα, vel quasi ὄστρα, quod testa veluti ossea tegantur.) Differens. Quorum differentia, à loco & colore desumta, variae sunt. Ratione Loci, celebrantur.

1. *Pelagia*, quae in alto marinaeuntur, parva & rara.
2. *Λιμνόσπεα*, ut *Aristoteles* vocat, quae in stagnis marinis degunt. Cujus sortis sunt apud nos *Colcestriensis* dicta, quae puteis & stagnis, quae mare singulis aestibus inundat, aluntur; indeque pinguiora, & salitudine gratiora evadunt.
3. *Littoralis*, quae in littoribus inveniuntur; nec non inter saxa, limi & aquae dulcis expertia. Parva sunt, dura & acris.
4. *Britannica*, quae omnibus praefertuntur.
5. *Santonica*, quae magis salta & acris judicantur,
6. *Burdegalsis*, inter quae *Medakina* (ab oppido vicino *Medge*, dicta) suavitatem praecellunt.
7. *Circea*, quae ab *Horatio Satyr.* 4. commendantur.
8. *Abydena*, quae olim à ganeonibus celebrari solita *Clemens Alexandrinus in Pedagogico* prodidit.
9. *Lucrina* (à *Lucrino Campania* lacu, in sinu *Bajano*, prope *Puteolos*, ita dicta) quae à *Plinio* celebrantur.
10. *Brundusina*, de quibus ita *Plin.* "Gaudent peregrinatione, transferrique in ignotas regiones. Atque ita Brundusina in *Averno* compacta, & suum retinere succum, & à *Lucrino* adoptari creduntur.
11. *Cumana*, quae *Strabo* praestantissima facit.

Quid? Ostrea illa, inertissimam carnem ceno saginatum, nihil existimas limosae gravitatis inferre? *Senec. Epist.* 95.

Quoad Colores; *Rufa* sunt in *Hispania*; *Fusca* in *Illyrico*; *Nigra* & carne & testa sunt *Circea*, quibus palma mensarum distributa est; in mari *Rubro* flammeis illustrantur zonis, Hisce demum subjunguntur.

Gaideropoda (quasi *pes Asini*, apud Græcos, qui *Gaideron* hominem asinum vocant) apud nos *Porci* differens.

VIII. PECTINES (à rugis seu imbricaturis illis, quibus insigniti sunt; si *Gillium* sequimur.) *Stellæ*. Græci *στῆλαι* nominant, ob manuum & pedum similitudinem. In *Hibernia* admodum frequentes sunt; ubi in arenosis & limosis littoribus sponte proveniunt, & stridore sentiuntur, quoties per summa humeris in arena stagnantis nitibundi feruntur. Differunt magnitudine, & rugarum varietate: *Pectunculus*, à *Cockle*.

IX. MASCULI, seu *Mytuli* (nam non nisi magnitudine & rotunditate

tunditate eos differre recte statuit *Rondeletius*, & *Aldrovandus* ut hi sint majores, illi minores) *Spuscles*, & ubi grandiores sunt, *Spuscles*. Ex *Norvegia* magnitudinis stupenda adferuntur *Mytuli*; sed eorum caro palato minus grata & delicata. in *Scotie* littoribus qui capiuntur, *Margaritis* scatent, sed impuris, immaturis, nulliusque pretii.

X. *TALLINA* (ita nominatur, *ἐν τὰ πύλα πύλας* quod ocyssime perficiantur, sponteque proveniant.) Venetis *Capparacole*, seu *Capporole* (à *Capparis* similitudine) quæ testis constant lævibus, candidis, nequaquam striatis, quandoque crenulis & denticulis, in longitudine diffusis, mediocriter fortibus, locus cavis, exterius ex albo & flavo purpurascens, exiguo sunt corpore, nec facile aperiuntur. Edulium præbent origratum; unde Romæ & alibi bellariorum vices subeunt, alvum tamen resolvunt.

XI. *SOLAN*, Græcis *Σολῆ* (à canalis sive rubi similitudine) quibusdam, juxta *Plinium*, *Aulus*, *Donan*, *Dastjlos*, *Omyx* (quod cum his figura conveniat) Venetis *Cappa longa*; *the sphen*, aut *Kayr*. Est ex *Concharum* longarum genere, duplici constans testa, lævi, tenui, altera tantum nigro vinculo membranaceo colligata; altera soluta, dodrantali longitudine, potlicis crassitie, arundinis modo cava, extremis duobus semper apertis. Commendantur *Calenlosis*, & *Urinæ* difficultate laborantibus.

XII. *PROLADIS* *ἀνὰ τὴν πύλας*, quod in cavernis & latibulis condantur: & recte quidem; nam ita inter saxa, imo & in saxis ipsis latent, ut iisdem undique contegantur, per foramen vero exiguum & sensui vix patens aqua nutriuntur.

XIII. *PINNA*, Græcis *Πύλη* & *πύλη*, numero singulari (quod semper sordibus obductæ sint) Neapolitanis *Pernis*; Venetis *Akura*; à *Mytulum* figura non multum recedentes. *Canari* etiam in illis hospitantur. *Rondeletius* tantam Romæ se vidisse feribit, ut ad cubiti magnitudinem accederet. Plurimum specierum *I. cones* depinxit *Aldrovandus*, de *Piscibus* lib. 3. cap. 76. Harum alie *Majores* sunt, alie *Minores*: Anglis *Don* sive *dictæ*.

Restant adhuc quamplurimi *Pisces Exotici*, *Novi Orbis* dumtaxat alumni; quos, quia perpaucos ex eis nobis hæcenus vidisse contigit, & quia neminibus *Latinis* nondum donati sunt, idcirco prorsus intactos relinquere consulumus. Ne vero *Lectoris* curiositati in hac parte omnino defuisse videamur, cum officiose remittimus ad *Job. Johnsoni* Lib. 4. de *Pisc.* ubi ingentem istorum numerum inveniet, ex *Marcegravia*, *Pisone*, *De Laet*, *Benzone*, *Petro Martyre*, aliisque rerum Naturalium Indicarum *Historiis* diligenter collectum, & in debitas Classes redactum.

ZOOPHYTUM five Plant-animantium Classis.

QUoniam *Zoophyta* (ἀ ζῶον, hoc est, *Animal*, & φυτὸν, hoc est, *Planta*; ut ad verbum *Plant-animantes* vel *Plant-animalia* dici possint) in Exanguium Aquaticorum genere à nonnullis constituuntur; utpote τὰ ἑπαμφοπριζόντα φυτὰ καὶ ζῶα, ut *Aristoteles* loquitur: ideo & nobis necesse videtur, hic eadem breviter recensere. Istiusmodi sunt

I. *URTICÆ marine* (ab urendo Latinis sic dictæ; eo quod magnum urere videantur, si ea tangantur) Græcis ἀκαλίφαι (quasi ἀπολύσαι τὴν ἀφῶν, id est sensum corrumpentes). Italis *Flamme Marin*; nobis *Sea-petles*, & in Cornubia *Blubber*. Harum Differentias varias apud Auctores invenias: sed duo præcipua genera sic describit *Rondeletius*. Primi generis pars una est veluti fungosa quædam massa, rotunda, cava, in medio perforata, purpurea veluti fasciola ambiente, ita ut pileum plane referat: altera Polyporum pedibus similis est. Oïto enim pedes habet crassiusculos, extremis quadratos, in acutum desinentes. Nullas partes interiores habet distinctas. Corpore est adeo pellucido & splendido, ut oculos perstringat. Ad eam haud raro magnitudinem excrescunt, ut pileos, quibus viatores uti solent, superent.

Alium quatuor duntaxat pedes seu frondes habet, qui foliis Acanthi comparari possunt. Corpore est quasi cartilagineo, ac Chrystalli in morem pellucido; quod in mucorem facile resolvitur. Gibbam habet, instar dimidiatæ sphaeræ, figuram, glabram, pollicis crassitudine: cujus pars interna nervis rectis à medio incipientibus, quasi striis fulvi coloris, in gyrum radiatur, quibus se diffundit & constringit: qua corporis commotione aquam concutit, & nunc in prona, nunc in supina effertur, &c. Ab his diversum genus exhibetur à *Meretto nostro*, *Pinace rerum Natural. Britannicar. pag. 194.*

II. *PULMO marinus*, (vel à pulmonum nostrorum figura: vel ab eorundem substantia laxa, molli, & foraminulis plena) qui intuentibus apparet corpus quoddam rotundum, pilæ marinæ modo, virescens, foris substantia filtro simile, intus totum fistulosum & spongiosum. In mari aqua plenum est, & grave: extra aquam in se concidit & flaccescit. In saxorum rimis delitescit, & inter algas. Nostratibus *Blubber* dicitur.

III. *HOLOTHURIUS*, (unde nomen veniat, nescimus) quod altero extremo obtusum est & planum, in quo Rosæ sculptam imaginem

ginem dicas, circa quam apparent acetabula; inde parva appendix & mollis dependet; altero tenuius. Intus partes omnes sunt indiscretæ. Aliud genus descriptum invenies apud *Aldrovandum*, *lib. de Piscib. 4. cap. 4.* Belgæ *Quallem* vocant. De exurente hujus qualitate videatur *Jacobus Bontius, de Medicin. Ind. lib. 2. cap. 4.* Ubi affirmat, Chineses potum istum ardentissimum, quem *Arac* vocant, ex *Oryza* cum *Holothuriis*, in mari fluctuantibus, conficere: indeque alvi profluvium ac dysenteriam, Batavis Javam in India orientali incolentibus adeo infestam deducit.

IV. ΤΕΤΗΥΙΑ, seu, ut *Plinius* vult, *Tetbæ*; Græcis τήδεα & τήδρα; modernis *Sphærodactyles* (forte à sphæra,) Adriatici finis accolis *Spongia* (quia, cum premuntur, Spongiarum instar, aquam è foraminulis reddunt,) aliis *Tubera* (à colore & tumore; seu quod nullis fibris, ut *Tubera* terrena, niti crediderint.) Quæ describuntur ab *Arist. Hist. Animal. lib. 4. cap. 2.*

V. *Malum Granatum Marinum.*

VI. *Fungus Marinus.*

VII. *Pyra Marinus.*

VIII. *Mentula Marina.*

IX. *Penna Marina.*

X. *Malum Insanum Marinum.*

XI. *Manus Marina.*

XII. *Cucumis Marinus.*

XIII. *Uve Marine.* Quæ omnia appellationes suas à rebus, quas repræsentant, mutuantur. ¶

f *

MANTIS-

MANTISSA ANATOMICA

A D

*Piscium Pelagiorum Cartilagineorum Planorum
Classem spectans.*

LECTORI Admonitio.

IN præcedenti Piscium Pelagiorum Cartilagineorum Classe, ubi in RANÆ PISCATRICIS mentionem & descriptionem instituti ductu incidissem, me dixisse memini; Piscem istum tanta, & in reliqua Animantium aquis degentium grege tam insolenti Naturæ solertia fabricatum esse, ut nihil in eo occurrat non admirandum. Huic igitur dicto ut clarior constaret fides; adii magnum illum Virum, summumque Artis Apollineæ, quin & puritatis Linguae Romanæ arbitrum, D. GEORGIUM ENTIUM, M.D. Equitem Auratum, &c. obnixè eum obtestans, ut quæ in dissecto Fisce memorato à se olim observata, chartisque exarata fuissent, nunc demum, pro insigni sua in Anotamiæ Comparativæ augmentum benevolentia, quam æternitate dignissimis scriptis toties testatam fecerat, mecum communicare dignaretur. Nec disparem votis Candorem experiebar in Animo Humanitati tantopere addicto. Is enim, superatâ illâ, quam cum publicæ Utilitatis inductione in pectore suo nivo diu colluctantem sensisset, Modestiam, sui que diffidentia; baud gravatim exorari se tandem passus est; apertoque

que confestim Observationum Anatomicarum Thesauro (quem avidissime exoptant omnes, quibus cum literis aliquid commercij intercesserit) inde quæ desiderio meo satisfacerent, mihi & depromendi, & in lucem emittendi liberam potestatem fecit lubentissime. Quæ vero in commodum Tuum, LECTOR Curiose, disertissimis Elegantissimi Auctoris verbis exscripsi, ita se habent.

RANÆ

RANÆ PISCATRICIS Anatome.

GRæci Βάραξον vocant: Istri piscem *Rospum*; Rospus enim ipsis Bufo: Taurinis *Bora*; Lombardis *Zatto*, *Scafig.* in *Arist. Hist. Animal.*

Est Gyrino similis. Nempe anterior ejus pars, sive venter, Ranam vel Bufonem æmulatur; posterior autem in longam & mucronatam caudam definit: cujus pars extrema, sive *pinna*, carnosæ est; & palmipedorum animalium ad instar, intercurrentibus in longum cartilaginibus, late expanditur; estque spithamam longa: indeque ad capitis initium, in ea, quam dissecui, sex spithamæ numerabantur.

Palmi spatium à dicta pinna, *altera pinna* in superiore caudæ parte, inferne amplior & transparens, nascitur. Subter caudam, è regione hujus pinnæ, *altera pinna* conspicitur, carnosæ etiam, & caudæ pinnæ similis. Ab hac pinna, quatuor digitorum latitudine versus caput, *podex* situs est; pauloque infra eum *apertura alia* conspicitur; in quam Vesica Urinaria, & Uteri cornua terminantur. In medio fere ventris, utrinque à lateribus, ampla & carnosæ *pinna* enascitur, spithamam circiter lata, parique ferme longitudinis. In medio dorsi, duo *cincinnati* sive *cirri* exurgunt, digiti longitudine, duobus palmis à caudæ superiore pinna: hinc palmi spatium *alter* item *cincinatus*, pauloque longior exoritur.

Oculi quatuor digitis ab hac pinna remoti, sex digitorum intercapedine à se invicem distabant: interque illos (sed antea multo, nempe prope labii superioris confinium) duo *cornicula* enascuntur, in extremo sui rotundis filamentis præpilata: quorum mobilitate creditur pisciculos in oris sui rictum, ceu nassam, allicere, quod ne Ciceroni quidem ignotum fuisse videtur. Is enim (*de nat. Deor. lib. 2.*) hanc ranæ marinæ solertiam describens, "Ranæ marinæ dicuntur, inquit, obruere sese arena solere, & moveri prope aquam: ad quas, quasi ad escam, pisces cum accesserint, confici à ranis, atque consumi."

Paulo subtrus diaphragma, in supina ejus parte, duæ amplæ *pinnæ*, ad figuram manus, in quinque digitos divisæ (quales in *Mannati* pisce prædicantur) adfunt.

Circum oris ambitum, & juxta latera, ad caudam usque exiguæ *pinnulae* sive *cirruli*, trium fere digitorum à se invicem distantia, reperiuntur.

Rictus oris ingens, totoque circum ambitu dentibus uncis retrorsumque spectantibus plenus. Dentium horum ordo duplex, triplex ve

t *

triplexve: estque id illis singulare, quod interiores (qui etiam cæteris longiores sunt) intro vorsum mobiles sint, ac deprimi possint; extrorsum vero à motu prohibeantur, quod exteriores & minores denticuli illis ad id impedimento sint. Omnes, ut dictum est, retroverfi gulam spectant. Dentes illi majores, cute seu vagina, ad medium sui integuntur; quæ mobilis est: quemadmodum in Feltum unguiculis conspiciamus.

Prope interiores fauces, duo veluti *paleinaria* videntur; quæ à lateribus utrinque dentata sunt, & in cuspidem acuminantur: Postica vero sui parte dentibus caret. In maxilla superiore duæ pariter *protuberantiae* sunt, pulvillis istis respondentes; & dentium longiorum duplici ordine armatae, transversim sitae sunt; & pone illas duo dentes molares unciali amplitudine proxime fauces adjacent. Dentes hi officio suo funguntur ope musculi tendinosi, qui spinæ medio adalligatur, indeque sursum latus, statim bifariam ad dictos dentes fertur.

Branchiae utrinque ternæ. Aperiantur fauces subtus pinnas majores in latere sitas.

Hic sit mihi liberum, precor, gradum parumper sistere, abruptoque descriptionis *Entane* filo, *Tabulam* intertexere, quæ hactenus dicta oculis tuis evidentius exhibeat, deinceps sigillatim contemplanda.

Tabula prima, ejusque Characterum Index.

- a. Pinna superiori caudæ parti insidens.
- b b. Duo Cincinni sive Cirri in medio dorso existentes.
- c. Alter Cincinnus, prioribus paulo longior.
- d d. Duo Cornicula inter oculos enata, quorum filamenta in oris ritum, fili piscatoris ad modum, arcuatim protenduntur.
- e e. Duæ pinnae ampliores, in quinque quasi digitos divaricata.
- f f. Dentium ordo duplex.
- g g g g. Pinnule sive Cirruli circum oris ambitum, & ad latera, Bellonio, appendiculæ carnosæ vocari; qui, natante Rana, supernatant.

Quoad Internam constitutionem;

Cor haud adeo magnum (si Piscis amplitudinem spectes) nempe circiter ovi Gallinacei magnitudine. Non definit in eonum, sed æquali fere ducta ad imum fertur, ubi etiam aliquanto latius conspicitur.

Aorta,

RANA PISCATRIX
The Toad-Fish or Fishing Frog

Fig. 1.

da pag.



Aorta, ex summa ejus parte enata, albida est, & prægrandis: prope exortum tamen è corde angustatur aliquantulum, & quasi annulum efficit. Est in medio grandior, definitque in sex ramos, quorum singuli ad totidem branchias feruntur.

Auricula ingense est (nempe corde fere triplo major) rubicunda valde, &, pulmonum instar, spongiosa: tunica molli & laxa donatur, & in ambitu sui (galli cristæ instar) incisa sive fimbriata cernitur. *Capsula* robusta hæc circumambit.

Harum partium formam & constructionem præsens *Icon* in prosœnium adducit.




Figura secunda, ac literarum ejus explanatio.

a a a. Cor in summo angustius, inferne latius.

b b b. Auricula ejus, in ambitu crenata.

c. Aortæ

c. *Aorta exortus.*

dd. *Ejusdem amplificatio:*

eeeeee. *Et divaricatio in sex ramos.*

f. *Ingressus venæ cavæ in Auriculam.*

Septum transversum exoritur prope *cartilagineam* *pinnae* manifestam continuam; eandemque *claviculam* hæud male dixeris.

Cor densum, & cavernulis repletum. Ubi *aortæ* jungitur, duabus *valvulis* semilunaribus, sanguinis inde recursum prohibet. In *Auricula* conformes *valvulae* (sed quaternæ, ut puto) sanguinem à regressu in cavam arcent.

Venæ Cavæ duo majores trunci (ex duobus *Hepatis* lobis oriundi) postquam *Pericardium* penetrarunt, uniuntur, ferunturque in *Auriculam*. Iisdem etiam commiscetur *Vena Emulgens*, aliæque complures, à *Cordi* vicinis locis sanguinem è capite refluxum advestantes.

Aorta densa crassaque, intus innumeris fibrulis in longum protensis roboratur. *Tunica* ejus exterior venulis conspicuis irrigatur.

Jecur peramplum, ex pallido flavescebat, & in lobos duos prægrandes dirimitur. In superiore parte prope cor, ubi tenue est, deorsum flectitur, & complicatur: quod etiam alicubi in lateribus contingit. Passim fissuris hiulcum est. In exteriori loborum parte (præcipue in sinistra) magna vasa, fluminum instar, conspicua sunt.

Ex *Hepatis cavo*, ejusque medio, complures *ductus hepatici* manifeste prodeunt: qui, postquam extra *hepar*, quinque fere digitorum spatio, delati sunt; desinunt in *sinum amplum* & tres digitos transversos longum: qui postea angustior redditus, in *Duodenum* terminatur, unciae spatio à *Pyloro*; videturque esse quasi *Cystis* minor & succenturiata; est autem *ductus communis*. Illorum ductuum tres medii uniuntur, duorum digitorum spatio, antequam in dictum sinum desinant. Proximus ramus ingreditur initium illius vasis, quod ad *Cystim felleam* abit, & *Meatus Cysticus* appellatur: estque hic *Meatus* longitudinis octo digitorum transversorum, atque amplitudinis calami scriptorii. Cuncta hæc oculis subjiciuntur.

Figu-




Figura tertiæ, Characterumque ejusdem expositio.

aa a. Hepar in lobos duos diremptum.

bb b. Ejusdem complicationes.

cccc. Du-

- c c c c. *Ductus hepatici in ductum communem se exonerantes.*
- d d. *Alii ex ductibus hepaticis, bilem in Forum Cysticum deferentes.*
- e. *Ductus cysticus.*
- f. *Vesicula fellea.*
- g. *Ductus communis.*
- h. *Duodenum.*

Vasa fellea jam dicta, toto tractu *Mesenterio* firmantur; in quo *glans* majuscula, & minores aliquot reperiuntur. *Fel*, pari facilitate, deorsum versus vesiculam felleam, sursumque ad sinum sive ductum communem fertur. Idque ita fieri oportuit; quoniam non, nisi per Forum Cysticum, bilis ad vesiculam felleam decurrit. Consimilem huic vesiculæ felleæ constructionem, in *Xiphia* observat *Thom. Bartholinus Hist. med. centur. 2. hist. 16.* & in *Tursione, cent. ejusdem cap. 25.*

Bilis in vesicula quadrantem minimum pependisset; non enim appendebam. Erat fere dulcamara; &, cerevisiæ veteris instar, translucida.

Mesenterium, pinguedine passim interpersum, amplissimis vasis donabatur.

Oesophagus duplicatus, erat decem uncias latus; constat eadem cum ventriculo substantia; nempe alba, crassa, firma & densa admodum. *Fibræ* transversim incedunt.

Ventriculus passim, & præsertim sub medium sui, plurimis nodis cartilagineis scatebat, qui introrsum hiabant; & in medullis eorum, sanguinis vestigia conspiciuntur. Ad illos *Nodæ* vasa forinsecus adveniunt. In earum Cartilaginum nodosarum una exigui *Vermiculi*, decem numero, reperiuntur: erant oblongi & tenues admodum. Alii item in aliis nidulabantur.

Intestinorum longitudo trium circiter ulnarum. In intestini *Recti* summo evidens *valvula* est. *Cæci* autem ne vestigium quidem. *Rectum* intestinum, columnulis carneis, *abomasum* in bove amulatur.

Pylorus per pusillo foramine (quod vix digiti minimi extremum admiserit) in Duodenum aperitur: quod in illo tractu, *Reticulum* in bovino ventriculo amulatur.

Duodenum, statim ab exortu, in duas *appendices*, sive processus dirimitur: quorum superior altero fere triplo major est.

Quatuor circiter à ventriculo digitis, *Ductus Communis* pertenui foramine in papillam definit, & in Duodenum exinanitur.

Horum pars maxima haud incongrue adumbratur.

Figura




Figura quartæ spumæ.

- aa. Oesophagus, decem uncias latus.
- b. Ventriculus, latitudinis unciarum $16\frac{1}{2}$
- c. Appendix, cæci vicem supplens.
- d. Appendicula.
- e. Ductus communis Duodenum ingrediens.
- f. Nodorum Cartilagineorum ventriculo inspersorum vestigia.

Lien, in dextro latere situs, renis figuræ haud multum dissimilis, & magnitudine minori reni humano par, è membrana sua facillime exuebatur; imo facta incisura sat ampla, sponte sua elaboratur.

Arteria, Vena & Nervus, interiorem concavamque illius partem ingrediuntur, factoque ad medium fere ipsius itinere, vasa illa omnia quoquoversum in ramulos disperguntur.

A *Liene* nervus conspicuus, postquam novem digitorum spatium decurrit, finitur in *plexum* nervosum, in quem alii quoque nervorum rami, à costis atque etiam à renibus derivati, concurrunt. Tribus inde digitis, non longe à dorso, alter *plexus* est: & remote ab illo (fere subtus claviculam) tertius.

Renes

Renes ampli & rubicundi, phaseoli majoris facie, venam *Emulgentem* prægrandem in summo emittunt: per quam sanguis regrediens, postquam septum transiit, Cavam ingreditur, indeque in Auriculam effunditur. Vena *Emulgens*, postquam renem ingressa est, variis ostiis in eundem dehiscit.

Ureter ex imo prodit, habetque valvulas regressum feri præpedientes.

Venæ etiam aliæ in gibbo renis, variis in locis eundem perforant. Quemadmodum & *Arteria Emulgens*, in ramulos complures diremta, diversis locis illum ingreditur.

Vesica Urinaria ampla, & humana major; liquorisque facile, qui libram pendeat, capax.

Uteri cornua, mesometri opera, spinæ dorsi adalligantur, estque alterutrum eorum duarum ulnarum longitudinis.

In summo spinæ, *Cerebri* sedes est; quod tamen non, nisi in interiore parte, cerebri substantiam referebat: in reliquo enim tractu, erat solum aqua limpida & viscida. Mira est venarum per hanc lympham textura.

Nervi Optici prope originem suam sese decussant. *Auditorii* item sunt conspicui: & in laterum ibidem confinio, vesiculæ tenuissimæ sunt, in quibus officula duo auditoria, talparum pedibus consimilia reperiuntur. Eiusmodi quoque officula in capite *Manati* piscis reperiuntur, calculo (ut aiunt) proficua: necnon in *Asellis* piscibus.

Quæ ad *Cerebrum* spectant, ut promptius faciliusque deprehendas, sequens *Schema* patefacit.

x *

Figura



Figura quinta Interpretatio.

aaaa. *Cranium per medium dissectum.*

bb. *Cerebri vestigium.*

ccc. *Cisterna cerebialis, aqua limpida & viscida repleta.*

dd. *Vesicula aquosa, in quibus officula auditoria latent.*

ee. *Nervi Optici, prope exortum se invicem decussantes.*

ff. *Nervi Auditorii.*

Humor Crystallinus est rotundus, & globulo luforio par.

Nullum haecenus vidi animal, in quo plura miranda reperi-
rim. ¶

G A L E U S piscis, *Mas*, *dissectus*.

GALEUS non est nomen proprium; sed genus, ad omnes
Cartilagineos longos spectans: ut *Vulpeculam*, Franc. Masorbus
Caniculam, *Hinnulum*, *Stellarem*, *Spinacem*, & reliqua in 9. Plinii.
generis ejusdem.

Vagus est, vitamque agit segregem. Totus piscis virosi atque
ingrati odoris est.

Longus erat pedes quatuor, à summo rostri ad caudæ pinnam
superiorem: unde ad caudæ extremum, pedis unius spatium supe-
terat. Pinna caudæ inferior, lunam falcata præ se fert. *Linea*,
in utroque latere, à capite ad caudam decurrit. Ambitus in medio
ventre

ventre bipedalis. *Cæcis* tota, manum à cauda versus caput deducenti, hispida valde persentiscitur.

Rostri pars extrema inferius, ad trium pollicum latitudinem, translucet: & superius eadem pelluciditas ad quatuor digitorum longitudinem extenditur. *Nares*, purgando cerebro destinatae, inferius positae sunt; & ab ore sesqui pollicis latitudine absunt. Oris rictus ad semicirculi formam circinnatur, atque ad capitis fere latitudinem patescit. In ejus ambitu, duplex dentium series conspicitur, & alicubi triplex. Est certe *καρχαρίδης*, habetque dentes asperos, teretes, & alternatim positos. Superius; inter palatum & dentes, *papillae carnae* toto ambitu nascuntur. *Linguae* habet crassam, & teretem.

In colli latere utrinque *quinæ* aperturae sunt, branchiarum spiracula. Occluduntur, quando opus, ipsius cutis tegmine, seu operculo. Juxta infimum foramen, pinna utrinque nascitur, septem uncias longa, lataque.

Oculus membranam in imo absconditam nactus est, crassam, firmam, mobilem, totique oculo tegendo parem. Eadem compluribus avibus quoque contigit: nempe *Monedula*, *Pico Martio*, aliisque.

Proxime supra anum, duae pinnae minores invicem conjunctae; quibus geminae apophyses cartilagineae, sesqui digitos longae, interiore parte annectuntur: quae anum intermedium, juxta basin, occludunt. Inter jam dictas ventris pinnas, alia in dorso exurgit, lata digitos quinque cum semisse, & pari fere longitudine. Versus caudam binae pinnulae sunt, in dorso una, altera in ventre, invicem oppositae.

Resupinato pisce, ventrique à capite ad anum aperto, *hepar* non in medio solum, sed & utrinque in latere situm apparuit, tencrum valde ac friabile, viridis coloris, & Gagatis more variegatum. Uterque ejus lobus à diaphragmate ad anum protenditur: totoque sui ductu (fasciae instar) paris fere latitudinis, nempe unciarum quinque; nisi quod in imo aliquantulum angustetur. Parenchyma ejus ex glandulosis quasi acinis innumeris, figura trifolium æmulantibus, constare vidit *Malpighius*, de *Structura viscerum* pag. 6.

Inter utrumque hepatis lobum, *Ventriculus*, amplis venis transversim irriguus, positus est; & ad podicem fere excurrit, ubi in mucronem obtusum definit.

Oesophagus constat membrana robustissima; eratque in illo pisciculus plane emarcidus: argumento, vim pepticam etiam illic exerceri, salivæ fortean beneficio. Nam Fermentalis ejus Aciditas rudimentariam Oris & Oesophagi in alimenta actionem promovet. Uti vel exinde colligas licet, quod saliva cum pane masticato farinaceae massae cuiuspiam immixta, eam tumefaciat ac fermentet. Imo halitus oris

oris excavata eadem massa exceptus, obturatusque idem facit. Huic consimile affert experimentum *Bettius noster*, lib. de ortu & natura sanguinis pag. 22. Incolas nempe *Guianæ* vidimus, inquit, potum ei genti peculiarem conficientes, ex *Cassavi* radicibus aqua maceratis. Quibus alias earundem à mulieribus puerisque bene masticas, & cum saliva probe commixtas eidem vasi indunt. Quo facto, æstuat ebullitque mixtura ista, haud secus ac *Zythus*, spumeo illo *Cerevisiæ* flore, fermentescere solet. Unde constare videtur, salivam tum spirituosus partibus foetam esse, tum ad chyli in ventriculo elaborationem, aliqua ex parte fermentando, conferre.

Cordis figura bursam pastoritiam æmulatur.

Ad fundum ventriculi, versus dorsum, *Lien* exoritur; latus initio fere duos pollices, eandemque propemodum latitudinem servat sex digitorum spatio, quo ventriculi imum amplectitur: deinde appendicem quandam, *Cœci* instar, à latere emittit, & continuatus ejus ductus subito gracilescit, nec supra tertiam pollicis partem latus est. Totus hic gracilis ductus est digitorum quindecim: tandemque pancreati adnectitur. Toto hoc tractu plurima & prægrandia vasa, à ventriculo & intestinis, per mesenterium in lienem transferuntur.

Lien variis in locis (*coli* instar) contractior est; & coloris ex fusco nigricantis.

Pylorus juxta fundum ventriculi exoritur.

Duodenum inter ventriculum & lienem toto illo tractu excurrit: eidemque, ubi lien desinit, *pancreas* adnectitur; quod postea in partes duas crassiores veluti bifurcatur: quarum superioris extremum ductum in intestini bursam immittit, ex adverso illius loci, ubi ductus bilarius ingreditur. Inferioris autem extremitas, septem digitorum longitudine ab intestino, mesenterio adhæret.

Duodenum desinit in *bursam* crassam, carnosam, & robustam valde, in quam exiguo solum foramine aperitur; adeo ut digiti minimi apicem non admittat. In hanc bursam, ut jam diximus, ductus *bilarius* & *pancreaticus* exinaniuntur.

Quæ hactenus dicta sunt, de admiranda viscerum in hoc pisce constructione, ut illustriora reddantur; en! *figuram* hic habes, iisdem ad vivum delineandis consecratam.

Figura



**FIGURÆ, cum Characteribus insculptis,
Explanatio.**

- a a. Oesophagi pars infima.
- bbb. Ventriculus, spiritu inflatus.
- ccc. Vasa ventriculi decussantia.
- d. Pylorus.
- e. Duodenum.
- f. Foramen ex duodeno in bursam patefens.
- g. Bursa duodeni.
- h. Lien.

y *

iii. Lienis

iii. *Lienis appendicula, ad pancreas usque producta.*

kkk. *Ejusdem appendicula contractiones.*

lll. *Pancreas.*

m. *Pars ejus triangularis.*

n. *Ductus pancreaticus,*

o. *Ductus Biliaris, uterque in duodeni bursam exinanitus.*

pp. *Vasa in lienem per mesenterium delata.*

q. *Mesenterium.*

Vesicula fellea nulla adest.

Ventriculus passeribus sive rhombis scatebat, quos in victum prædatus erat.

In exteriori infimaque ani parte, *papilla* est conspicua; quæ *penis* (ut opinor) vicem præstat: namque ex illa (facto compressu) semen & urina, prout vasa seminaria, aut vesica comprimebantur, profluebant.

Parastata, trium digitorum intervallo à diaphragmate exorfi, capsulis membraneis firmissimis involvuntur, & octo digitorum spatio miris mæandris huc illuc (digiti circiter latitudine) parastatarum aliorum more, torquentur; tandemque in truncum amplum uterque definit: qui membranz involventi firmiter annexus, & aliquantulum progressus, reflectitur, denuoque descendens, in *vesicam seminariam* peramplam & semine refertam terminatur.

Testiculus ipse exiguus est, & pollicis articulum vix æquans: reliquum vero in spiras contortum, est parastata; qui reni subjacenti incumbit, eidemque vestigium sui imprimit. Inter utroscumque hos parastatarum ductus *vena cava* ampla interjacet, iisdem calefaciendis idonea.

Renes paulo subtus diaphragma exorfi, ad anum fere descendunt. Superne quidem angusti sunt & pallidi, parastatisque succumbunt: inferius autem ampli, carnosissimi, & rubicundi evadunt.

Arteria in dorso *venæ cavæ* sinistro lateri accumbit.

Cerebrum habet exiguum, & distinctum valde; quod humor aqueus circumfluit. Sed piscibus id familiare videtur, ut permagna corporis moles à cerebro animetur exiguo. Exemplo sit dissectum à *Cl. Nichol. Steno*. Canis *Carchariæ* cerebrum; quod vix tres uncias æquabat in pisce, cujus pondus ter mille libras superavit.

Oculi prægrandes, tunica admodum dura vestiti, musculisque insignibus donati. *Humor Crystallinus* rotundus est.

RANÆ

RANÆ fluviatilis ANATOMIE.

Vivax admodum est animal: adeo ut dentis omnibus intera-
neis, ipsoque unâ corde; valde tamen huc illuc profiliat.
Abscisso autem capite (etiamsi cor pulsum suum usque perpetuet)
immobilis jacet.

Cutis, raris nexibus, maxime circa medii pectoris cartilagineam
apophyfin, & ad articulos, corpori adhærens, nullo negotio de-
glubitur.

Oculus habet nitidos & venuste prominentes: quibus pupilla
inest ampla & nigricans, quam irisaurea circumambit. *Palpebram*
inferiorem, avium more, oculis applicant; sed tam tenuem ut
perluceat.

Ante oculos *foramina* duo conspiciuntur, ad aërem attrahendum
forteque etiam ad odorandum, tenui membrana oblecta, non a-
liter quam auris tympanum. Sub his latet utrinque *sinus*, consi-
mili membranula pariter oblectus; quæ dum urinantur & aerem
sub aqua retinent, inflatur & foras prominet, vesiculæ aere plenæ
modo.

Spinæ dorfi, toto thoracis ductu, *macula alba* longiusculæ ac-
cumbunt; totidem numero, quot sunt costæ. Sunt illæ in non-
nullis triangulæ: ac apertæ lac manifeste effundunt.

Spina dorfi non ultra thoracis regionem protenditur: ubi in os
coccygis, pariscum illa longitudinis, desinit. Ossa *Ischii* utrin-
que ad ossis coccygis exortum ascendunt.

Linguam ab aliis animalibus diversam habet. Mucro namque,
(qui in cæteris absolutus est, ipsis cohæret, piscium more: quod
autem affine est, & solutum & superexplicatum; qua suam vocem,
sive ὀλολυγία, sive κίαξ, semper solent edere. Recte igitur de
hac particula sic loquitur *Aristoteles*; Hist. animal. l. 4. c. 9. ὁ δὲ
βάτραχος ἰδίαν ἔχει τὴν γλῶτταν. ὅ μὲν γὰρ ἔμπροσθεν περισπέν-
κων ἰχθυωδῶς, ὁ τῶς ἄλλοις ἀπολέλυται. τὰ δὲ πρὸς τὴν φάρυγγα ἀ-
πολέλυται, καὶ ἐπέπτυσται ὅτι τὴν ἰδίαν ἀφίησι φωνὴν αἰ. Ubi *Saliger*:
“nam neque ut pisces, totam habet cohærentem; neque, ut Ser-
pentes, totam solutam.

Prope linguæ radicem, *tuberculum* rubrum extat; quod rana pro
arbitrio vel aperit, uel claudit: ambitur enim musculo sphinctere.
Est illud veluti caput *asperæ arteriæ*, quæ descendit ad cordis con-
finia; illicque bifariam divisa, in utrumque pulmonis lobum, dex-
trum & sinistrum, aperitur. Pulmonum quidem nomine, cum
vulgo,

vulgo, indigitavi: sunt tamen revera duntaxat *folliculi ventosi*, quales in multis piscibus fluviatilibus reperiuntur; & à quibus pariter ductus sive canalis, aerem transferens, ad fauces pertendit. Dum enim rana ore clauso spiritum ducit per nares, quas à singulis inspirationibus constringit, parique rhythmo fauces & latera contrahit; *folliculi hi* interea perstant immobiles: præterquam quod, ad faucium motum, sursum ac deorsum aliquantulum cieantur.

Folliculi isti, aperto peritonæo, subito prorumpunt foras; *diaphragmatis* enim nullum vestigium adest. Constant tunica tenui ac pellucida; dactyli fere magnitudinem æquant: & ubi maxime inflati sunt, ad imum abdomen protenduntur. Sunt ut plurimum pyramidiformes: contigit tamen videre ranam fæminam, cujus folliculi haud continuo tractu à lata basi in acutum desinebant; sed tuberoso fundo exurgentes, circa medium sui, paulatim in gracilem conum tenuabantur. Et (quod mirere) uterque complures *Vermiculos* sive galbas (circiter viginti) in sinu complectebantur, quarum capita albescebant, reliquo corpore nigricante.

Oesophagus sat amplo hiatu descendit; moxque paulum dilatatus, *Ventriculum* constituit; indeque dextrorsum latus, *ilion* efformat; quod variis gyris intortum, tenui meatu *colon* (sacculum referens) subit; tandemque in *rectum* desinit.

Cor pyramidale à sinistro latere visum est impleri; & dextrorsum depleri. In ipsa tamen systole mera subsidencia apparuit, citra ullam coni ad basin accessionem. *Conus* hic, mediante pericardio, tenui ligamine sterni adnectitur.

Præcisso cordis cono, illud tamen continuo pulsabat; licet post decem vel duodecim systolas, vix guttula sanguinis proflueret: nec minus diu micabat exemptum è corpore, quam integrum cor exectum in aliis solet.

Folliculi jam dicti excipiunt sanguinem è corde per arteriam pulmonalem, quem per venam pulmonalem mox transferunt in axillarem.

Hepar insignis magnitudinis in tres æquales lobos dividitur: in dextro sita est *vesicula fellea*, rotunda, cæruleique coloris.

Inde ortus *ductus choledochus*, pollicem transversum longus, ampliusque, proxime subter ventriculum, *ilion* ingreditur.

Lien rotundus, floridique coloris, medio mesenterio adnascitur; magnitudine fere seminis coriandri.

Renes, circiter digitum transversum longi, inter spinam dorsali atque os coccygis sedem habent: & uterque, mediante exili *uretere*, in *vesiculam* nigrescentem desinit, quæ ambæ in intestinum rectum evacuantur.

In mare, *Testiculi* renibus accumbunt: iidemque aliquanto post coitum

coitum tempore, indies mirum in modum augentur; ut tandem ad phascoli amplitudinem pertingant. Illis parte superna *processus* varii, albi, ac semine pleni (ad modum cæcorum, juxta Pylorum in piscibus, quæ *Aristoteli* *ἀποβάδεις* *ἄνω* dicuntur) adnectuntur: quorum medii reliquis longitudine pariter atque amplitudine præcellunt; suntque numero seni. Arbitror, *paraſtatarum* sive *epididymidis* munus obire: indeque exortum *vas deferens*, variis gyris tortuosum, ad fauces pertendit; qua, tempore commodo, semen emittitur.

In imo thoracis, binæ *protuberantia* albidæ, spongiosæ & fere orbiculares recto intestino incumbunt: iisdemque binæ majores subter intestinum adjacent. Estque, quod existimem esse *vesiculas seminales*. Molles quippe sunt, instar gelatinæ; earumque exterior facies è vesiculis minimis conſtari videtur.

Rana *femina* processus eisdem habet, quos marium testiculi ad instar diximus. Conspiciuntur etiam utrinque *vasa alba* (nempe *ſeminaria*, sive *lactes*) innumerabilibus gyris plurimum intorta, & quantum videre licuit, è propinquo nervorum plexu oriunda. Desinunt in pelvim sive receptaculum iisdem vasis cum *ovario* commune: illisque *ovaria* fusca & ampla subſternuntur.

Mensis Martii 24° *uterus*, ejusque gyri valde increverant, li- quoreque albuminoso turgidi apparuere: cui ova nigra grandiuſcula paſſim commiſcebantur, pariendi tempore (ut mihi videtur) per fauces, aut linguæ aperturam excludenda.

RANÆ femina dissecta in v.

Tab. 1.

ad pag. 90



Engr.

Εἰκὼς ἑρπυλίας.

In hoc Schemate, Ranæ palustris *femina*, ovis partui jam tum prope maturis gravidæ, interanea repræsentante, curioso rerum naturæ indagatori contemplanda ostenduntur per

a a. *Folliculi* duo *ventosi* (vulgo, sed perperam pro pulmonibus habiti,) inflato aere distenti, suisque sedibus, ne subjacentes partes tenebris involverent, summoti.

b b b. *Intestina* itidem extra abdomen sinistrorsum evoluta.

c. *Cor* pyramidale, retinente locum suam basi, sed cono à nobis propemodum erecto, ut subjecta in conspectum venirent.

d. *Hepatis* lobus sinister nonnihil elevatus.

e. *Renis* dextri sua in sede (inter spinam dorsii atque os coccygis) relictæ pars inferior.

f. Dexter *ureter* inde in vesiculam descendens.

g. *Vesicula urinaria* intestino recto incumbens, & in idem se demum exonerans.

h. *Uterus* sive *ovarium* duplex, ovis nigricantibus, grandiusculis, humoreque albuminoso coloris ex cæruleo virescentis involutis refertum; suæque sede, quo substratus vasorum alborum ova deferentium exortus conspiceretur, paululum detrusum.

i i. *Ductuum* (uti nobis videtur) in mare, semen; in femina, ova deferentium, origines.

k k. Eorundem varii *anfractus* sive, obliqui flexus in se recurrentes.

l. Processus sive *oviductus* dextri *finis* ad fauces pertingens, qua ova suspicor pariendi tempore successive excludi.

m. *Lien* rotundus è medio mesenterio exemptus.

FIGURA

FIGURA II.

Ranæ maris renes, testiculosque, & processus feminales potissimum referens.



Explicatio Figuræ.

Hæc ranæ masculini generis Σπλαγχνοσκηπιά seu extispicium in lucem producit, ad *a a*. *Renes* utrinque inter spinam dorfi & ossis coccygis apophyses constitutos: ad *b b*. *Ureteres* inde deorsum tendentes: ad *c c*. *Testiculos* renum jugo incumbentes, coloris

ris albidis, sed circa medium sui punctulis aliquot subnigricantibus elegantissime interstinctos; ad *dd. Processus seminales*, utrinque numero senos, albos, cæcorum juxta pylorum in piscibus repertorum speciem referentes: ad *ee*. Inde exorta *vasa deferentia*, tractu tortuoso ad fauces pertendentia; qua (uti jam diximus.) coeundi tempore, semen emitti conjectamus. Id enim & vasorum istorum inspectio, & in iisdem contenti seminis copia, & aliarum viarum excretioni feminis accommodarum in ranis sæpissime quidem, sed semper frustra tentata inquisitio, mihi persuadere videntur: Attamen si quis, qui tam cernit acutum, quam aquila aut serpens Epidaurius, certiora mihi demonstraverit; nunquam adeo perfrixtæ frontis fuero & duræ cervicis, quin meliora docenti sim promte, imo grato etiam animo, auscultaturus. Neque enim ex eorum sum numero, qui suas opiniones adeo pertinaciter defendunt, ut refelli, turpe, vinci, nefas esse putent: aut qui de vita, quam de proposita semel susceptaque sententia malint decedere: sed contra iis percipio accenseri, quibus nil antiquius est, quam, ubi per omnibus communem ingenii humani fragilitatem, cum ipsarum quas inquisitum, iverant, rerum obscuritate conjunctam, se rescierint à recto sciendi tramite aberrasse; rectiora doceri, in sacramque veritatis viam reduci ab eruditis. Et in omnibus scriptis meis, quæ hactenus de naturæ operibus in lucem emisi, sum libere professus, veritatem non scire me, sed querere; nec contumaciter querere, sed modeste & dubitanter, ut Philolophum decet. Adhæc, quæ hic de ranarum genitalibus tradidi, ejus esse generis vides, ut non fidem tuam mendicent, sed manus, cultellumque, & autopsiam, ut quæstioni subjiciantur, exposcant, imo expectent. Tuo itaque examini omnia relinquo: de oculorum meorum, qui nondum caligare ceperunt, fide securus; certusque eadem & tuis phenomena, si modo cuncta manu, & commodo anni tempore, scilicet necdum adulto vere, ranas dissecueris, objectum iri. Interim persuasissimam habeo rogo, me trabali (quod ajunt,) clavo memoriæ infixum conservare aureum illud Hippocrati (*ῥῆσι συγγραμμάτων ἀρχαίων* art. 2.) monitum; *Boni medici est, τὰς τοῦ σώματος ἀλλοιώσεις ἀνέμεναι*.

Μίχα Πεοδίν

S I V E

A P P E N D I C U L A ,

Vocum naturalium ab Animalibus quibusdam ratione carentibus editarum, differentias & nomina propria stricte explicans.

Vocem ad placitum exprimendi facultatem Brutorum plerisque provida Naturæ indulgentia, nullo alio fine, nisi ad passionum quibus commoventur suggestiones, animæque affectus libere indicandos, concessam fuisse; profecto nemini mortalium rationis auriumque usu gaudentium, dubium esse potest. Nec minus perspicue liquet, non quemvis sonum incondite ab animali editum, vocem appellari debere; sed eum duntaxat, qui à Glottide aliisque Laryngis partibus quasi *articulatus* emittitur, cum intentione aliquid significandi. Hinc sequi necessario videtur, in animantibus vocalibus tot esse vocum differentias, quot sunt ipsorum (exceptis tantum Piscibus, & insectis quibusdam) species: & unamquamque speciem sibi propriam ac peculiarem obtinere loquelam, nulli alii in universo Naturæ theatro confimilem. Optima ratione summo id agente omnium Conditor, ut quæ ejusdem sunt speciei, se invicem exaudiant, intelligant, advocent, auxilia mutua ferant, noxia fugiant, veneris incant foedera, & loque ipsa tueantur. Etenim si monophona esset omnium loquela, mutuo quidem diversæ confunderentur species; facileque agnus & ovis ad lupum, lepusque ad canem, & aviculæ ad accipitrem accurrerent, vocis similitudine deceptæ. Adhæc ut singulis Animantium generibus, ita & variis uniuscujusque *affectibus* æque varia est vocis differentia. Est enim, exempli gratia, Felis alia vox, dum fame urgetur; alia dum amore & zelotypia incitatur; dum ad blanditur, alia; aliaque dum in iram excandescit: & sic de singulis animalibus. Et sane nisi unaquæque species vocem variare posset, pro affectuum tunc urgentium necessitate; impossibile foret, ut aliis ad eandem familiam spectantibus, aut quid patiantur, quidve petant auxilii, voce significent. Quis autem, post *Democritum*, *Apollonium Thyaneum*, *Tiresiam*, & *Melampum* (quos ferunt alitum colloquia intellixisse, aliisque fideliter, ut ex eventu apparuit, interpretatos fuisse) valear

leat tantam in Brutis vocum varietatem explicare? Audimus quidem, & dignoscimus querulum Bubonis *ululatum*, lugubrem Milvi *clangorem*, Turturis proci agentis *gemitus*, Cocygis *cucutitum*, dulces Philomelæ *modulationes*, Passerum *pipillationes*, Gallorum *eucurritus*, Hirundinum *trinsationes* &c. quinetiam totidem sub illis vocibus miramur nescio quæ, amoris, odii, iræ, indignationis, mæstitiæ, luctusque argumenta latitantia. At quid istæ sibi velint volucres, quoties vocem mutant; & quænam vocis mutatio huic sit, illive affectui indicando propria: hæc sane rationi nostræ tam obscura sunt, quam ipsæ voces claræ ac manifestæ auditui.

Verumtamen prisci illi sapientes viri, quorum summæ sagacitati nos propria rerum nomina & appellationes debemus, quum serio considerassent, maximum atque præcipuum almæ matris Naturæ institutum in creandis animalium vocibus, articulisque variis vocum formandis, illud esse, ut quæque illorum species propriam vocem, propriosque articulos nulli alii speciei confimiles sortiatur: hanc tandem vocis & articulorum proprietatem nominibus quibusdam explicare potissimum cupientes, nomina non quidem simplicem vocem, sed articulos maxime significantia, & referentia excogitarunt, imposueruntque. Ita Porcum *grunire*, Leonem *rugire*, Tigrides *raucare*, &c. vocabulis ad sonorum similitudinem confectis, dixere. Sed ut quæ de propriis animalium vocibus sparsim in hoc opere subindicavimus, in Lectoris memoriam postliminio revocentur; ea hic in unum locum cogere placuit.

1. Voces Quadrupedum.

Aries *blaterare* (à βλαῖ, stultus, inutilis) *ῥαμιζαν*, **to bleat** (à latino, balatus) dicitur. Asellus *uncare* vel *rudere* (à rudi & incondito sono) *ὀρνάζαν*, ab ὄρος, **to bray**: à Franco-gallico *Braire*, quod à Lat. *Barrire* seu ruderere, quod asini proprium. Aper iracundia exardens, *frendere* (quod proprie notat, sonum edere dentibus collisis) *βρύχαν*, id est mordere, quod inter mordendum dentes strideant; **to gnash the teeth**.

Barrus, Elephas *barrire* (à sono vocis) *βρύχαν*, **to bray**.

Canis *latrare* (non quod canes ea voce indicent, quæ noctu latent; ut *Varroni* placuit: sed à sono, ob liquidam, quæ & in *ὕλακνῆν*, unde Hylax, canis nomen in fabula Actæonis) **to bark** (ab Anglo-saxon. *beapcan*, latrare:) & ad iram irritatus, *birrire* (quod *ὀνομασποποιημένοι* est, proprieque dicitur de canibus, cum provocatæ R multa sonant.) **to snarl** à Teuton. *Schnurren*, ringi instar canum. Cervus *glocitare*, apud Authorem Philomelæ; à Virgilio, graviter *rudere* dicitur; & nostrates etiam satis congruenter reddunt, **to bray**. Equus

Equus *binnire* (verbum à sono factum, iudice *Festo*; unde *binnibile* de equo apud *Apuleium*, & *binnibundus*: nisi potius ab *hig*, inserto *N*. quomodo à *χαῖν*, *χαῖνω*) *χρημετιζαν*, to neigh ab Anglo-sax. *nygan*, hinnire.

Lepus *vagire* (à lugubri sono) *βαβαΐζαν*, *μυρυπιζαν*, to squeak, aut *Squall*; alterum à Teuton. *Queckon*; pipire, frittinnire: alterum à Teutonic. *Schallen*, resonare. Leo *ragire*, *βρυχᾶσθαι* (utrumque à sono) to roar: ab Anglo-saxon. *panan*, fremere. Lupus *ululare*, to howl.

Mus *mintrare* (à sono exili & acuto) to squeak. Mustela *dintrire*. Ita enim *Ovid.* in *Eleg. Philomela* inscripta.

Panther *caurire* (à sono vocis) & a quibusdam *felire* (forte à catulientis felis voce horrenda) to waul.

Sorex *disficare*, voce à sono ficta; to squeak.

Tigris *raucare* (à *βράγχος*, quod est raucitas, uti *βραγχαῖν*, raucedo: aufertur enim initio *b*. quod interdum fit: vel à *rauis*, interjecto *c*. quomodo à parum est parcus) to cry with a hoarse voice. Taurus *mugire* (à *μυκᾶμαι* converso tenui *k*. in mediam; quomodo à *κάβιος*, gobius: & *μυκᾶσθαι* est à sono boum, qui est *μῦ*;) to low: à Teuton. *Luyhen*, mugire.

Verres *quiritare* (id est *Quiritium* fidem clamando implorare: unde est Italicum *gridare*, Hispanicum *grittar*, Gallicum *crier*, & conjectura *Vossii*, Belgicum *hrittten*, quasi *quiriten*, item *Scoticum gritt*, plorare) *κατλιᾶζαν*, to whine; ab Anglo-saxon. *panian*, vagire, quod ab Anglo-saxon. *pa*, dolor. Vulpecula *gannire* (à *γάνυσθαι*, gaudere, ut proprie dicatur de canibus, cum læti ob herorum adventum gestiunt: alii *vulpium* esse malunt; ut in carmine quodam apud *Leonem Ostiensem*. lib. 1. *Chronici Ostiens.* cap. 12. *Alopecesque olidæ dudum gannire solebant*) to grin: ab Anglo-saxon. *gnennian*, frendere. Ursus *trincare*, to roar. ¶.

2. Avium Voces.

Accipiter *pipat*, vel *pipit* (à *πιπιζω*; quod non solum de pul-
lorum gallinaceorum voce, sed & de aliarum avium dicitur; unde
columbarum pullos *Pipiones* vocat *Lamprius* in *Alexandro*, & *pi-
pilare* seu *pipitare*, de *Passere* dixit *Catallus Epigr.* 3. κατὰ μετα-
φορὰν autem, *pipire* *Oscis* notabat cum ejulatu conqueri) the
Hawk peepeth: à Franco-gallico *pepier*, quod à Lat. *pipire*.

Acredula mituat à sono vocis exilis. *Anas terrinit* (forte à *te-
tre*, quod limo natet, ex *Tate*, Pavo) *quacketh*: à Belgico
quacken, coaxare, & secundum *Salmas.* not. *Plin. in Solin.* pag. 87.
quaxare.

quaxare. Anser *gratitat*, seu *gingrit* (Festus dictum putat à sono vocis) *gagglet*, id est *καγκλαζει*. *Gingrire* enim, *γυγλαζει*, à *γυγλαζει*, vox est anserum propria: unde genus quoddam tiliarum exiguarum *Gingrina*. Aquila clangit, à *κλαγγειν*: nam non tubarum modo clangor dicitur, sed & *Aquilæ*, ut apud Autorem carminis, quod *Philomela* inscribitur, & apud *Ciceron. l. Tuscul. quest.* Jovis Satelles pastu dilaniat fero, &c. Clangorem fundit vastum.

Bistarda caccibat, forte à *χίζω*, vel à *κακῶν* hoc est *cacare*; ob similitudinem soni quem pueri cacaturientes edunt. Bubo *bubulat*, ut auctor *Philomelæ*; *Bubulat horrendum ferali carmine bubo*: (utrumque à sono factum) & Græce, *βυζειν*, vox est bubonum; Anglice *to whoot*, aut *hoot*: unde *Gil-hooter*, an *Owl*. Butio, id est *Ardea stellata*, *butit*; ita auctor *Philomelæ*, *Inque paludiferis butio butit aquis*: à sono butionis, *Boomp*: unde avis ipsa etiam in provinciis quibusdam Angliæ a *Boompier* vocatur.

Ciconia gloterat, ex *γλοτῆρι*, vel est vox fictitia à sono, *κλάγ-γα*. *Columbæ gemunt*; *Philom. Et castus Turtur, atque Columba gemunt, dobes moan*. *Corvus crocit, crocit, corniculat* (omnia à vocis sono) *croaketh*. *Coturnix griliffat* (à sono qui grilismus dicitur, & Grillorum proprius est, de quo consule *Athén. Kircher. Musurg. lib. i. cap. de Volucr. vocibus*). *Cuculus cuculat*, id est dissyllabam vocem semper teretizat, non in unisono, sed perfectissimæ tertiæ minoris intervallo. *Cygnus drensat*, ut apud *Philomelam*. *Grus gruit, inque glomis Cygni prope flumina drensant*: & *Cantus Cygneus* etiam nullis non veterum Poetarum & Oratorum monumentis celebratur, quem tamen fabulosum existimo, ac *Nympharum*, quas ob eximium candorem *Cygnos* vocabant, occasione à Poetis introductum.

Gallus quidem varias voces edit, aliam nempe dum zelotypia commoveretur, aliam dum comprimit uxores, aliam dum metu percellitur, aliam denique dum temporis indicem agit, quæ vox propria galli est, ideoque *Gallitinium*, *Cock Crowing* dicitur: communiter tamen *cucarrere*, *κοκκῶζειν*, *to Chuck* (omnia à sonitu vocis) perhibetur. *Gallina* similiter varias format voces; aliter nimirum vociferatur dum pullos convocat, aliter dum recens excluso per gaudium exultat ovo, aliter dum ab inimico maxime milvo perterretur, &c. plerunque tamen dicitur *gracillare* (à gracilitate, acutieque soni) *to cackle* (forte à Belgico *Baeckelen*, Franco-gall. *Caqueter*, Ital. *Checcalare*, id est, glocitare:

b b *

omnia

omnia à sono ficta) & ubi pullos allicit, *glotware*, *to clock*. Graculus *frigulat*, seu frigitur (ex *φρίττω*, subtiliter admodum garrire) *prattleth*. Indubie vel à Teutonic. *Pracht*, Belgic. *praeten*, Franco-gall. *breteler*, fabulari; vel à *φράζω*, dicere.

Hirundo *trinsat*, seu fritinnit (à *φρίττω*, nomine ad sonitum vocis exilissimæ accommodato) *warbleth* (forte, ut Skinnerus noster desecit, à Belg. *warbeelen*, in orbem versari, nobis, sensu hoc in Musicam recepto, vocem reciprocantibus modulis quasi circumagere, vocem vibrare, *to quaver*.) unde Autor Philomela,

*Regulus atque Merops, de rubro pectore Fragne
Consimili cantu zinzibilare solent.*

Merula modulatur. Et recte quidem. Vix enim ullum cautionis genus est tam heteroclitum, quod avis hæc harmonica non addiscat, tam exacte singulas notas pronunciando, ut ne in minimo quidem hemitonio aberrat. Milvus *lipit* (à *λυπίω*, doleo, quasi vocem edens dolorosam) vel *jugit*, ut apud Festum, *jugere* Milvi dicuntur, cum vocem emittunt; & Glossæ Philoxeni, *jugit*, *ιγτίρ βοῶ*. (forte à jugi clamore) *whineth*.

Noctua *cucubat* (avis ipsius nomen à voce sua factum est) *Schricketh* (vel à Belgico *Schriken*, tremere; horrenda enim vox est: vel à Teutonico *Schreyen*, exclamare: unde nobis Scops, à *Schreech Owl* dicitur.) *Mer. Casaub.* desecit à *κρίζω*, stridorem edo.

Pica *Kittabizat* seu *picatur*, id est stridulam sibi que peculiarem emitit vocem; *Chatters*; à Franco-gallico *cacqueter*, garrere instar monedulæ aut picæ. Palumbes *plausitat*, *κρότα*, *Coos*. Parus *tinninat*, à tinnitu vocis cui nostra quidem lingua, *the Titmouse tinkles*, satis apte respondet. Passer *frithisat*, *pipit*, *pipilat*, *pipillat*; quod de passere dixit Catullus *Epigr.* 2. *Ad solam dominam usque pipilabat* (pipulo, quod à Græcis acceptum; unde *Hesychius*, *πιπίζων κατὰ μίμησιν ἡ λέξις πιποινμένη τῆς τῶν ὀπρίων φωνῆς*, ex quo liquet, esse verbum *ὀνομαστικόν*.) *the sparrow chirpeth*. Pavo *pipillat*, (apud auctorem Philomela) & à voce sua dictum Varro tradit. Perdix *cucubat*, (*Hesychius* *κακκάτων* scribit) *tinnibizat* (utrumque à sonitu vocis) *calls*.

Regulus zinzibilat, aliis *zinzillat*, *quavers* aut *trills* (propria Musicorum vox, optime ab *Athanasio Kircher* explicata, *Artis magn. Consoni & Dissoni lib. 1. Sect. 4. pag. 29.*)

Sturnus pisitat, ut apud Auct. Philomela, *dum turdus trutilat*,
Sturnus

Sturnus tunc pīcat ore; forte à *πικτός*, pīso, & pīnsh; quod vocem suam in gutture quasi confringere videatur. Græcis dicitur *μυλίζω*, quod & Turdis commune.

Turdus *truilat*, sed magis proprie *Kiobizat*, id est vocem suam modulatur; *μυλίζω*; ab Anglo-Saxon *mylan*, sibilare, q. d. Latine *fistulare*.

Vespertilio *stridet*, *στυγίζω*. Ulula *ululat*, vide ulule Etymon supra. Upupa *popissat* (à *popysmate*, quod est oris pressi sonus, & labiorum in se colliscentium strepites; uti definit vetus *Scholias* in *Juvenal. Satyr. 6.*) *hoops* aut *pepps*. Vultur *palpat*, id est pro *pulpa*, seu cibo clamat, *cries for meat*. ¶

III. Sonorum ab Insectis quibusdam editorum nomina propria.

INSECTA similiter plurima, præsertim ex Alatorum numero; ut Apes, Vespæ, Scarabæi, Muscæ, Cicadæ, Locustæ, Grilli &c. licet sanguine destituta, quia tamen volitant, & longe lateque ad querendum victum divagantur; idcirco vocem aliquam emittere, ac loquelam quandam exercere debent, ut se mutuo exaudiant, & longius advocent. Hinc admirando utique Naturæ artificio factum est, ut etiam si angustiora eorum pectora faucesque perexiguæ, organis vocalibus propriè sic dictis careant; sonus tamen in iis, non ære quidem, perfectiorum animalium more, violenter expirato, sed *Spiritu* intus contento, & membranulis quibusdam ad resonantiæ commoditatem extensis creberrime alio efficitur audibilis: quemadmodum prodidit *Aristoteles*, q. de *hist. animal. cap. 9.* Etenim alia murmur edunt, ut Apes; alia bombizant, ut *Bombilius*, *Craebro*, *Cantharus* &c. alia canere dicuntur, ut Cicadæ: omnia autem in eo genere, membrana quadam diaphragmati subdita, qua præcinctum corpus distinguitur, sonant. Ita

Apes, ne ad alvearea redeuntes, taciti facti videantur; inter volandum *murmur* edunt, qui simul cum volatu audiri incipit & finiri: qui sonus utrum ex ore fiat, an alarum motu; litigunt *Aristoteles* atque *Hesychius*; nec mihi tam *Lycæi* obicerant oculi, qui rem tot involueris abditam dijudicent. Horum vero *Tibicipes* & *Cornicines* *Σίσυρος* edunt *Hesychio*, & *Angli* non incongrue *hums* vocant: eumque sonum vigilantiæ, somni, operæve signum & tesseram statuunt.

Bombilius item *murmurat*; ipsum quippe nomen à sono vocis obtinens, recte *βουβυλιάζω*, id est *murmur*, edere: qua item de causa nostratibus *Humble Bee* (quasi apem sonantem dixeris, *Humble*

Humming Bee) dicitur. Unde etiam (ut doctiss. *Mouffetus* ex *Turnebo* notat.) *Bombyces*, qui longis tibiis (*Bzone Pipes*) in Bombi hujus æmulationem, imponuntur, originem appellationis duxerunt: quas *πυρρῶν αὐλῶν* vocat *Pollux*. Calamum quoque huic tibiæ generi idoneum, *Theophrastus* *Βομβυκίαν* appellat.

Cicada, *φιλόμεν* ἢ *ἰδύπβολος*, bestiola, summa æstate messorum & itinerantium aures cantu Apollineo demulcet. Sonum vero illum stridulum atque obstreperum, alii aliter edi existimant. Quippe sunt, qui eum in promuscula formari credant; sunt etiam qui alarum contritione fieri autument. Verum *Aristoteles* rectius tradit, cicadas canere alliso spiritu ad membranulam septo transverso subditam: nam dum illa eo pacto distenditur atque remittitur, sursumque ac deorsum impellitur, sonus erumpit stridulus, haud secus quam in puerorum arundineis fistulis, pellicula tenui constantibus; qua depressa, intenta, vel vibrata, sonitum fieri necesse est. Atque hæc forsitan ratio est, cur femellæ Cicadæ non canunt; integræ nimirum, & orbatae illo spatio intercrurali, ubi maribus tenuis nascens membrana strepitum, cantumque emittit. Isti huc admirabile sagacis Naturæ artificium, omniaque ejus instrumenta, per accuratissimam anatomen detecta, optime descripsit *Athanas. Kircher. Art. magn. Consoni & Dissoni* pag. 33. quo lectorem remittimus.

Gryllus ad cicadam proxime accedit cantu, qui argutus est, & *Gryllismus* proprie nuncupatur. Alarum vibratione ac attritu edi sonum istum perstridulum, post *Plinium* confirmat *Mouffetus*, experimento *Garretti* cujusdam, Pharmacopœi Londinensis, qui a, his Gryllorum avulsis mutuoque attritis, eundem sonum recte imitando assecutus est, ut miraretur *Scaligerum* id nescio cui folliculo & fistulæ in cava parte alvi collocatis, *Sabinum* vero, dentium collisi, oni acceptum tulisse. Quum leviter alas per antri sui angustias atterunt, parvum sonum efficiunt; cum vero pro foribus fortius has vibrant, valde argutum; nec omnino sine alarum agitatione strident. Has enim amputaveris, vel avulseris, stridorem illum omnem perire cito videbis.

Locustæ suis gubernaculis vel pennis atterentes, acute sonant, inquit *Arist. 4. hist. animal. cap. 9*. At *Mouffetus* tribus id modis fieri existimat; dentium stridore, dum herbas rodunt, alarum converberatione, dum eas vibrant, scapularum & colli durioris contritione, dum se movent, & saltant. Quod si verum est, triplicem edant sonum, necessum est.

Scarabæi, dum volant, tanto stridore vel murmure & mugitu potius aerem replent, ut per eos Deorum cum hominibus fieri colloquia *Laertius* scriberet. Horrendus vero, & Panicus iste Bombus,

bus, cantusque vere militaris, non aliunde quam à perniciosissimis alarum vibrationibus inter volandum repetitis, aeremque verberantibus, provenire videtur. Incipit enim cum volatu, simulque cum eo finitur.

Vespa quoque *bombum* edunt, ut *Apes*: sed stridulum magis atque horrifonum, præsertim cum irritantur. Unde illud in indotum doctis obstreperum, factum à *Theocrito* in *Hodæporis* proverbium, Σπῆξ βομβῶν τέτλιος ἰγαντίον.

Pæne mihi ex animo exciderant *Culices*, qui altum & jucundum canunt. His quippe concessit Natura proboscidem, Muscarum proboscide triplo longiorem; qua non solum sanguinem ex animalibus, vinique mustum, pertusa solidissimi ligni compage, doliis exhauriunt; sed & pro lingua utuntur & ore, sonitum emittendo truculentum, atque pro corporis ratione maximum: unde *Homerus* in *Batrachomyomachia* culices signi datores facit. Edere vero sonum ex *Tuba* illa, sensus indicat. Etenim adversi *Culices* acutius canunt, averfi gravius: id quod fieri sane haud posset, nisi anteriori parte sonarent.

IV. Sonos à Piscibus quibusdam edi solitos

Breviter mihi explicaturo, sufficiet, quæ *Aristoteles* in 4. *Hist. Animal. cap. 9.* de iis prodidit, recitare. *Lyra* & *Chromis* (inquit) "quasi grunitum emittunt; *Aper* piscis stridet, *Cuculus* vero, ut "cuculus avis, obstrepat; unde nomen accepit: quæ omnia credi- "tam illam vocem emittunt attritu branchiarum, quas horridiuscu- "las continent; aut suis interioribus, quæ circa ventrem habentur. "Spiritus enim inclusus in his est, quem dum atterunt atque agi- "tant, sonos illos elidunt. Pariter *Cartilaginei* generis nonnulla "stridere videntur. Verum ab his vocem emitti ullam, recte dici "non potest; at sonitum sive strepitum reddi, verius dixeris. Nam " & *Petlines* quoties per summa humoris nitibundi feruntur (quod "volitare dicunt) stridere sentiuntur. Similiter etiam marinæ *Hi- "rundines*, quæ sublimes volitant, haudquaquam mare attingen- "tes: Sunt enim iis alæ latæ & longæ. Ut igitur per volatum avium "strepitus, quem alæ excutiant, nulla vox est; ita nec ejusmodi "sonorum aliquis, vox jure appellatur. At *Delphinus* pariter stridet "ac mutit, efferens se in aerem; sed non quemadmodum ea, quæ "superius enumerata sunt: hic enim & arteriam & pulmonem ha- "bet, proindeque nonnihil vocis potest promovere; lingua tamen "libera absoluta que caret, & labris, quibus vocis aliquem possit "articulum efformare. Hæc *Arist.*

Porro *Tinca* & *Cyprini* strepitum quendam *poppysmati* similem edere solent, dum aquis exertum os aperiunt, & labia mutuo applicata, & viscido humore glutinosa deducunt separantque. Et hæc quidem de naturalibus animalium ratione carentium vocibus, earumque differentiis dicta sunt. ¶

Cuniculus

Cuniculus sive *Porcellus* Indicus.

Nomine inter *Cuniculum* & *Porcellum* ambigit; quod plura illi convenient, quæ alterutri eorum sunt peculiariora. *Aqua-pendens* quidem videtur esse è *Marium* genere; & quibusdam *Mus Pharaonis* appellatur. Pili ejus molliusculi sunt; duriores tamen, quam quibus cuniculus vestitur: & ut plurimum diversicolore pelle induuntur. Caro edulis est, & porcinam sapit: cumque ad mensam paratur, non debet (cuniculi nostratis instar) pelle nudari: sed aqua fervente (porcellorum ritu) depilari. Corio tamen facillime (cuniculi instar) exuitur: præterquam ubi musculus tenuissimus ac latissimus abdominis lateribus, pectorisque regioni adnascitur. In cruribus hic musculus deficit: & caro musculosa cuti subjecta, ab eadem facile est separabilis. Rostro à cuniculis parum abit. Leporinam barbam habet: pili tamen oblongiores nulli circum oculos nascuntur. Pedibus anterioribus os & caput scabit, ut cuniculi solent: & horum quoque more posterioribus pedibus insidet; ideoque crura ad suffraginem usque callo obducta sunt, quemadmodum & pedes. Haud subultim tamen incidit; sed alternato pedum gressu, porcorum ritu. Anteriores pedes quaternis digitis donantur, posteriores ternis tantum; eorumque medius longior est reliquis: non autem senos antè, & quinque postè habent, uti *Gesnerus*, & *Aldrovandus* voluerunt. Vociferatur, ac grunnit, nescentium more: & cuniculi modo comedit. Non fodit, ut cuniculus; neque ut hic, cæcus nascitur. Pugnaturus ferit rostro, porcino more. *Aures* humiles, tenues, pellucidæ, patulæ, subrotundæ, & propemodum depiles sunt; glirium auribus non dissimiles: exque recens natis haud multo minores, quam adultis. Oculi nigricant, eorumque in medio umbone obscurior pupilla conspicitur.

Dentes ut in muribus: nempe incisores bini utrinque, longi, tenues, & acuti; molares autem quaterni utrinque, tum in superiore, tum etiam in inferiore maxilla numerantur: iidemque omnes, intus pariter forisque, incisuris sive crenis insculpti sunt, grato sane intuentibus spectaculo. Incisuræ istæ, in maxilla quidem superiore, intus acutangulæ, foris obtusangulæ conspiciuntur; in maxilla autem inferiore contrarium evenit: adeoque quilibet dens literam *W* concinne exprimit.

Superius labium, cuniculi instar, versus nares humilium cernitur. Aqua huic animali nihil opus, modo herbis viridibus vescitur. Candæ vestigium nullum; estque è genere retromingentium.

Lin-

Lingua inter molares fertur ad dentes primores maxillæ inferioris; & dum intra molarium cavitatem tendit, lateribus & fundo suo partibus vicinis adnectitur, angustaturque aliquantulum ubi anteriori earum isthmo appropinquat; dein dilatatur paululum, totoque reliquo ductu, ad apicem usque, libertate sua fruitur.

Orificium *Laryngis*, vice epiglottidis (qua caret) membrana carnosæ, figuræ semilunaris (quæ retro nata antrorsum spectat) obtegitur.

Cuniculus juvenis, quem dissecuri, pendebat totus uncias quinque, drachmam unam, ac scrupulos duos. *Pulmorum* lobi in dextro & sinistro latere, pares numero, & figura consimiles erant: nimirum terni utrobique conspiciebantur; eorumque infimus valde exiguus, superior autem bifidus cernebatur. Ponderis erant granorum viginti novem. *Cor* pendebat grana octo cum semisse. *Cartilago mucronata* erat lata admodum.

Hepar totum diaphragmatis cavum implet: ejusque *suspensorium* (tenuissima membrana constans) medium diaphragma perreptat, atque ad imam sterni sedem terminatur; adeo ut à dicto ligamento in duas propemodum æquales partes dirimatur, & utrumque hypochondrium adimpleat. In dextro latere tres lobi alii aliis imbricatum incumbunt; & qui suspensorio proximus est, *Vesiculam felleam* sibi subtus annexam amplectitur: in sinistro autem duo similiter fiti; quorum inferior reliquis grandior, interiorique sui facie fissuris complurculis hiulcus conspicitur. Sub dictis lobis, atque in medio eorum, duo pusilli lobuli spatium inter œsophagum ac pylorum complent. *Hepar* ipsum erat drachmarum duarum, & granorum trium pondus.

Vesicula biliaris, ejusdem fere coloris erat cum hepate, sed aliquanto pallidioris. Ductus *cysticus* oblongus est: & *choledochus* prope Jejunii principium desinit. Vesicula ipsa haud grani dimidium pependit. Duplicaturæ *Omenti* pars antica ventriculi fundo, secundum longitudinem ejus, adnectitur: postica vero subter ventriculum ad dorsum producta, & pancreata amplectens, lieni, posteriorique ventriculi parti affigitur.

Pancreas exiguum & tenue admodum, atque ex rubro pallidum; dorso transversim incumbit.

Lien floride rubicundus, oblongus, & gracilis, sinistro ventriculi lateri adhæret; eratque ponderis granorum duorum, ac paulo amplius.

Mesenterium intestinis, pancreati, & dorsi spinæ connectitur: latum, ubi colo adnascitur, tres digitos. In ejus centro glandula majuscula, cum minoribus aliis circumspersis.

Intestina tenuia, spatio viginti octo unciarum, obscure flavescunt; materiaque in iis contenta, uno continuatoque ductu ad inferiora

feriora vergit: post illa vero æquali spatio nonnihil nigricant. Eratque adeo totus tenuium intestinorum tractus longitudinis unciarum quinquaginta sex. Ibi cum *Cecum* incipit, falcis modo curvatum, & pro æqualis proportionem, amplius admodum; extensum quippe uncias quinque cum semisse æquat. Tribus ligamentis donatur, eorumque opera in figuram rotundam contrahitur, cellulasque sive plicas efformat. Continebat materiam liquidiorē ea, quæ in ventriculo reperiebatur, magisque digestam, uniformem, mucilaginosam, & ex vitidi nigrescentem: illi plane consimilem, quæ in ruminantium *abomaso* conspicitur.

Colon à sinistra Cæci extremitate (non procul ab *Ælij* insertionē) exortum, flexuosissimis orbibus ad anum, viginti quinque cum semisse unciarum spatio, decurrit; quarum duæ recto intestino (ab emulgentibus ad anum protenso) debentur. Stercora in *Colo* plane nigricant, interpositisque inter singula spatiis descendunt. Scybala ista, nucleorum pineorum instar, oblonga sunt; qualia sæpe murium sterora solent conspici, qualiaque ipsi hi Cuniculi excernunt. Hujus autem rei hanc causam arbitror, quod *Colon* alicubi acuto angulo curvatum, arcteque complicatum, durescenti jam sterori ductum longiorem non concedat.

Renes succenturiati dicti, proportionem corporis, ampli sunt, & figuræ ovalis; exterius flavi, intus nigricant, renibusque ipsis adherent.

Res, in parte convexa secundum longitudinem sectus, utrinque Corticiorum cultelli formam præ se tulit, inque medio sui una solum cavitate donabatur. Similiter pendebat grana quatuordecim, dexter duntaxat tredecim.

Insigni ubertate fecundant: siquidem femina octonos, & interdum plures uno partu edit, diciturque ut plurimum novenis septimanis denuo parere.

In *masculo*, corpora duo nervosa, ex posteriore ossis pubis parte oriunda, & cum urethra mox coeuntia, *penem* crassiusculum ac teretem, duosque circiter digitos transversos longum constituunt. Hic subter cutem latens, primo antrorsum dimidiati pollicis longitudine fertur, deinde versus anum reflectitur. In hujus extremo, os exile reperitur, pollicis fere semissem longitudine æquans: cujus summus apex nonnihil deorsum incurvatur. Extenso pene, factaque compressione, materia seminalis alba, viscida, ac tenax valde è meatu urinario profiliit:

Vesiculæ seminales bicornes, pyramidales, contortæ, instar lumbricorum intestinalium, trium pollicum longitudine, fere ad renes usque protendebantur. Pendebant simul scrupulos duos & grana sex. *Vasa* spermatica conspicua ad testes majusculos pertinent: qui intus latitantes peritonæo adnectuntur. Pinguedinis

dd*

pluscu-

pluſculum circa corpus *pyramidale* conſpiciebatur. Teſticulus cum epididymide pendeſcit ſcrupulos duos.

In *ſamella* natu grandiore, exterius cervicis *uteri* orificium orbiculatum, & pro animalis magnitudine, amplum cernitur. *Cervix* ipſa duos pollices longa eſt, *Orificium interius*, inſtar papillæ, in intimum cervicis ſinum protuberans, ita clauditur, ut ſpecillum tamen mediocri citra vim admittat. Orificium hoc mox in bina *uteri cornua* aperitur, quæ ſuperne parvis glandulis alligantur (quas pro teſticulis habeo) exindeque duplici membrana, à *peritonæo* circa muſculos *lumbares* orta, dorſo, renibus, atque inter ſe, cervicique ſuæ adnæſcuntur. Membrana hæc, pinguedine munita, vaſorum in uterum distributioni inſervit. *Cornua* in figuram conicam paulatim deſinunt, ipſique eorum apicis utrinque ad renes pertendunt. Ipſa aliquanto ſpatio foris protenduntur, intus vero membrana, ceu ſepto, dirimuntur, paulo ſupra orificium *uteri interius*. In utrolibet cornu *fætus* reperiebatur, major autem in ſiniſtro. Aderant etiam duæ albæ protuberantiæ, à latere *uteri* verſus ſpinam exterius conſpiciendæ. *Protuberantiæ* iſtæ, apertis cornibus, *placenta* eſſe deprehendebantur; iidemque *fætus* adhærebant. Quælibet placenta, ceu gemina, apparuit, utraque illius parte *placentæ* formam referente. Quæ utero proxime adnæſcebatur (quam *ſubplacentum* nominare libet) albidus coloris erat; altera vero rubicundior. Quinetiam exterior illa albicans uteroque adnata, in *minore* *fætu* latior apparuit: contra autem in *maiore*, interior ac rubicundior placenta, amplior conſpiciebatur. *Aſpredines* quædam atque corrugationes in his *uteri* locis deprehendebantur, quibus jam dictæ *placentæ* adnæſcebantur.

Chorion tenue admodum ac pellucidum, *fætum* aquis innatantem amplectebatur; *placentæ*que, mediantibus vaſis, ac membranoſa connexione adalligabatur.

Fætus minor erat albidus coloris, mollisſque, inſtar vermiculi, ſive galbæ: major autem rubicundior apparuit, utpote dies aliquot major natu; nam partibus omnibus ſic ſatis diſtinctus conſpiciebatur.

F I N I S.

De Variis
F O S S I L I U M
GENERIBUS.

(A a)

F O S S I L I U M

Divisio Generalis.

F O S S I L I A (sic dicta, quod major eorum pars fodiendo è terra eruatur) commodissime dividuntur in *Media mineralia, Lapides, & Metalla.*

I. **MEDIA MINERALIA** illa vocamus, quæ mediam quasi naturam habent inter *Lapides & Metalla.*

Hæc rursus sunt vel *Terra, vel Sales, vel Sulphura, vel Bitumina.*

Per **TERRAM** hoc loco intelligimus Corpus fossile, naturæ mineralis particeps, quod injecta aqua solvitur & lutum fit. Licet vero quædam hujus generis terræ reperiantur, quæ aquis madefactæ non confestim solvantur in Lutum; progressu tamen temporis, si diu macerentur, eò rediguntur.

Terra, ratione *usuum* quibus inserviunt, dividuntur in eas, quibus varii *Artifices* utuntur; & eas, quæ *Medicis* potissimum sunt ex usu.

Terrarum, quibus varii utuntur **ARTIFICES** Classis.

TErræ, quæ à variis *Artificibus* in usum trahuntur, sunt

I. **ARGILLA** (ab ἀργιλλος five ἀργιλλος, ut apud *Hesychium* ea vox scribitur: ἀργιλλος, autem dicta videtur ab ἀργός quæ *album* notat, ut proprie significet λευκὰ ἀργιλλον, Candidam Argillam) **white Clay, five Clay.** Quæ in partem quamcunque ducta, non abrumpitur; neque exsiccata dehiscit. Ejus enim hæc proprietas est, ut quamlibet figuram recipere possit, & in caminis cocta, in lapideam substantiam concre scat. Hacce potissimum utuntur Figuli & Plastræ, & qui fistulas five tubulos ad sugendum Nicotianæ fumum conficiunt. Nobiliores hujus *species* sunt (1.) *Samia*; (2.) *Aretia & Mutina*, in Italia; (3.) *Porcellana* five *Chinensis*.

(A 2 2)

II. **CRETA**

II. C R E T A (nomen ab *Insula* sic dicta traxisse videtur, quòd olim ex ea laudabilior adferebatur) **Chalk**. Quæ candore insignis est, & eodem colore alia inficere potest. Ad expoliendum, mundandum, fricandum, illinendum, & colorandum usurpatur. Varii igitur Artifices ejus usum sibi accommodant. Hujus meliores species sunt (1.) *Cimolia*, quæ è *Cimolo*, una è *Cycladibus* insulis, petitur; (2.) *Sarda*, quæ è *Sardinia*; (3.) *Umbrica*, quæ ex *Umbria*; (4.) *Fuldensis*; (5.) *Hildesheimensis*; (6.) *Anglica*, quam *Smectin*, seu *Terram Saponariam* & Fullonicam, **Fullers Earth** vocant; & ex qua conficitur Album Hispanicum, **Spanish White** vulgo dictum; (7.) *Umbria* (quia ea umbras in picturis exprimere solent pictores) **Umber**. Quæ substantiæ est levissimæ, tenuissimæ, subtilissimæ; linguæ adhærens; colore fusco. Ad ignem induratur, ut Bolus & Argilla. (8.) *Terra nivea* è *lacu Mexicana*, quam *Joh. de Laet.* in descript. *Indiæ Occident.* lib. 5. cap. 6. ab incolis barbaris *Hicatlalli*, i. e. terram candidam, vocari scribit. (9.) *Creta viridis*, quæ cotta ad rubedinem transit. Olim optima in *Smyrna*, quam Græci *Theodosiam* vocabant (quia fundus iste, in quo primum reperiebatur hæc Creta, fuit *Theodosii* cujusdam.)

III. R U B R I C A, Græcis *Μύλμος*, **Marling-stone**, **Ruddle** aut **Reddle**, & **Red-Ochre**. Olim celeberrima in Cappadocia, Lemno, Africa, & Balearibus insulis extabat: sed *Synopica* reliquis præferebatur. Apud nos multis in locis reperitur. Huc spectant *Rubrica ex insulis Feroensibus* allata, cujus primus meminit *Ol. Wormius*, *Musei sui* pagin. 4. & *Rubrica Laminata*, seu in Laminas scissilis, quæ non nisi madefacta lineas ducit rubicundas, & Fabris Lignariis nostris in usu est.

I V. N I G R I C A *Fabrilis* (ut à *Meretto* nostro, qui eam ad viculum quendam in Cumbria, **Kestwick** vocatum, observavit, nominatur) **Black-Lead**; quæ Angliæ peculiaris videtur. De hac ita *Camdenus*, in descript. *Cumberlandiæ*. Hic passim etiam reperitur terra illa metallica, sive Saxum induratum & micans, nobis **Black-Lead** dictum; quo ad ducendas lineas, & monochromata Pictores utuntur, &c.

V. O C H R A, *ᾠγα* (quod luteo sit colore) Plinio & Latinis *Sil* dicta, **Yellow-Ochre**. Cujus species nobiliores sunt (1.) *Anglica*, (2.) *Scanderburgica*, (3.) *Islandica*, (4.) *Nigricans Argillosa*, (5.) *Fæstitia plumbaria*, ex plumbò nigro; donec colorem luteum acquisiverit, calcinato confecta.

VI. T E R R A N I G R A R A N D R U S I E N S I S, quæ arenosa est, exiguis glebis intermixta, non admodum ponderosa, colore nigro digitos inficiens, falsum quid sapore præferens, prout describitur ab *Ol. Wormio*, *Musei* pag. 5.

VII.

VII. GLEBA GRATIANOPOLITANA, quæ ex cinereo nigricat, & sulphureum quid redolet, à combustione cinereum colorem acquirens. Reperitur enim in Delphinatu Galliæ, duobus miliaribus à *Gratianopoli*, in monte ardenti, quem incolæ vocant *La Fontaine qui brûle*.

VIII. PNI GITES (à *Pnigeo*, vico *Libea Mareotidis*, nomen trahens) quæ pinguis est, spissa, mollis, nigra, astringens & acris valde, sapore Vitriolum referens.

IX. CRETA ARGENTARIA (quia fabris Argentariis, ad expolienda vasa argentea, in usu est) quæ species quædam *Marge* esse videtur.

X. TRIPPLA, *Triplis*, quæ vasa Orichalcica poliunt & mendant Tonsores. Granula enim habet minima, sed admodum dura & robusta, eoque nomine ad poliendum aptissima. Varia ejus sunt genera. Quædam substantia terram & cretam exprimunt: quædam lapides & cœmentum.

XI. PULVIS PUTREOLANUS, qui nascitur in Regionibus Bajanis & in agris Municipiorum, quæ sunt circa Vesuvium montem, & commixtus cum calce & cœmento, non modo cæteris ædificiis præstat firmitates, sed etiam moles quæ construuntur in mari, sub aqua solidesunt. De quo *Vitruvius Architectur. lib. 2. cap. 6.*

Hujus quoque Classis sunt Terræ *Paretonia*, *Melina*, *Eretria*, quæ olim & Græcis & Romanis Pictoribus magno erant in pretio: sed diu est, quo in defuetudinem abierunt.

Huc denique spectat mirabilis illa *Gleba*, quæ ex aqua superaffusa calorem igneum acquirit, cujus meminit *Nobilissimus Boyleus*, in *lib. de Frigore*.

Terrarum, quæ in usum MEDICUM veniunt, Classis.

Terræ, quæ vim aliquam Medicamentosam obtinuisse censentur, dividuntur, ratione *Coloris*, in *Albas*, *Rubras*, *Luteas*, *Purpureas*.

Ex *Albarum* genere sunt.

I. S A M I A, à veteribus maxime celebrata. Cujus duo erant genera. Unum, *Collyrium* dictum, eo quod medicamentis oculariis admiscebatur; terra pinguis, rara, mollis, candida, dulcis. Alterum, dictum *Aster*, vel quod signo stellæ signabatur, vel quod micæ quædam (stellarum instar) in ea emicabant. Vim

(B b)

habebat

habebat refrigerandi, adstringendi, sanguinis eruptiones & fluores sistendi, &c.

II. NORWEGICA, sive *Marga Saxatilis*, Germanis & Danis *Steinmarg* dicta, & ab *Ol. Wormio*. *Musæi sui pag. 5.* celebrata.

III. FEROENSIS, ex insulis Feroënsibus delata, & *Stenomarga*, i. e. Saxi medulla (quod in fibris commissurisque saxorum includitur) ab *Agricola* vocata, à *Ferrando Imperato* vero *Agaricus Mineralis* (quia candore, levitate, & raritate Agarico prorsus similis: quibusdam *Lao Luna* (propter candorem & teneritudinem quam habet:) cui eadem omnino vires tribuuntur, quas Veteres terræ *Samia*. De hoc Lacte Lunæ dissertationem singularem, nuper scripsit, ediditque *Joh. Daniel Major*, M. D. ubi inter cætera reperies hoc Cosmeticum. ℞. Lact. Lunæ 3 vij. Laccæ Virginianæ vel Florentinæ 3 j. Moschi optimi gr. ij vel iij. Misc. & pulverentur subtilissime, dein addendo essentiæ Benzoin, vel aquæ flor. Aurantiorum q. s. ad humectandum. Huic affinis videtur *Galactites* (eo quod ad lac mulierum generandum commendatur) *mith-marle*; cujus historiam diligentissime persecutus est *Gesnerus*: & *Marga Goslarica*, quam describit *Agricola*, de *Nat. fossil. lib. 2. cap. 10.*

IV. MARGA SAXATILIS INCARNATA, ex montibus *Bohemiciis* effossa. Quæ gleba est pinguis & lubrica ad contactum, colore incarnato, inæqualis, ponderosa, linguæ adhærens, chartam & digitos subhuteo tingens colore. Cum *Bolo Armena* facultatibus convenire perhibetur; eoque nomine ruptis, ex alto devolutis, Hæmorroicis, Dysentericis, pesteque infectis feliciter exhibetur.

V. TERRA MELITENSIS. in insula *Melita* reperta. Quæ ad serpentium morsus venenatos potissimum commendatur; eamque vim à *D. Panto* accepisse credunt incolæ cum is naufragus ad hanc insulam appulisset. Quocirca quidam *Lapidem S. Pauli* vocant. Est ad tactum aspera, colore albo ad cinereum vergente: ex eaque fiunt imagines, tabellæ, vasa, & alia ejus generis. Extat Charta quædam à *Petro Castello* lingua Italica exarata, & Romæ typis divulgata, quæ de virtutibus & terræ hujus, & aliorum lapidum, qui ibidem reperiuntur, diserte agit.

VI. TERRA CHIA, ex Insula *Chio* allata; qua Veteres utebantur ad rugas abstergendas, ad ambusta, aliaque quibus *Samia* prodesse traditur. Hodie exolevit, ejusque loco in usum venit *Bolus Alba* officinarum.

VII. BORINGHOLMICA, ex Insula *Dania Boringia*, vulgo *Boringholmo*, transportata. Cujus duo sunt genera. *Alerum* candicat, ad cinereum vergens: *Atherum* nigrius est. *Utrumque* ejusdem ferme substantiæ, gtebosa, inæqualis, pinguis; linguæ adhærens.

hærens. Viribus discrepare non videtur ab aliis Bolis. In *Scania* officinis ferrariis crucibula ex ea conficiunt, quæ ignis fervorem optime ferunt.

VIII. NORVVGICA, quæ priori candidior aliquanto, pinguior, & tactu lubrica.

IX. LEMNIA SIGILLATA ALBA, olim *Diana* sigillo; quod capraerat, signata, teste Galeno. Aliquantulum tenax & lubrica est, ob pinguedinem; adeo ut linguæ adhæreat, sine mordacitate. Si in aqua resolvatur, similis erit molli ceræ. Sanguinis ex utero profluvia, & fluxus muliebres compescit, venenis morbisque malignis resistit; rabidi canis morsui medetur, &c.

X. SIGILLATA GOLTBERGÆNSIS, sive Bolus candida *Lignicensis*, Chymicis *Axungia Lune*. Quæ effoditur ad *Goltbergam* in Ligies, & *Strigonium*. Diarrhœæ & Dysenteriae medetur, albumque Uteri fluorem peculiari vi curat.

XI. TERRA SÆ. HELENÆ [quia in *Selandia*, *Dania* provincia, ad fontem olim D. *Helene* sacrum, effoditur] quæ cinerea est, ad luteum inclinans, ex laminis quibusdam coagmentata; & cum terra sigillata vulgari magnam affinitatem viribus habet. Fufius describitur ab Ol. Wormio, *Musæi pag. 10.*

IN RUBRARUM numero sunt

I. TERRA LEMNIA RUBRA, quam tantopere contra venena celebrarunt Veteres. Descriptionem & vires, una cum præparandi ratione ab incolis usitata, optime prodidit *Dioscordes*, qui proinde consulendus.

II. BOLUS ORIENTALIS; communiter *Armena* [quia ex ea *Armenia* parte, quæ *Cappadocia* vicina est, advehi solet] quæ adeo nota est, ut descriptione hic non indigeat.

III. BOLUS TOCCAVERNSIS, in Transylvania ad *Tockaum* seu *Tockai* reperta, & à *Cratone* in usum medicum traducta. Notas *Boli Armena* veræ habet, & instar butyri in ore liquefcit. In Catarrhis & peste valde commendatur; adeo ut *Crato* eam præferat *Armena*, quæ *Imperatori* ex *Turtia* allata erat.

IV. SIGILLATA STRIGONIANA, quæ in orbiculosive pastillos efformata, drachmarum circiter duarum pondere, pro Insigni tenet montem tribus prominentiis distinctum; ita tamen ut una cæteris obtusior sit ac inferior, cui additur duarum clavium, decussatim se interfecantium, scutum. Infra montem hæc leguntur; TERRA SIGILLATA. Terræ Lemniæ, omnibusque aliis sigillatis multum præfertur à Medicis Germanis.

V. ERLACHIANA, ab Ol. Wormio, sub nomine terræ sigillatæ *Hepatici coloris*, descripta, *Musæi pag. 11.*

(Bb 2)

VI. LIVO-

VI. *LIVONICA Sigillata*, quæ in pastillos drachmam ponderantes pariter redacta, ab altera parte Insigne templi ostendit, duabus clavibus decussatim positis, inscriptione hac, *TERRA SIGILL. LIVONICA*: Altera facies nullo dotatur signo. Valde adstrictoria est; ideoque in Dysenteria, Diarrhoea, aliisque profluviiis, ubi adstrictione opus est, locum invenit.

Inter *LUTEAS* numerantur

I. *SILESIACA Sigillata*, quæ Chymicis *Axungia Solis* dicitur. Reperitur in Aurifodinis montis acuti, seu *D. Georgii*, ad *Strigonium*, oppidum Ducatus *Suidnicensis*, inter durissimas rupes: inde eruitur, & summa diligentia, Magistratus ordinatione, præparatur, & in formam orbiculorum, impresso urbis Sigillo, redigitur. Inventor ejus fuit *D. Job. Montanus*, Medicus magni nominis; qui de ea scriptum lectione dignum in lucem edidit. Magnopere laudatur etiam à *Cl. Sennerto*, lib. de *Peste*.

II. *LIGNICENSIS Sigillata lutea*, cui in pastillos efformatæ impressa est *Aquila expansa*, cum inscriptione ad circumferentiam, *TERRA SIGILLATA LIGNICENSIS*. Flaventine aurum exprimit: & earundem virium esse perhibetur cum *Strigoniana* supra memorata.

III. *ARABICA Sigillata sublutea*, quæ in trochiscos similiter efformata, ex Oriente affertur, inscriptionem habens Arabicam literis clare satis expressis trium ordinum. Linguae adhæret, fortiter adstringit, & vim resistendi malignitati eximiam obtinere dicitur.

SESSANA (ab urbe Italiæ, *Sinuessa*, ubi effoditur, sic dicta) quam *Cl. Thom. Bartholinus* describit in *Epist. Medic.* & ex qua figuli vasa efformant, quæ per totam Italiam distrahuntur, & ob granula aurea per ea dispersa commendantur.

Inter *PURPUREAS* præcipuum sibi locum vendicant

I. *TERRA ANTISCORBUTICA*, quæ reperitur prope *Bergas Norwegie*, & seu præsentaneum *Scorbuti* Alexipharmacum celebratur ab *Henr. Petreio* de *scorbuto* 38. Hujus drachmam unam in aqua aliqua antiscorbutica exhibent, ut sudorem provocent; quo aliquoties ita provocato, radicitus extirpari *Scorbutum* referunt.

II. *PURPURA*, cujus meminit *Ol. Wormius Mus.* pag. 15.

SALIVM

S A L I U M Classis.

PEr *Salem* intelligimus corpus minerale inanimatum, in igne saliens (unde nomen accepit) in aqua solubile, saporibus diversis præditum; & seminaria, in prima creatione, vi dotata, qua certis in locis conservatur & multiplicatur.

SIC:

Hujusmodi sunt

I. **SAL** Salt, quo communiter in cibis utimur, qui est vel

Naturalis, quem Natura sponte gignit, vel in terra, vel extra terram.

Qui reperitur in terra, vel *caditur in montibus*, ut in Carpatho, qua parte *Siberburgii* sæculique incolunt, *Saltzburgii*, & in Germania juxta *Ebasam* oppidum; vel *effoditur in campis*, ut in *Polonia*, secundo lapide à *Cracovia*, ad oppidum *Velscum*, & in Germania in *Staphurt*: vel *sub arenis* invenitur, ut juxta *Pelusium* in *Ægypto*, qui *Cyreniacus* dicitur. Extra terram reperitur in fonte, fluvio, lacu, mari.

Artificialis, qui concoquendo fit vel (1.) ex aquis marinis; (2.) ex falsis fontanis; (3.) ex falsis putealibus; (4.) ex sui generis lixivio, ut Chymici omnes:

Prioris fortis sunt

I. **SAL GEMMÆ** (in officinis sic dictus, eo quod Gemmæ instar pellucidus sit, & Chrysellum nitore & colore imitetur) qui in tesseras excisus ad nos adfertur ex *Polonia* maxima ex parte, quamvis in *Calabria*, alibi que etiam effodiatur. *Polonici* historiam scripsit *Cromerus* in descriptione *Poloniae lib. I.*

II. **SAL AMMONIACUS**, qui & *Armoniacus* dicitur (ab *ἀμμος*, *arena*; quod sub arenis in laminas concretus, in Africa Cyreniaco tractu effodiebatur olim: sed jam ad nos vehi desit.) *SAL Armoniac.* Is, quo hodie utimur, ex sulphuratis *Puteolanis* depromitur. Eo enim loci, ubi ignes subterranei flammæ evomere solent, in illorum hiatuum faucibus, veluti per sublimationem quandam, materia minus terrestri evaporante, hoc genus salis reperiri solet. Sed quia & ille non ab omnibus approbatur, nec quovis in loco haberi possit; *Artificialis* quidam excogitatus est, qui idem nomen obtinuit, & à Chymicis maxime expetitur. Fit autem ex quinque partibus Urinæ humanæ, parte una Salis communis, & parte dimidia Fuliginis lignorum, simul coctis ad consumptionem humanitatis

(C c)

miditatis: reliquum sublimatur, iterum solvitur, & coagulatur. Sal summe volatilis est & fixa omnia volatilia reddit.

Posterioris est

SAL ALKALI, ex herba, *Nab* Arabibus dicta. Affertur ex *Hispania*, ingentibus globis cinereis & nigrescentibus præditis. Vitrariis potissimum in usu est.

II. NITRUM (à *Nitria*, oppido Ægypti, ubi in magna copia olim conficiebatur) quibusdam *Sal petre* (quia in terra sui generis ad muros & petras, instar lanuginis, sponte efflorescere solet) *pitre* aut *Salt petre*. Quod vel sponte nascitur, vel arte conficitur.

Sponte nascentis Genera sunt

1. *Tincar*, Arabibus dictum, quod à terra effoditur durum, spissum & lapidi simillimum. In *Asia* tale provenire solet juxta *Philadelphiam* *Lydia*, & *Magnesiam* *Caria*.
2. *Aphronitrum* ἀφρονίτριν (Spuma Nitri) quod à speluncis petitur in quibus stitiarum modo dependet. Colligitur etiam ex his decidens adhuc & liquidum in terram, ac ibidem instar Spumæ concrevit.
3. *Aprium*, i.e. terræ mistum & sordidum, *Halmiraga* Græcis dictum, Impure *pitre*. Cujusmodi apud *Medos* invenitur, ubi per æstatem eo canescunt convalles, testante *Plinio*.
4. *Calastrium* (ab oppido *Calastra*, in Macedonia, quod in proximo sinu erat, è quo evehebatur olim) quod ex lacu quodam nitroso extrahitur, ubi circa canis exortum concrevit.
5. *Americanum*, quod in lacu *Mexicano* reperitur, teste *Nieverbergio*, *Hist. Nat. lib. 15. cap. 19*. Qui, ex *Franc. Hernando*, docet, Indis illud, quod Arabibus *Baarach*, nostratibus *Borax*, *Tequisqui* vocari; idque eos è terra verrere ait, crescente lacu, aut è muris antistru deradere, roseum ac candidum, leve, fistulosum & fragile, &c.

Factitii genera sunt

1. *Fel Vitri*, Germanis *Glass gall*, nobis *Sautter*, vitri spuma & recrementum. Nam cum vitri materia in igne liqueat, agit spumam, quæ de ea verriculo, tanquam recrementum de Argento, detrahatur, mox vero concreta in panes candidos cogitur. *Aurifices* ad argenti scobem, cum ex ea massam faciunt, addunt, ut citius in igne liqueat.

2. *Borax*

F O S S I L I A.

9

2. *Borax* (Arabicum est vocabulum) Græcis *Chryseolla*, i. e. Auri gluten, *Borace*. Quod olim ex fossili fiebat illo, quod Arabes *Tincar* vocabant. Conficitur hodie Venetiis, ex lapide quodam candido & fossili, quem Boracem erudum vocant, & fossile Nitrum esse quidam arbitrantur. Utuntur eo Aurifices ad scobem auri conglutinandum, quia fusionem adjuvat.
3. *Halinitrum*, quod ex terra, nitroso lamina imprægnata, apud nos conficitur, factum nempe ex eo lixivio, & percolato, perque ignis calorem exhalato, ut Sal-nitri remaneat, quod purificatum nostratibus, ~~Sal-nitrum~~ dicitur. Ad hoc conficiendum, eligere solent terram ovillo stercore imprægnatam.
4. *Sal-petre*, ~~Sal-petre~~, cujus confectio omnibus satis nota est.

De reliquis Nitri differentiis consulatur *Agricola de Mineralibus*.

III. ALUMEN, græce *Σπινθηρία* (à vehementi vi adstringente)
Alum. Quod est vel

Naturale, cujus species sunt

1. *Liquidum*, quod vel *purum* est, lactei coloris, limpidum, igneum quid expirans, quod à Græcis *φόσφορος* vocari solet: vel *Impurum*, equalidum, scabrum, sordibus inquinatum, *Ραδιόφορος* dictum.
2. *Concretum*, quod varias habet species. Nam (1.) vel in laminas *scissum* est, & eam ob rem Græce *γυμνός* dicitur: quod tamen non tam Alumen, quam lapidem Alumini consimilem esse autumant emunctiores; quoniam nec in aqua dissolvitur nec adstrictione pollet. (2.) Vel figillatim efflorescit instar canorum pilorum, atque idcirco *Τελχίς* vocatur, (3.) vel *plumosum* est; quod raro visitur legitimum. Vidisse tamen se testatur *Casalpini*, lib. 1. de *Metal. cap. 21*. (4.) vel *Rotundum*, quod *σπογγώδης* vocant, & varias habet differentias.

Arte elaboratum, cujusmodi sunt

1. *Rupescum*, seu *Rocha*, quod & *Glaciale* vocant, *Roch-Alum*. Hoc ex saxo fit, seu excisa rupe, atque redacta in calcem. Eam calcem in cumulis dispositam aspergunt aqua sæpe in die, donec in luti speciem tabescat: id quod paulo minus sesquimensis perficitur. Tum in lebetæ eam aqua conturbatum coquunt; coctum percanales in alveos derivant, quorum ad parietes concrevit Alumen inæquale, & grandibus frustis, pustulis fastigiatis; ea, exempta aqua, ferramenti decutiuntur. Quemadmodum advertit *Scalig. Exercit. 104. Sect. 6*.

(C c 2)

Hoc

Hoc Alumen maxime in usu est, & reliquorum fere omnium vices supplet.

2. *Scaiolum*, quod ex *Schisto* lapide combusto conficitur, *Scaia* nempe & *Scalia* crustam significat. & squamam, teste eodem *Scaligero*, *Exercit.* 104 *Seff.* 7.
3. *Saccharinum* (quia aliquid dulcoris sapit) quod ex *Alumine Rocha*, ovorum albumine, & aqua Rosarum conficitur. Locum habet inter Cosmetica, ad mulierum dealbationes, & cutim albam ac nitidam reddendam.
4. *Catinum*, ex planta *Kali*, seu *Soda* cinere confectum.
5. *Facin*, è vini facibus combustis elaboratum.

Usum magnum obtinuit *Alumen* apud *Aurifices*, qui eo purgant aurum, ut ejusdem bracteas æri inducant: *Infectores*, qui lanam & pannos in aquam aluminosam immergunt, ut colores facilius suscipiant & retineant: *Librarios*, qui chartam aquis, in quibus liquatum fuit alumen, immergunt, & dein resiccant, ne diffuat, utque atramenti scriptorii acrimoniam melius sustineat: *Medicos*, qui illa ad multa medicamenta, ulceribus aliisque affectibus cutaneis destinata, commodissime adhibent: & alios.

IV. *VITRIOLUM*, (à vitri nitore.) *Atramentum Sutorium* quod eo ad coria nigro colore tingenda utantur *Sutores*) *Chalcantbum* à Græcis (quia est æris quasi quædam efflorescentia) Arabibus *Alkaladsi*, Anglice *Uitriol*, aut *Copejas* (quasi Cuprum erosum.) Quod

Ratione *Nativitatis* est vel

1. *Nativum*, à Natura sponte, ex aqua Sorii, Melantheria & Chalcitide confectum. Hoc à nonnullis *Fossile* appellatur; quod ex tali constet humore, qui gelu quasi concrevit; idque vel (1.) in venis, fibris & commissuris saxorum; vel (2.) dum ex iisdem distillat guttatim, stiriarum modo dependet de eorum cameris, & denique deciduum ex stiriis in solum delapsum ita colligitur. Atque proinde hæc duo genera *Ξυλγακκος* Græci vocant, quod destillando concreverint.
2. *Facitium*, quod rursus duplex est, viz. (1.) *Alterum* proprie *πυλόν* Græcis dictum, Latinis, *Concretum*; quod cum è cuniculis suis effertur, & in quadratas piscinas effunditur, frigore aut calore solis congelatur: (2.) *Alterum* *ἰσθὶν*, *Custum*; decoquitur enim aqua atramentosa in ahenis quadratis, modo quem explicat *Matthiæ* in lib. 5. *Dioscorid.* cap. 74.

Ratione

Ratione Coloris est vel

1. *Album*, *Λευκόν* (quia color ejus similis est violæ albæ) quod maxime ad naturam salis vulgaris accedit, candidum & transparentes est; unde nostratibus *Alba Copras* dicitur. Hoc præ reliquis usum habet in Collyriis.
2. *Viride*, *Γεννίον*; quod maxime in usu fullonibus & tinctoribus est, ex eoque vulgo spiritus & sales præparant.
3. *Caruleum*, *Μένιον* aut *Vitriol*. Quod cæteris ad medicamenta præfertur, & commendatur ad Scabiem & Ulcera ex lue Venerea contracta. Ex eo etiam confici potest Pulvis ille Sympatheticus, quem Mirones tantopere celebrant.

Ratione Locī, unde defertur, est vel *Romanum*, vel *Ungaricum*, vel *Norwegicum*, vel *Scanicum*, vel *Anglicum*.

Huc pertinent & reliqua *Atramentorum* genera, viz.

1. *Chalcitis*, quæ rubra est, ænei coloris, semper nativa, dura, glebosa, speciem æris præ se ferens, cum longis & resplendentibus fibris. Sed vix jam haberi potest: ideoque in *Tberiaca* compositione, ejus loco substituitur Vitriolum ad rubedinem calcinatum, quod *Colchothar* vocant.
2. *Misy*, quod est affinis *Chalcitidi* viribus & uisione, sed specie auro simile, durum, & stellæ modo splendens.
3. *Melantheria*, quæ modo lanugini, modo fallugini similis est, lutei quoque coloris. Reperitur ad ostia fodinarum, ex quibus æs eruitur, modo adit *Pyrites*. Nigredinem non gignit madefacta, nisi ferreat.
4. *Sory*, quod à *Melantheria* differt tantum odore gravi & nauseoso, ut quasi fulmineum quid expiret: præterea porosum est & fragile. Quatuor hæc species sæpe simul inveniuntur, ubi conficitur Vitriolum; sed cognitu non ita faciles.

S U L P H U R E O R U M Classis.

S Alinis corporibus proxime succedunt Pingua, *Sulphurea* scilicet & *Bituminosa*; quæ ignem facillime concipiunt, & oleo solvantur ac miscentur. Cujusmodi sunt *Sulphur*, *Arsenicum*, *Bitumen*, &c.

I. Per **S U L P H U R** (quasi *δύον πυρ*) quod Græci tamen *Σείον* vocant (tanquam rem maxime *sacram* ut quo ad expiationes omnes

(D d)

omnes uterentur, teste *Aristotele in Probl. Sect. 23.*) & nos *Brimstone*; succum intelligimus mineralem concretum, qui parte inflammabili, gravem naribusque infestum odorem expirante; & terra crassa, fixa, succum Chalcantofum admistum habente, constat. Hoc duplex est, viz.

1. *Nativum*, seu *Vivum*, Græcis *ἀπύρον*, seu ignem non expertum, nobis *Sulphur vitæ* dictum. Quod rursum triplex est; *Impurum*, quale ex *Islandia* crudum adfertur, & demum depuratur: *Purum*, ex *Goslaria* fodinis: & *Fixum* ex monte *Vesuvio*.
2. *Factitium*, *πυρροῦ*, sive igne depuratum; quod variis modis fieri solet. Quibusdam in locis ex aquis decoquitur; ut ad *Budam Pannoniæ*: alibi ex effossa gleba & in vasis cocta perficitur igni; ut in multis *Italiæ* locis, *Senensi*, *Puteolano* & *Volaterrano* tractu.

Hujus generis sunt

1. *Virgineum* (quia ejus suffitu utuntur *Virgines*, ad capillos rufandos) *Virgin Sulphur*: quod cæteris pallidius est, & figura panis coagulatum.
 2. *Nigrum*, *Caballinum* officinis dictum (quia equorum scabiem eo curare solent Veterinarii) *Boyle Brimstone*: quod nigrum est, ex squamma ferri & sulphure impuro simul mistis, & in urceos transfusis, confectum. Exterior sulphure luteo vulgari obductum est.
 3. *Cinabrium*, ex Sulphure cum Hydrargyro sublimato elaboratum, & apud nos *Artificial Cinnabar* dictum.
 4. *Flavum*, ignem expertum, *Common Brimstone*; quod figura treti est, eo quod per fistulas arundinaceas sit percolatum.
- Usus ejus varii sunt. *Fullores* vestes lixivio ablutas sulphure suffire solent; & *Insectores* lanas, ut candorem & mollitiem eis concilient. Ingreditur quoque compositionem *pulveris tormentarii*. In *Peste* insuper maxime celebratur: & varia ex eo conficiuntur medicamenta *Chymici*.

II. ARSENICUM, *ἀρσενικόν*, *Arsenick*. Cujus species sunt.

1. *Arsenicum Croceum*, *Auripigmentum* (ab aureo colore) dictum, *Orpiment*, aut *pellota Arsenick*. Quod succo minerali sulphureo constat, & conjunctum habet Lithargyrum paucum & spiritum salis. Medici ad *Philothra*, seu Medicamenta pilos auferentia, præcipue utuntur. Turcis *Reusma* seu rectius *Chirsm* vocatur.

2. *Arseni-*

2. *Arsenicum Album*, seu *Risagallum*, quibusdam *Realgar*; ~~White~~ *Arsenick* aut *Katsbane* (quia ad glires, forices, mures, &c. necandos adhibetur) quod factitium est, ex Auripigmento toties cum sale sublimato, donec candidum reddatur.
3. *Arsenicum Rubrum*, *Sandaracha* vulgo dictum, ~~Red~~ *Arsenick* aut *Sandarack*. Quod ab Auripigmento solo colore differre videtur; quia vel saturato colore rubro est, instar Cinnabaris; vel minus rufum & subluteum. Quod vulgo venale prostat, *factitium* est, ex *Auripigmento* in ollam, cujus os obturatum, coniecto, & quinque horis in furno cocto; tum enim Sandarachæ colorem acquirit. *Medicæ* & *Tornatores* ejus usum sibi vendicarunt ad pingendum.

III. BITUMEN (ex *Martinii* sententia, à *πίτλα*, *pix*, unde *πίττω*, à quo *πίττωμα* & converso *π* in *β*, *Bitumen*) *ἀσφαλτος*. Græcis, Germanis *erpeth*, i.e. *pix* terrestris; *Stone-Pitch*: est corpus fossile, simile, pingue & inflammabile; cum quo ubi sales concurrunt aliæque metallicæ concretiones, in varias species dispescitur. Generatur in cavernis terræ, & inde vel in mare effunditur, ibidemque ejicitur; vel è terra solum, vel cum aquis mistum effluit aut effoditur.

Est autem vel *Liquidum*, vel *Concretum*.

Prioris generis sunt

1. *Petroleum* (quasi *petræ oleum*, quod è petris validissimo odore extillet) *Rock-oil*, aut *Petroleum*. Subtile est oleum, varii coloris: vel enim candidum, vel flavum, vel rubrum, vel nigrum est. Inter hæc vero candidum præstantius, nigrum vilius. In *Italia* in agro *Mutinesi* reperitur, & è petris extillat candidum & rufum, quod vetustate crassescit. In *Sicilia* fontibus innatat, & oleum *Siculum* vocatur. In *Scotia* item nostra, duobus milliaribus ab *Edingburgo*, fons scaturit, cui olei nigri guttæ innatant tota superficie. De aliis locis ubi reperiatur, consule *Bernhard. Varenium. Geogr. General. lib. 1. cap. 17. prop. 9.* Ad lucernarum lumina, olei communis instar, utuntur, & ad scabiem jumentorum. In Paralyfi & nervolarum partium doloribus frigidis summopere laudatur.

2. *Naptha*, (olim quibusdam *Pharmacum Medæ* dicta, utpote qua coronam & peplum Creontis filix munxerit, atque hac arte combusserit) *Napht*. Bitumen subtilissimum videtur, vel potius Bituminis liquidi spiritus, ex Babylonico Bitumine potissimum extractus: cui tanta substantiæ subtilitas, ut ex intervallo distantij ignem ad se quasi rapiat, ac Solis calore accendatur. In-

(D d 2)

fignem

signem vim habet penetrandi & exsiccandi; eoque nomine, ad humores frigidos discutiendos, Colicis, Lethargicis, Apoplecticis & Paralyticis inungi meretur.

3. *Bitumen Judaeum*, quod in lacu *Judea* nascitur, adeo lentum & sequax, ut vix avelli queat.

4. *Pisaspphaltum* (ἀ πῖσα pix, & ἀσφαλτος. *Bitumen*; nam picem bitumini admistam redolet, & nonnunquam ex bitumine liquido impuriore & pice componitur) quod in *Apollonio Epyri* invenitur, quia fluminis impetu ex montibus devolvitur *Ceraunias*, & in glebas cogitur.

5. *Maltha*, quæ non merum Bitumen, sed ejus Colamentum limo argilloso mistum esse videtur. Cum quid attingit solidi, adhæret. Quocirca in jungendis murorum lapidibus *Calcis* usum præstat: & *Vitruvius lib. 1. cap. 5.* ad Babylonis muros extruendos adhibitam fuisse docet. Verum *Casalpianus lib. 1. de Metal.* Maltham tanquam artificiosum & mistum quid describit. Quod si verum sit, duplex erit Malthæ genus; *Naturale* unum; alterum *Artificiale*, ex Calce viva in vino extincta, mox confusa cum adipe suillo & ficu, confectum.

6. *Momia*, *Opuntia*; quæ similiter duplex est; *Naturalis*, ex pice & bitumine constans, quæ & *Pisaspphaltos* dicitur: & *Artificialis*, ex Aloë, Myrrha, aliisque aromatibus, cum sanie Cadaverum quæ eis condiebantur, mistis confecta. *Medicis* in usu est, ad frigidos corporis affectus, tam in potu, quam extra: sed præcipue ad sanguinem sistendum, & fracta membra consolidanda.

Posteriores sunt

1. *Lapis Ampelitis* à Galeno; ab aliis rei rusticæ scriptoribus *Terra Ampelitis* (quod vermes vitium oculos erodentes, vivus Græcis dictos, enegit) Theophrasto *Carbores* (quod eorum colorem habeat, & vices gerat) dictus; nobis, ni fallor, *Bennet-Coal*, & *Ballast-St.*
2. *Lapis Gagater* (à Lyciæ fluvio *Gaga*, ubi abundat) Straboni *Gangitis*; Plinio *Gemma Samothracia*, Nicandro *Thracium Lapis*, quibusdam *Obsidianus Lapis*, nobis *St.* Ex quo varia Utensilia conficiantur.
3. *Lithanthrax*, seu *Carbo fossilis*, *Stone-Coal*, aut *Pit-Coal*. Qualem multis in Angliæ locis uberrime habemus.
4. *Pix Fossilis*, ex Insula *Barbados*, ad naves oblinendas utilis; *Stone-Pitch of the Barbados*.
5. *Succinum* (quod ex *jucto* coagulari credatur) Græcis *ἄμικτον*; Arabibus *Carabe*; quibusdam *Ambra Citrina*, nobis *Amber*. Quod non ex alio principio, quam Bitumine, ortum suum trahere

trahere vel exinde patet; quod quibusdam in locis Germaniæ, Italiæ, Galliæ, è terræ mineris eruatur, & frustra sint inventa, quæ foris succinum coagulatum exhibuerint, intus para Naphtha seu Petroleo referta extiterint. Quin & varia Mineralia, Chalcitis, Melantheria, aliaque ejus generis illi adnata extitisse constat. Idem comprobatur Chymica ejus Analysis. Reperitur apud nos ad *Norfolciæ* littus, ubi ego frustulum uncialis amplitudinis inveni in *Aselli Majoris* piscis ventriculo, dum eum cultro anatomico diffecarem. Id quod littoris illius accolæ haud raro contingere affirmabant. Hujus species sunt (1.) *Flavum*, *Pellotæ Ambre*; (2.) *Opacum*, & variis coloribus ignobilioribus resperitum, *Dark-colour'd*, & *Spotted Ambre*; (3.) *Album*, non pellucidum, *White Ambre*; (4.) *Griseum*, *Ambra Grisea* vulgo, *Ambre-Grise*. De cujus origine & generatione variæ sunt Auctorum Sententiæ. Probabilior vero illa, quæ statuit, ut Succinum, ex fontibus Bituminis manare, & in summo mari, aëri expositum coagulari & densari. Nam in India fontes esse, ex quibus Oleum & Balsamum nobilissimum fluat & colligatur, testantur historiæ: Ex hisce per venas subterraneas si quid in mare fluat, condensatur mox, & in *Ambram Griseam* concrevit. Uti disertè testatur Author *Geographiæ Arabicæ*, citatus in notis ad *Garcium*.

Hujus tria statuuntur genera. (1.) *Selachitum*, ex *Zeylan* insula Indiæ, rubrum & pingue, quod cæteris præfertur. (2.) *Alterum* ex *Seebæ*, loco maritimo *Arabie Felicis*, subalbidum, colore ovi *Struthiocameli*; quod ut plurimum est, quod ad nos adfertur, griseum & varium maculis nigricantibus. (3.) *Tertium* deterrimum, quod nigricat, quale esse voluit quod pisces devorant. Apud nos etiam *Ambra Grisea* nobilissima nonnunquam ad littora occidentalia Angliæ appellit, ventis æstuque maris ejecta.

LAPIDUM minus pretiosorum Majorum & Durorum Classis.

A Prima Fossiliū genere, mediis nempe Mineralibus, ad secundum, quod LAPIDISUS dicatum est, transitum nunc faciamus.

Lapidem nomine intelligimus Corpora fossilia, dura, indurabilia,
(Ee) nec

nec in aqua oleove solubilia, ex succo lapidescente, in quo spiritus lapidificus, exorta.

Dividuntur commodissime, ὅσον διδασκαλίας χάριν, in (1.) *Minus pretiosos*, & (2.) *Pretiosos* : & priores rursus in (1.) *Majores*, eosque vel *duros*, vel *molles* ; & (2.) *Minores*. Posteriores autem pariter in *Majores* & *Minores*. Qui omnes ordine expendendi sunt.

In *Majorum* & *Durorum* Classe constituuntur

I. **SAXUM**, ex quo integri quandoque constant montes & rupes ; *Rock-stone*, Danis *een Kampsteen* ; forsan : quod minoribus istiusmodi in bellis usi sint Veteres, eaque fundis & aliis machinis in hostes jaculati sint, ut apud *Virgil. 2. Æneid.*

Jamque faces & saxa volant, furor arma ministrat.

II. **SAXUM ARENARIUM**, *Sand-stone*, (quia asperum & veluti ex arenis compositum) & *Free-stone*, ubi durius est & ædificiis extruendis utile :

III. **SAXUM VIOLACEUM**, quod odore *Violas* refert. Cujus mentionem primus fecit *Agricola, de Nat. Fossil. lib. 5. cap. 17.* & deinde *Ol. Wormius, Musæi pag. 37.*

IV. **SAXUM SUILLUM** *Norwægis*, (apud quos Insula quædam extat, quæ integris cautibus ejus generis scatet) *Suill-stone* dictum ; quia foetidum exhalat odorem, & talem quidem, qualem spirare fœces solent. Nigrum est, fragile, striatum, in se Pyritem argenteum & Talcum habens : unde micas quasdam splendentes de se fundit. Usus habere aiunt, quod in pulverem redactum, & suis quocunque morbo laborantibus exhibitum proficit.

V. **SAXUM FISSILE**, sibi *Crustosum* (quod in crustas findatur, stratis ac tectis utile) *Slat*, aut *Eple-stone*. Cujus non una est differentia. Apud nos tantæ amplitudinis reperiuntur, ut mensas ex eis integras fabricent, aliasque tabulas deletiles. Cæteris vero præfertur *Islebianum*, quod nigrum est, & in comitatu *Mansfeldie Islebæ* effoditur. Horsum haud incongrue retuleris *Lapidem Fissilem Hibernicum*, *Irish-Slate* nominatum.

VI. **SAXUM LIMOSUM** (quia facile ab humido in limum solvitur) *Mud-stone*, quali Agricolaæ nostri nonnullis in locis utuntur ad agros fecundandos, alii vero in *Corumbia* pro tiguriosis extruendis. Hoc tamen potius ad Margas, quam saxa referri posse videtur.

VII. **SILIX**, sibi *Flint-stone*. Cujus varia sunt genera.

Ex

Ex omnibus vero præcipui censentur

1. *Pyrimachus*, qui colore albo & perspicuo gemmas quandoque æmulatur, & liquabilis est. Unde Metallarii metallis fufis eum superinjiciunt, ut iis supernatet, ne nimium metalli in auras evolet. Vitrarii vero ex iis vitra conficiunt; & Chymici Pseudadamantes aliosque factitios lapides. Nostrates ~~Pebles~~ *Pebles* vocant.
2. *Ludus Paracelsi*, quem *Helmontius* tantopere ad calculos è corpore humano expellendos commendat; quemque Nos etiam in lib. nostro de *Lithiasi* clare descripsimus.

VIII. Lapis S C H I S T O S, qui durissimus ac solidissimus est; ideoque igne calefactus, calorem diu retinet. Quamobrem, apud *Cornubienses* nostros, the ~~Warming-stone~~ *Warming-stone* audit.

IX. P Y R I T E S, *Fire-stone* (quia ex ejus quadam specie ignis copiose excutitur) quem proprie *Pyrimachum* dictum putant nonnulli, quod igni repugnet. Nam in arduos coniectus fornaces fluit: & ubi semel defluerit in catinum, mox rursus con- crescit & durefcit. Reperitur ut plurimum in fodinis Metallicis, Metallis quandoque permixtus, quandoque iis destitutus: & variis figuris lusum Naturæ ostentans.

X. Lapidēs M O L A R E S, *Mill-stones*; ab usu nomine mutuato, quod iis frumenta moliantur. Qui suas etiam habent species.

XI. C O S, qui lapis durior est, ferramentis acuendis aptus; unde ~~Whet-stone~~ *Whet-stone* appellatur. Estque vel (1.) *Olearius*, a ~~Pone~~ *Pone*; oleo enim illinitur, ut aciem trahat; vel (2.) *Aquaticus*, (quia in orbem communiter redigi solet, ut motu circulari actus, vel ex alto cadentem, vel in subjecto alvo stagnantem aquam excipiat, quo admotum ferrum commodius terere possit.) ~~Grind-stone~~ *Grind-stone* aut ~~Grind-stone~~ *Grind-stone*.

XII. M A R M O R, Græcis *Μάρμαρος* (*Μαρμαράριον*, à *splendore*. Atque hæc causa est, cur & *mari*, ob nitorem aquæ, *marmoris* nomen tribuunt Poætæ; ut 1. *Georg.*

—*insidum remis impellere Marmor.*—

Paria, sive *Paria-stone*. Cujus variae sunt differentiæ, à variis coloribus desumptæ. Dantur nempe Marmora alba, nigra, viridia, cinerea, rubra, variegata.

Ex *Albis* sunt

1. *Parium* (ab Insula *Pars*, ubi olim copiose effodiebatur)
(Ec 2.) Vete-

Veteribus *Lychnites* dictum (quod ad lucernas in cuniculis caderetur) *White*, aut *Parian Marble*. Cujus duo genera statuunt: *Unum* translucens, ac *Phengites* proinde dictum, *φῆγος* enim apud Græcos significat *illumino*. Hoc lapide construxerat Nero ædem Fortunæ, quam aurea domo complexus est: quare etiam foribus apertis interdiu claritas diurna erat haud alio quam speculari modo, tanquam inclusa luce, non transmissa. *Domitianus* item porticum in quibus spatium consueverat, parietes Phengite lapide distinxit: e cuius splendore per imagines quicquid à tergo fieret, provideret. Ut *Suet. Tranq. in ejus vita*. Alterum non translucens, *Alabastrites* nominatum. A vulgari Alabaastro duritie differt & splendore. Foditur in *Italia*, in agro *Lucensi*, ejus genus quoddam, quod ab oppido *Caraciense* nomen obtinuit.

2. *Alabastrum*, nobis *Alabastr*; quod, etsi inter molles & raros lapides locum habeat, huc tamen quidam referunt, externæ figuræ & polituræ respectu. Hujus generis vel integras rupes in *Anglia* habemus, in agro *Glocestrioni* ad littus fluminis *Sabrina*; ex quo statuas Sepulchrales exsculpunt.

Ex Nigris sunt

1. *Basaltes* (à voce Æthiopica, *Basal*, quæ *ferrum* significat; eo quod Marmoris genus sit durissimum, ferrei coloris, limisque resistens) nonnullis *Basanum* (à *Βασανίζω*, id est, diligenter *examine*; quia eo Argentum & Aurum examinatur & probatur, non minus ac Lapis Lydio) *the hardest black marble*. Variis in locis Germaniæ hodie reperitur.

2. *Obsidianum*, seu *Numidianum*; Belgis, unde ad nos effertur, *Leetsteen*; Gallis *Pierre de Tuche*; Germanis *Wasserstein*; nostratibus *Trachstone*; quia Auro & Argento examinando potissimum inservit. Ex hoc Marmore grandia quadrata conficiuntur, quibus Magnatum demortuorum Loculi reguntur: Tabulae item Epitaphiis aptæ. Politum enim instar speculi resplendet, & nigerrimum est.

Ex Viridibus

Olim celebrabantur *Lacedæmonium*, *Augustum*, *Tiberium* (quorum duo posteriora sic dicta videntur, quod eorum principatu primum inventa) hodie vero frequens est, *Ophites* (quod Serpentis formas & maculas distinctas exhibeat) *Serpentine Marble*. Varia ex eo conficiunt, Pocula, Cochlearia, Mortaria, Laminas incurvas (*Spleen-stones* vulgo vocatas) aliaque ejus generis. Quandoque mollis est hic lapis, ut liquores imbibat, quod ut impedi-

impediatur, oleo nucis Moschatæ inungunt vasa ex eo fabricata. Commendatur ad multa, quæ Scheda typis mandata enumerare solent Venditores circumforanei: sed omnibus, imo aliquibus an fides adhibenda sit, est cur valde dubitemus.

Ex *Variegatis* sunt

1. *Cinereum Seravitianum* (quod *Seravitia* aliisque in locis Italæ reperiatur) quod durius est, & vere Marmor, & maculis cinereis insigne. Ex hoc globi conficiuntur parvi, ut manibus detineantur ab iis, qui febre ardente laborant. His enim recreari videntur, dum refrigerando dolorem mitigant & ardorem.

2. *Subviridis* ille *Lapis*, Italis *Verdella* dictus; eo enim utuntur Lapidis Lydii loco, ad aurum & metalla probanda. Quidam *Thyitem* Veterum esse arbitrantur. Nostrates *Greenish Marble* nominant.

3. *Garatronium Imperati*, quod pulcherrimum est, literis quasi Arabicis à Natura sibi insculptis superbiens, colore aureo in corpore purpureo. Concretum videtur è terra purpurea & putaminibus aureis, superveniente succo aut spiritu lapidifico. In *Asia* inter ornamenta corporis gestatur, & ex eo manubria cultorum & gladiatorum conficiunt. Lege plura apud *Ferrand Imperat. Hist. Natural. lib. 24. cap. 25.*

4. *Florentinum variegatum*; quod per se maxima ex parte cinereum licet sit, maculis tamen fuscis, & lincis obscurioribus hinc inde ductis & discurrentibus, jam turres, jam ædes, montes, flumina, ac integras civitates exhibet. Nobis *Florentine*, aut *Lamochip Marble* dicitur. Variæ hujus Tabulæ in *R. & O. I. & S. SOCIETATIS* Cimeliarchio asservantur, in quibus prærupta turrium rudimenta, urbis inæqualiter sitæ domus & ædificia, aliaque id genus phænomena, discretis coloribus & artificiosè delineata, à Natura ludente, sine omni artis pictoriæ ministerio, representantur.

5. *Embuscatum*, ex monte *SINAI* Hierosolymitano depromptum; quod albicans est, ad flavedinem tendens; & quocunque modo secetur aut dividatur, in eo arbuta & frutices, colore nigricante, subtiliter à Natura depicti apparent. Si supra ignem ponatur, brevi evanescit pictura, & nil nisi nudus remanet lapis, sui coloris, adeo durus tamen, ut calcinari nequeat, sed fortissimo igne instar vitri fundatur. Ego Anglice *Boscage*, sive *Bushy Marble of Hierusalem* nominarem. Hujus etiam generis Tabula *Embuscata* visitur inter Rariora Naturæ in dictæ Soc. *R. & O.* musæo collecta. Aliam elegantissimam diserte describit *Ol. Wormius in Musæi sui pag. 45.*

(F f)

Ad

Ad Flava refertur

Phegites, quod venis flavis & transparentibus micat. Tale illud est, quod *Rome* in templo *S. Mariae* in porticu spectatur: ubi columna ex eo fabricata visitur dimidiata, colore flavo, parietis rimam claudens, & externam lucem solari fulgore intro-mittens; ita ut, sole radios suos in columnam jaculante, ardere videatur: De quo multa fabulantur. Germani, apud quos etiam Flava reperiuntur Marmora, vocant *Selber Spat*.

Inter Rubra denique principatum obtinet

Porphyrites, Italis *Porfido*; Anglice *Porphyte*; quod durum admodum est, & splendidum. Ex eo fiunt non solum Columnæ, sed & Mortaria, & Crustæ ad Colores & Lapidés pretiosos lævigandos; attritione enim nihil à se remittit. Ex hoc marmoris genere constant *Obelisci*, qui *Rome* visuntur, literis Hieroglyphicis insignes, ad templum *Job. Lateranensis*, & in *Vaticano*. De quibus consulatur *Plinius lib. 36. cap. 9.* Ubi expresse modum, quo ex *Ægypto* eo delati sunt, describit.

L A P I D U M Moliorum Classis.

Inter Lapidés minus Pretiosos MOLIORES occurrunt.

I. Saxum CALCARIUM, unde Calx conficitur, *Itine-tum*. Cujus copia ingens passim in tota Anglia reperitur: Optimum vero effoditur prope viculum *Barrow* dictum, in agro *Leicestriensi*.

II. GYPSUM Germanis *Spat*; Italis *Gesso*; Gallis *du plâtre*, Anglice *Plaster-stone*. Lapis est albus, mollis Alabastri instar, qui cum leviter uritur, ex eo fit Calx ista, quæ Gypsum vocatur, *Plaster of Paris*. Usus ejus est ad statuas ingentes & lævissimas, ad domorum areas & concamerationes. Cum polline lapidum duriorum, pulvere plumbi & lacte, in veros lapides transit; & si colores adjiciantur, Marmor pondere, nitore, & colore imitatur quam maxime.

III. Lapis BONONIENSIS, à quibusdam *Spongia Solis*, ab aliis *Spongia Luna*, ab aliis *Lucifer*, *Casciarolanus* lapis, *Phosphorus* Kircheri, *the light-Carrier*; quod singulari proprietate polleat lucem imbibendi & retinendi. Si enim Soli aut igneæ flammæ opponatur, sic illustratur, ut inde translatus ad locum tenebricosum, conceptam recens lucem diutule retineat sibi infixam; adeo

adeo ut in tenebris instar carbonis ad semihorulæ spatium ardeat; idque toties, quoties ita Soli aut Lumini fuerit admotus. Verum hanc facultatem mirabilem non nisi præparatus obtinet. Modum autem eum præparandi docet *Kircherus, in art. magn. Lucis & Umbræ, lib. 3. de Magn. pag. 505. & Ol. Wormius Mus. pag. 46.*

IV. PUMEX, Græcis *νίονες* (quasi à vermiculis erosus) *Pumice-stone.* Lapis est erosus spongiosusque, exiguis cavernulis refertus; colore ut plurimum cinereo, quandoque candido, nonnunquam nigro, qualem Islandiæ *Hecla* evomit. Huc pertinet *Pumex Vulcani Syracusani*, quem describit *Cl. Thom. Bartholinus in Epist. Medicin.*

V. FLUENTIS ÆTNÆ COAGULUM, massa nimirum quadam coagulata ex Lapidibus, Calce, & Sulphure; quæ simul calore flagrantis Ætnæ liquefacta instar rivi igniti ex Ætna defluunt, sed frigore tandem ambientis densata, massam hanc præbent.

VI. TOPHUS, *πόρος*, *Porus*; qui est asper, scaber, porosus (unde nomen) seu foraminulis plenus; ideoque levis, & facile in arenam attritu solubilis. Reperitur variis in locis *Germaniæ*: copiose vero prope *Coburgum* in ditione *Mansfeldica*: & in *Anglia* ubivis pene occurrit. Propter levitatem commodissimus est ad replendas parietum collabentium rimas, cum præ levitate non premat, & glutinet facile extrema. Huic cognata sunt

VII. ALCIONIA (sic dicta ab avibus, quæ *Halcyones* vocantur; quia ex iis mari innatantibus nidos fingunt & construunt.) Quæ etiam lapideam habent naturam, sed ortum tamen ex mari; cujus aquæ cum salæ sint, ex ejus spuma, cum tenuissimis sordibus permixta, accedente succo lapidescente, seu sale massam coagulante, in varias figuras concrescunt. Nostro idiomate vocari possunt *Halcyon-stones*. Horum plura ponuntur genera ab *Ol. Wormio in Musei sui pag. 48, & 49.* luculenter descripta.

VIII. ASSIUS vel ASSIUS *Lapis*, quem etiam *Sarcophagum* vocant (eo quod carnes humanas consumat, nudatis ossibus) quem Veteres ad Pumices & Poros referunt. Hic consulendi veniunt *Plinius lib. 36. cap. 17. & Ol. Wormius in Museo.* Unde lineam unam & alteram interim exscribam. “Ego in peregrinatione mea Gallica, inquit, in templo D. Hilario sacro, parietis austrino infixam vidi tumbam lapideam, coloris cinerei, cujus substantia laxea aut marmorea erat, tantæ capacitatis, ut cadaver humanum integrum capere potuerit. Hic lapis pro *Sarcophago* vel *Assio* monstratur accedentibus. Verum porosus non est, sed durus & solidus, ut ex frustulo, quod ex eo excussi, videre licet. Vestibus affricatum ut incalescat, foetorem cadaverosum exspirat. Ferunt, cadavera ei indita, viginti quatuor

(F f 2)

“tuor horis prorsus absumi, relictis solum ossibus. An ita se res habeat, ignoro.

IX. *STALACTITES*, Norwegis *Bergarab*, nobis *Dropstone*. Generatur quippe ex aquis Nitro, vel succo petrifico copiose imprægnatis, & materiam terrestrem subtilem secum convehentibus. Cum enim aqua per terræ canales effluit, aut ex alto decedit, aut lateribus alveorum agglutinatur; horum ratione varias, dum concrescit, figuras acquirit. Ex alto destillans extremitati canalis, pyramidis forma quandoque adhæret; & eodem modo, eademque forma induratur, qua è canalibus defluens humor frigore hyemali congelari solet. Hinc tanta inter hujusmodi lapides figurarum obtigit varietas: quam observari licet in Fonte petrifico apud nos percelebri, *Analborough*, in agro *Eboracensi* vicino, & *the Dropping Well* dicto; in quem quicquid ligni immittitur, lapideo cortice brevi obduci, & lapidescere observatum est; & in quo diversimode figuratas concreciones videas. In hunc fontem non è terræ venis aquæ nitrosæ scaturiunt; sed ex impendentibus rupibus guttatim destillant.

X. *STALAGMITES*, qui ejusdem naturæ & substantiæ esse videtur cum *Stalactite*; sed figura saltem differt, quod semper globose concrescat; unde distinctionis gratia, *Round Dropstone* nominare libuit. Interdum contingit, ut quam plurimi horum lapillorum simul concrecant; & tunc lapis integer massam ovorum piscium majorum exprimens, Anglice idcirco *Spatumstone* appellatur: cujusmodi aggeriei iconem exhibet *Ol. Wormius Mus. pag. 52.*

XI. *AMMONITES*, seu *Hammites* (quia ex arenis majoribus coagmentatus) qui ovis minorum piscium similis etiam apparet, & *Letter Spatumstone* nominatur.

XII. *OSTEOCOLLA*, aliis *Ossifragus*, *Osteites*, *Ammosteus*, *Osteolithus*, *Holosteus*, *Stelochites*, Germanis *Weinbruch*, *Bruchstein*, *Weinwol*; nobis *Eleuthero-stone*; quia summopere ad fracturas ossium conglutinandas conducere creditur. Lapis est mollis, albo & cinereo colore, figuram ossis exhibens, concavus, quandoque medullam habens friabilem, linguæ adhærentem, & facile in liquore solubilem; quandoque vero nullam. Crescit per arenam forma Corallii, interdum brachii crassitie. Cum primum è terra erumpit, friabilis est; paulatim vero magis indurefcit. Videtur Margæ quædam species esse, quæ per terræ meatus discurrens, in talem figuram concrescit & induratur. Hujusmodi nos in mineris *Cambrorobritannicis* varios habemus: quorum exempla videantur in inclytiss. Soc. R. & C. Cimeliarchio, ex Nobiliss. juxta ac Eruditiss. D. *Roberti Moray*, Equitis Aurati, & ejusdem Societatis magni ornamenti, munere eo allata. De viribus Osteocollæ videatur *Thom.*

Thom. Erastus, qui de eo argumento iustum tractatum conscripsit. Interea temporis animadvertas velim; quod in officinis plerisque pro Osteocolla vera, *Stalactitis* quandam speciem divendant, albam, porosam, levem, mollem, facile in liquore solubilem, sapore subsalfo; quæ tamen ab Osteocolla virtute multum discrepat.

XIII. LAPIS SPONGIÆ, quibusdam Lapis *Cappadox*, Plinio *Cystolythos*, the *Sponge-stone*. Qui substantia est friabili, colore albicante, succum lacteum de se præbente. Laudatur à *Dioscoride* ad vesicæ calculum frangendum: ex vino aliive appropriatis propinatus.

XIV. CORNU FOSSILE, Gesnero *Ceratites*, Clusio *Ebur Fossile*, Cæsalpino *Lapis Arabicus*, quibusdam *Dens Elephanti petrefactus*, aliis *Lithomarga alba*. Est substantia lapidosa, colore lævove, & forma quandoque cornu referens; quandoque durius, quandoque mollius; cortice exteriori duro, flavescente, nigro aut subcinereo; medulla molli, friabili, absque poris compacta, adstringente, exsiccante, linguæ firmiter adhærente, odore grato. Invenitur tam in *Italia*, quam variis *Germaniæ* locis, in *Moravia*, *Silesia*, *Saxonia*. Materia & modus Generationis traditur ab *Anselmo Boetio à Bott*, in *lib. de Mineral*. Commendatur ad omnes morbos malignos.

XV. AMIANTHUS (ab *ασπντην*, & *μαίρω*, *palluo*; quod in ignem conjectus non inquinetur, sed nitidior appareat,) alias *Asbestinus Lapis* (quod non comburatur;) Paulo Veneto *Salamandra* (ob eandem rationem;) ab aliis *Corfoides* (quia canitiem præ se fert;) ab aliis *Linum* (quia lanugo ejus manibus netur & textitur;) the *Salamandre*, aut *incombustible stone*, & *Salamanders wool*. Lapis est *Alumini Schisto* simillimus, ignem respuens, adeo ut eo non modo uri non possit, sed purior reddatur; colore ad viriditatem obscuram tendente, quandoque & ferreo; attritione facile in tenuia filamenta solubilis. Mollis enim est, & quod efflorescit, dum teritur, plumas refert: unde à quibusdam *Alumen Plumosum*, & *Flos petre* dicitur. Olim in fila aptabatur, & mapæ ex eo tanquam lino fiebant; quæ sordibus conspurcatæ, puriores igne exustæ reddebantur, ac magis splendebant, quam si lavarentur. Regum quoque funera in ejusmodi adurebantur tunicis, ne corporis favilla cum reliquo misceretur cinere. De quo consulatur *Pancirollus de Reb. deperdit. tit. 4. cum Salmuth. commentar*. De modo vero, quo ita præparetur, ut ex eo lina fiant, lege *Ol. Wormium, in Mus. pag. 55*.

XVI. Selenitis (quia ad *Lunæ* motum fulgore crescere & decrecere olim credebatur,) Neotericis *Lapis Specularis* (quia perspicui potest, & rei, quæ ab ejus tergo est, imaginem reddit)

(Gg)

Spitruus.

Styracis, aut *Pulsatilla*; nempe ex Moschovia magna optimi generis copia provenit.

XVII. TALCUM, alias *Stella Terra* (quod stellarum instar nitet & micet;) quibusdam *Argyrodamus* Veterum (quia ignis violentiæ resistit;) *Argyrolithes* Chymicis; Talk. Cujus oleum follicite quærent Spagyrici, quo æs in argentum convertere se posse sperant. Mulieres etiam id avidissime expetunt, ad nitorem cuti conciliandum, variisque modis id perficere tentant, sed irrita hæcenus conamine, quanquam *Jacobus Zuingerus* modum extractionis præscribere ausus sit.

XVIII. Lapis SCHISTUS, *Talco* & *Selenitidi* valde affinis, albus, perspicuus forme, in laminas scissilis sibi invicem cohærentes. Reperitur in fodinis argenteis *Norvegia*, eique venæ argenti ita innascuntur, ut purum per ejus corpus ramulis eleganter distinctum parreptet.

Lapidum ex ANIMALIBUS desumptorum Classis.

AD Lapidum minus pretiosorum Molliorum genus ultimum Auctores & eos referre solent, qui ex *Animalibus* desumuntur. Cujusmodi sunt

I. *Lapis TURRONUM*. Qui revera lapis non est, sed os quoddam ad auditum spectans, in capite piscis *Tuberonis* reperiunt, & ab Anatomicis *Cochlea* dictum: & cujus loco vulgo dicitur *Lapis Manati*. Pulvis ejus utilissimus confertur ad Nephritidem & Urinæ difficultatem, renumque & vesicæ calculos deturbandos.

II. *PERCARUM Lapis*, *Percistone*; qui reperitur in capite *Perca majoris*. Circa exortum spinæ, qua capiti jungitur, duo extant, utrinque unus, vesiculis quibusdam inclusi, oblongi, plani, altera parte dentati, qui facile è piscibus coctis eximuntur. Ad calculos comminuendos similiter laudantur, si cum vino oligophoro pulverisati exhibeantur drachmæ unius pondere.

III. *Lapis CARPIONUM*, *the triangular bone found in the palat of Carps*. Qui ad calculum pellendum commendatur, pari modo quo præcedentes; magnique sit à multis, credulitati nimium addictis.

IV. *Lapis CORACINUS*, qui ex pisce *Ceracino* petitur, in ejus capite delitescens, candidus, osseus, figuræ ovalis, incurvus aliquantulum, parte convexa lævi protuberantia præditus, sed juxta extremitatum alteram asperitatem quandam habens; sicut ab

ab *Aldrovando lib. I. de Piscibus, cap. 15.* describitur. Commendatur à quibusdam ad Icterus seu morbum Regium; sed & præcipue ad renum arenulas.

V. Lapis LIMACIS, the small stone; ex iis Limacibus exemptus, qui sine testis in campis & locis subterraneis vagantur, colore fusco. Hi scilicet in capite lapillum gestant candidum, ovalis figuræ, tenuem, planum, aliquantulum convexum, pondere adeo exili, ut tres scrupulum unicum non superent. Nil aliud esse existimo, quam Limacis Cranium.

VI. OCULI CANCROCORUM, vulgo Crabs-eyes vocati, sed male. Revera enim oculi non sunt; sed ex Gammarorum fluviatilium (*Crepissus*) capitibus eximuntur; idque non quovis anni tempore, sed mensibus Junio & Julio, cum exuvias deponunt, & novam crustam acquirunt. Siti sunt in capitis summitate, utrinque unus. Medicis in usu venerunt ad sanguinis concreti dissolutionem & expulsionem; quia tenuium sunt partium & facultatis diureticæ; quo nomine etiam ad *Nephriticos* dolores ex arenulis commendantur, & potionibus *Traumaticis* admiscuntur.

VII. TOPHUS JUVENCI, qui in Jumentorum ruminantium secundo ventriculo, pilæ rotunditate, concretus reperitur. Vulgo *Orball* vocatur.

VIII. PILA RUBICAPRÆ, Velschio *Egagropila*; quia reperitur in Capris Alpinis, quæ in præclisis Rhætorum & Valschianorum rupibus & Alpibus Episcopatus Salisburgensis degunt. De horum Lapidum generatione & virtutibus medicis singularem tractatum edidit Hieron. Velschius, quem consulas.

IX. CALCULUS HUMANEUS, seu in vesica, seu in renibus hominis concretus.

X. ALLECTORIUS, Capon-stone, aut Cock-stone, qui in ventriculo Caponis aut Galli decrepiti nonnunquam concretus reperitur.

XI. CHOLIDONIUS, Small-stone (quod in ventriculis Hirundinum inveniri putetur) qui lapillus est exiguus, magnitudine seminis lini, sed figura hemisphærica, colore luteo subobscuri, splendente parte convexa & rotundiore, purpureo & nigricante tessili. *Anselmus Boetius* se in Hirundinibus eum quævisse ait, sed invenisse nunquam. Adferuntur ex Insula *Meliteni* Lapilli *Cholidoni* dicti, qui descriptioni Pliniane conveniunt, quos incolæ *Oculus Serpentum* vocant *Petrificatos*. Vires eis adscribunt præclaras in Capitis & Oculorum affectibus.

XII. UMBILICUS MARINUS (à similitudine Umbilici, quem repræsentat) quibusdam *Umbilicus Pomeris*; Germanis *Speckstein*; Cretensibus *Oculus Marinus* (quod gestatus oculis prodesse dicatur.) Qui nil aliud est, quam operculum *Conche* cujusdam *celate Aldrovando* dictæ, quæ etiam ad *Turbines* spectat. Hujus officium

(G g 2)

ificium

rificium claudit, eo modo quo vulgares Limaces hyeme crassa quadam testas suas obducunt, ut à frigoris injuria defendantur. Ejus in sanguine sistendo vim eximiam experti sunt quam plurimi, si parte plana cum saliva fronti agglutinetur. Et Hæmoptoici, qui sanguinem per intervalla expectorant, ejus pulvere cum ovo sorbili juvantur. Hujus Lemmatis est & *Umbilicus Marinus Magnus* ex India allatus, quem eleganter describit *Ol. Wormius Mus. pag. 37.* Omnes *Umbilicos Marinos* Itali indiscriminatim *Dive Lucia* oculos appellant.

LAPIDUM minus pretiosorum Minorum & Durorum Classis.

EXpedito Minorum Lapidum, minus pretiosorum & mollium, Elencho; ad *Duros* ejusdem divisionis accedimus. Hujus igitur capitis sunt

I. **MAGNES** (seu à *Magnete*, Armentario, primoque ejus inventore; ut *Plinius* deducit: seu, ut *Lucretius* visum est, à *Magnesia* regione, ubi crescit; seu à *magnis viribus* ut modernorum nonnullis placuit) *Theophrasto* *Heraoleon* (quod circa urbem *Heraclæam* inveniretur) aliis *Lapis Hercules* (quia ferro, quod omnia domat, imperat) quibusdam *Siderites* (eadem de causa; *sidere* nempe ferrum notat) *the Lontine* aut *Magnet*. Qui lapis est durus, ferrugineus, nigricans, ferrum, aut alium. Magnetem ad se trahens vel rejiciens, ac plagas mundi ostendens. Huic affinis videtur **MAGNESIA**, quæ colore & duritie magnetem referens, vitro adhuc fuso certa ratione admista, id perspicuum efficit, & à viridi colore expurgat; plus æquo admista, nigro colore inficit. Sed lapis hic Alabandicus non omnis est metalli expertus. Nam solutus in oleo vitrioli magnum calorem procreat, qui affusione aquæ identidem excitatur; atque instar ferri rubrum colorem aquæ forti conciliat, acrem emittit fumum; ac demum ubi vitro fuso imponitur, statim vitrum intumescit; quod ei cum cupro & ferro commune est. Cur autem vitrum potius expurget, quam suo colore inficiat; id neque tractione fit, quæ forte nulla est; nec præcipitatione, cum nihil in fundo vasis præcipitatum appareat: sed partes insensibiles sic immutat, & disponit, ut liberum auditum lumini permittant.

II. **CALAMITA ALBA**, seu *Magnes Carneus* (quia ut ille ferrum, ita hunc carnem ad se trahere putant) qui lapis est albus, lineis

lineis nigris inscriptus, qui linguæ admotus firmiter ei adhæret. Reperitur potissimum in *Iliua*, Hetrusci maris Insula. Sunt, qui ad *Margas Saxatiles* referunt: sunt, qui ad *Osteocollas & Poros*.

III. HÆMATITES (vel quod sanguinei coloris sit; vel quod attritus cotibus aquariis succum fundat sanguineum; vel quod polleat vi sanguinem sistendi,) *Bloodstone*. Lapis est colore sanguinis concreti, durus, striis Antimonii instar exornatus, glebosus, vi sanguinem sistendi præditus. Reperitur in variis *Germanie* locis, inter rubricas & ferri fodinas; sed præ reliquis commendatur *Hispanicus*, qui *Compestella* adfertur, figura angulosa, ferri nigricantis colorem habens & splendorem. Ulceribus, vasorumque rupturis internis, & mictioni cruentæ prodest in pulverem tritus & cum appropriatis exhibitus.

IV. SMYRIS, Germanice *Smirgel*; Italis *Smeriglio*, Gallice *Eméri*, Anglice *Emerite* aut *Emerilstone*. Lapis est ferrugineus, ad nigredinem tendens, adeo durus, ut ejus pulvere utantur Gemmarii ad gemmas sculpendas, & Fabri ferrarii ad arma polienda. *Chymici* tincturam ex eo extrahunt, quo Mercurium quasi in momento figunt, atque ita fixum quidam vocant *Præcipitatum Miraculosum*, quo ad augmenta sua Chrysopoei utuntur. In ferri fodinis reperiri solet; & apud nos copiose provenit in Insula *Sarnia*, vulgo *Garnsey* dicta; teste *Camdeno* nostro, in descript. *Insular. Britannicar.* ubi hæc habet. Naturæ munimentis tutior [*Insula*] “utique prærupta cautium corona redimita, inter quas *Smyris*, “lapis durissimus & asperrimus reperitur (nos *Emeril* vocamus) “quo Gemmariilapides expurgant, scinduntque, & Vitrarii vitrum “diffidunt.

V. LAPIS LAZULI, Græcis *Κυανὸς λίθος*, Latinis *Lapis Cæruleus*, ab Arabibus *Hager* vel *Azur*; unde forte *Azure* deductum est; Germanis *Lasurstein*, nobis *Ultramarine* & *Azure*. Lapis est durus florum Cyani cœrulei colore, aureis punctulis & venulis exornatus. Duo ejus statuunt genera; unum ignis vim fert, alterum neutiquam. Is qui *fixus* est, & colorem in igne non mutat, ex *Oriente*, Asia, aut Africa adfertur, & *Orientalis* ideo dicitur, atque hac nota probatur. *Non fixus* quibusdam in locis *Germanie* reperitur, medius est inter *Lapidem Armenum* & *Lazuli*; hoc utique mollior, illo durior. *Colores* ex utroque parare solent pretiosos, ex *Orientali Ultramarinum* dictum, auro chariorem, qui ætate non mutatur: ex *Germanico* ignobiliorem *Azurebleu* dictum, qui externis injuriis facile læditur, & temporis progressu virefcit. *Medicis* etiam in usu est ad affectus Melancholicos.

VI. LAPIS ARMENUS (i.e. ex *Armenia* allatus) Gallice *Verdazure* (quasi dicas colorem à cœruleo in viridem transeuntem,) Germanis *Berchblau*. Qui levis est, colore cœruleo ad viriditatem

(H h)

tem vergente, friabilis. Olim ex Armenia deferebatur; jam vero in variis *Germania* locis reperitur, ut in comitatu *Tyrolensi*, aliisque argenti fodinis. Inter *Medicos* commendatur ad eisdem affectus, ad quos *Lazuli* lapis; humores scilicet Melancholicos per vomitum & secessum educendos.

VII: LAPIS LIPIS, cujus, quod sciam, primus meminit *Zacutus Lusitanus*, *Lib. 1. Observat. 83.* Colorem habet coeruleum Saphirinum, cum transparentia quadam. Durissimus est, sed in minuta finditur fragmenta. Gustu ita acris & mordax, ut, si tantillum juxta linguam apponatur, excitato ardore eam exulceret. Affertur à multis mercimonii causa ex *Novi Orbis* provincia, *Pontose* dicta, & civitate *Lipis* (unde nomen sortitus est) vocata. Venditur in taleolas redactus; ita ut, si eum à longinquo videris, parum distare à merce illa, quam Lusitani *Anil* vocant, Belgæ vero *Indigo*, arbitreris, nisi quod *Lipis* clarum & transparentem sortitur colorem; *Indigo* vero aliquantulum obscurum. Inter auxilia celeberrima, quæ ad ulcera virulenta & depascentia, præsertim Gallica, coercenda, eorumque putrilaginem absumentia utilia sunt, hic Lapis obtinet principatum. Nam sua vi caustica eorum malitiam & malignitatem infrænat.

VIII. LAPIS COERULEUS ANGLICUS, in agro *Lancastrensi* repertus, & incolis *Willote* dictus; qui ducendis lineis idoneus est. Hujus mentionem facit D. Dr. *Merret. Pinac. rerum Natural. Britannicar. pag. 218.*

IX. GLOSSOPETRA (quasi *Lingua lapidea*; ita dicta, quod linguam *Pica* avis figura referat: sed vulgo ita appellatam volunt, quod Serpentis linguam exprimere putant. Unde nil aliud esse existimant, quam Serpentis linguam in lapidem conversam. Verum falluntur; Serpentium enim linguæ non triquetrae, sed teretes & bifidae sunt.) *the Stone-tongue*, aut *Tongue-stone*. Lapis est ut plurimum triangularis, basi crassiore, scabra, toto alioquin corpore lævi, & quasi corneo, minutis quibusdam denticulis ad latera crenato, colore quandoque luteo albicante, longitudine diversa. Creberrime reperitur in Insula *Melita*; nonnunquam etiam in *Anglia*, ubi in variis matricibus, præcipue in mineris carbonariis delitescit. Item in *Germania* prope *Luneburgum*, ex Aluminosis fodinis eruitur. De hoc Lapide singularem *Dissertationem* conscripsit *Cl. Thom. Bartholinus*.

X. ASTROITES, *Lapis Stellaris*, Germanis *Sternenstein*. Anglice *the Star-stone* (quia stellulis undique insignitus nigrificantibus) qui est moderate durus, colore cinereo, fusco, nigricante, asteriscis exornatus; ad capitis humani magnitudinem quandoque excrescens. In Comitatu *Tyrolensi* & circa arcem *Immerian* invenitur, & alibi. Aceto impositus hinc inde movetur, ac
fi

si vivus esset; quod fit, aceto per poros lapidis sese insinuante, & aërem inclusum premente, qui exitum, seu libertatem potius elasticam sibi quærens, lapidem trudit & movet. Ad pestilens contagium & vermes puerorum necandos, ejus pulvis, quatuor granorum pondere, commendatur. Nonnulli eum Amuleti loco gestant. Hic lapis à Boetio de Boet *Asterias vera*, seu *lapis Stellaris*; à Gesnero *Sphragis Asteros*, à Ferd. Imperat. *Stella Judaica* nominatur.

XI. L A P I S C R U C I S, *Crosta-stone*. Cujus duo statuuntur genera. *Unum*, quod in corpore cinerei coloris, crucem ostentat candidam: Alterum, quod coloris *nigri* aut *purpurei* crucem exhibet. *Primum* eleganter describit *Laurentius Pignorius in Musai Calceolarii Sect. 4.* Posterius *Lud. Septalius in Epist. ad Chiocum.*

XII. L A P I S J U D A I C U S (à loco ubi invenitur, *Judea* scilicet, sic nominatus) quibusdam *Syriacus*; Plinio *Euroes* (quod urinam fluere faciat,) & *Tecolirbos* (quod calculum resolvere putetur,) *the Aeto-stone*. Variarum est figurarum, Natura in ejus formatione mire ludente; unde diversa etiam obtinuit nomina. Qui instar glandis & Balani est, *Phanicitis*; qui instar nuclei Olivæ, *Pyrenes*, &c. Genus præcipuum (quod frequentissimum apud *Medicos*) Nuclei Olivæ formam repræsentat, striasque & sulcos habet à radice in apicem usque excurrentes. Reliquæ ejus species sunt *TROCHITES*, Germanis *Spangstein*, aut *Kederstein* quia rotæ aut Tympani fert effigiem. *ENTROCHOS*, cum multæ vertebræ simul junctæ reperiuntur, adeo ut radii unius alterius striis inferantur. *COLONETTA*, Italica appellatione; cum articuli longiores sunt, columnulas imitantes, & commissuris æqualibus constantes. *STELLA JUDAICA*, quum articuli non modiolos aut columnulas, sed stellas exprimunt. Cujusmodi apud nos etiam in *Anglia* prope ostium fluminis *Sabrina* frequenter inveniuntur. Et existimo eosdem lapides esse cum eo, qui *Asteria* Boetio dicitur, Gesnero *Sphragis Asteros*, vulgo *Little Star-stone*. Singulis enim partibus utrinque stellæ figura, ceu sigillo impressa videtur; radii eminent suis angulis, & in singulis radiis cavitas media. Octo aut plures interdum cohærent tam affabre, ut nullus artifex melius potuisset conjungere; facile tamen ab invicem separabiles. Omnes species ad renum calculos in primis commendantur. Maxime vero *Nephritici* tinctura, quæ nullibi descripta extat. *Moebius* tamen hanc commendat præparationem: infunditur nempe spiritus salis rectificatus pulveri lapidis *Nephritici*, reponiturque in digestionem, fitque tinctura viridis, de qua dentur guttulæ decem in vehiculo convenienti.

XIII. B E L E M N I T E S (à *sagitta*, cujus formam exacte refert; *Βέλεμων* enim sagittam vocant Latini) aliis *Dactylus Ideus*; (quod
(Hh 2) in

in monte *Ida* reperiatur, & *digitum* repræsentet.) Quibusdam, *Lyncurius*, (quod ex urina *Lyncis* ortum trahere falso existimaverint;) Germanis *Alphen-schies*; i.e. Incubi sagitta, Danis *Spektrum Candela*; Anglice *Arrow-head*, & *Finger-stone*, & nonnullis *Thunder-bolt*. Lapis teres & oblongus est, in apicem obtusum desinens; colore modo albicante, modo aureo; sagittæ extremitatem ad amussim referens; quandoque plenus, quandoque concavus; lineas obtinens à medulla ad extremitates tendentes; communiter pollicis & digiti longitudine. Omnibus à Natura inest rima quasi in longitudinem tendens. In *Anglia* passim reperiuntur variorum colorum. Germani contra incubum, & renum calculos valere credunt; eumque in finem ejus pulverem exhibent in liquore competenti.

XIV. *MOROCHTUS*, aliis *Leucogæa*, *Leucophragis*, *Galaxias*, *Graphida*, *Galactites* (quia eo lineas albas ducere solent *Pictores* & *Mathematici*; & quia, si super cotem cum aqua fricetur, lacteum emittit succum, quo in *Collyriis* utuntur *Medici*.) *White marking-stone*. Lapis est (si modo lapis) mollis, lubricus, quandoque nigro, quandoque subviridi, quandoque melleo colore; qui tamen vestigia alba post se relinquit, si convenienti subjecto affricetur. Reperitur in *Hetruria*, *Germania* circa *Hildesheimium*, *Anglia*, & *Insula Feroensi* ad littora fluvii cujusdam, ubi instar Tartari concreti cautibus adhæret. *Dioscorides* in *Ægypto* reperiri ait, & ad lineas vestes dealbandas usurpari.

XV. *CERAUNIAS*, *Telum Fulmineum*, *Lapis Fulminaris*, *Cuneus Fulmineus*, *Telum Jovis*; Danis *Torden-steen*; Germanis *Donner-stein*; nobis vernacule, *Thunder-stone*: eo quod cum fulmine è nubibus decidere vulgo persuasum sit; quam vere tamen, à nobis, in *Dissertatione nostra de natura Fulminis*, fuisse demonstratum. Varias figuras præ se fert, maxima ex parte cuneum refert, Pyramidem, malleum, securim, clavam: longus quandoque pollices septem, quandoque quinque; latus tres aut quatuor; crassitie inæquali, substantia ut plurimum ad filicem accedit; durus adeo ut limam non sentiat, gravis & ponderosus. Colore variat, quandoque cinereo, quandoque nigricante, quandoque luteo subobscurum. Multas & insignes virtutes ei adscribunt superstitiosi.

XVI. *BRONTIAS* (quod cum *fulmine* similiter è cœlo delabi putent;) aliis *Ombrias* (quod cum *imbribus* cadat;) quibusdam *Chelonitis* (quod *Chelin* testudinum, figura & colore quandoque repræsentet;) aliis *Ovum Anguinum* (quia caudas anguinas corpus ejus ambientes & in unum punctum concurrentes quodammodo ostentat,) Germanis *Groß Krotten-stein*, i.e. Magnus Lapis Bufonius, alias *Donner-stein*. Lapis est hemisphæricus, dimidii ovi gallinacei magnitudine, quandoque major, quandoque minor, colore cinereo,

cinereo, fulvo, nigricante; materia vel faxea, vel gypsea, vel filicea; ab apice ad basin per ejus convexum quinque lineas, æqualiter in quinque quasi triangula eum dividentes, habens; quæ lineæ semper duplicatæ, ex minutulis constant punctis, & quandoque in planam ejus superficiem terminantur, quandoque eum perreptantes in modiolum, quod centrum planæ superficiei, exornant. Si protuberantiæ & eminentiæ quædam in eo appareant, *Ovum Anguinum* nominant. Nunquam, quod sciam, animadversum, quod plures simul in eodem loco aut nido reperti sint. Hujus alteram speciem constituit *Brontias Favogineus*, quem *Ol. Wormius, Mus. pag. 77.* describit.

XVII. *ÆTITES*, seu *Aquilinus Lapis*, Germanis *Älberstein*; nobis *eagle-stone* (vel quod colore sit fulvo instar Aquilæ; vel quod in nidis Aquilarum reperiatur: eo enim transferri aiunt, seu ut eo nidus Aquilarum stabilior reddatur; seu ut partum ovorum promoveat) dictus. Lapis est rotundus, aut ad rotunditatem accedens, colore cinereo, pullo, aut fusco; alium lapidem vel argillam in se continens, unde concussus resonat. Varia ejus sunt genera. *Plinius* quatuor recenset; *Anselmus Boetius* tria, & totidem *Wormius* se vidisse affirmat. *Parturientibus* peculiariter dicatum esse docent Veteres, non refragante Modernorum experientia. Sinistro namque brachio alligatus, foetum in iis retinet, quæ ad abortiendum sunt proclives: tempore partus sinistro femori adalligatus, partum accelerat.

XVIII. *OSTRACITES*, (à Græco *ὄστρακον*, quod *testam* notat; eo quod ex crustis multis sibi invicem superimpositis constet) a *Pest of Borea*. Nam Lapis est scissilis & crustosus, ferrugineus seu fulvus; qui ablata una crusta seu testa, alias subinde continet ejusdem coloris & substantiæ. Puticis loco quidam utuntur ad cutim glabram reddendam. Ex *Medicis* nonnulli ad mulierum *Catamenia* sistenda, mammarumque inflammationes supprimendas, pulverem ejus præscribunt.

XIX. *CONCHITES*, *Lapides Conchas* figura exprimentes. *Stones resembling Shell-fishes.*

XX. *BUCARDITES*, (quia *Cor Bovinum* tam figura, quam magnitudine æmulatur) quem primum descripsisse videtur *Ferrandus Imperatus lib. 24. cap. 26.* Reperitur interdum in *Anglia*.

XXI. *FUNDITES* (quia fungos refert) *spulcrum-stone*. Cujus non unum genus,

XXII. *SCELETON SERPENTIS*, qui ossa Serpentis in spiras contorti exprimit. Cui valde affinis est *Ophiomorphites*, *Snake-stone*; qui similiter anguem in spiras convolutum imitatur. Hujus generis infinitus reperitur numerus in *Anglia*, in oppido quodam *Wepham* vocato, quinto lapide ab urbe *Bristolæ* distante, & alibi.

(I i)

XXIII.

XXIII. **PECTINITES**, qui piscem *Pectinem* repræsentat, eaque de causa nostro idiomate, ~~scollapstone~~, haud incongrue nominatur.

XXIV. **CORNU AMMONIS**, quod quatuor constat circumvolutionibus in se revolutis, instar *Vitruvianæ* volutæ perpetuis striis & articulationibus dotatum; colore nigricante, ad griseum tendente, substantia ficca, quibusdam in locis armatura aurea splendens. De quo plura apud *Anselm. Boetium*, lib. 2. *De Gemmis* cap. 246.

XXV. **CORNU ARIETIS**, ~~Kams-hornstone~~; quia instar cornu arietini in se retortum & involutum est, rugisque transversim ductis exornatum. In *Anglia* haud rarum est, utpote quod in multis agri *Somersetensis* locis, potissimum prope *Thermas* sulphureas, *Aquas Solis* vocatas, lapidicinis effoditur.

XXVI. **HYSTEROLITHUS**, five *Lapis Uterinus*, eo quod pudendum muliebrem figuram æmuletur, sic dictus.

XXVII. **PRIAPUS**, qui fascinum virile mentitur, tum figura, tum magnitudine.

Hicce subungere potest Lector curiosus alios lapides, quotquot seu Naturalium, seu Artificialium formas aliquatenus exprimere viderit. Istiusmodi quippe lapidum, qui omnes nomina sua à rebus, quas figura repræsentant, sortiuntur, permagnus imo ferme infinitus est numerus. Atque hæc quidem de *Lapidibus ignobilioribus & minoris pretii*, quatenus ad præsens institutum faciant, dicta sunt.

L APIDUM Pretiosorum Majorum Classis.

L Apides **PRETIOSI**, quos *Gemmas* communiter vocant (licet inter lapidem pretiosum & Gemmam discrimen agnoscant accuratiores) commodissime dividuntur in *Majores & Minores*, quos *Gemmas* strictè dicunt.

E MAJORIBUS sunt

I. **JASPIIS**, ~~the Jasper stone~~. Qui lapis est variorum colorum, seu ob variorum succorum, qui ad ejus generationem concurrunt, mixturam; seu ob particularum, quibus constat, figuras & positiones varias: & tantæ nonnunquam magnitudinis, ut ex eo magnæ statuæ & columnæ integræ elaborari possint; sed *Achate* mollior. *Species* ejus sunt *Jaspis*

i. *Orientalis*

1. *Orientalis*, quæ subcœruleo viridique colore obscura, sanguineis punctis conspersa est, & cæteris omnibus præfertur. A Gemmariis nostris *Oriental-Jasper* vocatur.
2. *Viridis*, the *Green Jasper*; quæ maxima ex parte virefcit, paucis intercurrentibus venulis sanguineis. Hujus varia genera afferuntur ex Insulis Feroënsibus.
3. *Grammatias*, quæ aliquid purpurei admixtum, interjecta linea alba, habet; cæterisque omnibus olim præferebatur.
4. *Terebinthizusa Dioscoridis*, (quod colore sit flavo, instar *Terebinthinae* coctæ, sic dicta) the *yellow-Jasper with black veins*.
5. *Purpurea*, croceis & cœruleis venulis interspersa, the *Purple Jasper*.

II. *HELIOTROPUS*, (ex eo nomen esse videtur, quod aquæ immixtus augere Solis fulgorem sanguineo percussu; extra aquam radios sive fulgorem quasi avertere, solemque velut in speculo exhibere credatur; docente *Plinio*, lib. 27. cap. 10.) the *Heliotrope*, aut *Blood-stone*. Qui non solum dimidia ex parte rubro colore tingitur, sed & in ipsa viriditate maculas ostendit aliquas rubicundas: qua nota à *Jaspide viridi* internoscatur. Huic affinis est lapis ille spurius quidem, sed elegans, quem *Jasponichem*, i. e. Onichem viridi colore tinctam, vocant Gemmarii; quæ in *Insulis Feroënsibus* reperitur.

III. *MALACHITES*, quæ viridis & opaca est, instar foliorum *Malvæ* (undenomen traxit) sed pro diversitate & gradibus colorum, varias etiam obtinet species, de quibus videatur *Anselmus Boetius de Gemmis*. Tantæ magnitudinis quandoque reperitur, ut pocula & manubria gladiatorum ex ea conficiantur. Optimæ in *Bohemia* effodiuntur.

IV. *PRASIUS*, *Theophrasto*, lib. *ᾠστὶ λίθων, περὶ ὁρίων*, aliis *ᾠστὸς λίθος*, dictus (à *Prasino* seu *Porraceo* colore) qui maxima ex parte viridis est, sed raro sine punctis atris, & quandoque alba distinctus. Domus est *Smaragdi*, ut *Jaspis Prasii*, & *Jaspidis Marmor*; unde tanto mollior *Jaspide*, quanto *Smaragdo* durior; observatore *Cardano*, lib. *de Gemmis & coloribus*, Sect. 18.

V. *LAPIS NEPHRITICUS*, (quia in doloribus *Nephriticis* eximie proficius) Italis *Ospada del fianco*, Gallis *Un Siadre*, Hispanis *Igiada*, Belgis *Kals-wee*. Qui ut plurimum viridis est, polituræ accuratæ incapax, & semper quasi pinguedine quadam obductus & oleosus; maculis seu nubeculis quibusdam obscurioribus interstinctus; ubi in laminam tenuiorem redactus est, quodammodo transparens. Coloris gradibus variat; quidam ex viriditate nigrescit; quidam flavedinem cum viriditate conjunctam habet; sæpe ex viridi, albo, flavo, nigro, cœruleo quasi mistus apparet.

(I i 2)

Ex

Ex utraque *India* adfertur, in nonnullis *Hispaniæ* & *Bohemiæ* locis etiam reperiri quidam aiunt. De viribus ejus, in Renum & Vescicæ calculis atque arenulis expellendis, historias varias & experimenta vide, in peculiari de eo tractatu conscripto à *Clariss. Casparo Bartholino*.

VI. *ACHATES*, (à fluvio ejusdem nominis in *Sicilia*, quod primo ibi inventus) *the Agate*. Lapis est variorum colorum, quorum ratione in varias species dispescitur, ut etiam figurarum ipsi à Natura impressarum. Quando venis suis & maculis cornu refert, *Ceratachates* dicitur: quando arbores & nemora, *Dendrachates*. Ubi venæ albæ per eum disseminatæ sunt, *Leucachatem* vocant; ubi rubicundæ, *Hemachatem*; si Sardæ modo rubet, *Sardachatem*; si Corallii in morem, *Corallachatem*. Summâ, coloribus adeo variat ac ludit, ut jucundum præbeat spectaculum, in primis ubi lineis & coloribus suis res alias naturales aut artificiales exhibet. Ex *India* notæ probatissimæ adfertur; sed & in *Germania* & *Bohemia* quandoque reperitur, etiam tantæ molis, ut Pocula & Scyphi ex eo conficiantur: item in *Anglia*, in *Cornubia*, uti ex quorundam relatione scribit D. *Merret*, in *Pinac. rerum Nat. Britan.* pag. 209.

VII. *ONYX*, (à corneo Unguis humani candore, quem exacte refert) *Italici Nikolo*, Germanis *Dutche*, nobis *Onyx*. Quæ duobus ad minimum coloribus, albo scilicet & nigro, Zonis distinctis, constat; & magis opaca est, quam diaphana. Pro colorum varietate etiam varias habet species: sed omnes zonas & lineas habent, quibus colores ab invicem determinantur. Olim tantæ magnitudinis inveniebantur, ut inde columnulas & pocula, quæ *Myrrhina* dicebantur, conficerent. Ad figilla conficienda aptissimus lapis; nam ceram politus non recipit.

VIII. *SARDONIX*, *the Sardonyx*, quæ ex *Oniche* & *Sarda* componitur, & cui varias imagines imprimere solent Sculptores. Quandoque ex zona alba imaginem sculpunt, ita ut nigra zona loco strati sit; tumque à quibusdam *Memphites* appellatur, hodie à Germanis *Gamethysta*.

IX. *CALCEDONIUS*, alias *Carchedonius* (à *Carthagine*, quæ Græcis *Kapχονδύρις*; non quasi Carthagine nasceretur: sed quia è Garamantibus Carthaginem, inde ad alios adveheretur olim.) *the Chalcedony* aut *white Onyx*. Qui lapis est Gemma quasi per nubem spectata, vel nullo, vel levi aliquo colore tincta, semper spicua, scalpituræ, propter duritiem, contumax. Præferuntur reliquis, qui aliquo colore sunt diluti ac oculis grati; ut illi, in quibus purpureus, cœruleus, ac rubicundus albo miscentur; quique Soli expositi radiorum refractione Iridem ostendant. Cujusmodi est *Chalcedonius Grandinosus* (nempe ex Grandinibus quasi Margaritis

garitis constans, guttulis succi lapidescentis ita invicem concretis, ut ova piscium esse solent) cujus mentionem fecisse videtur *Fermandus Imperatus*, lib. 24. *Hist. Nat. cap. 2.* sub nomine *Ingemma-menti Grandinosi*: & qui Veterum *Chalazia* esse videtur. Huc spectat *Calcedonius Islandicus Crystalloides*, quem *Olaus Wormius Mus.* pag. 99. disertè describit.

X. CORNEOLUS, vel potius *Carneolus* (quod *carnis* colorem imitetur, sic dictus,) aliis *Sardus* (ab insula *Sardinia* unde olim optimus adferebatur,) Germanis *Corniol*, Angligenis *Cornelian*. Primus lapis in *Rationali Aaronis*; sanguini subcitrino aut bilioso, vel loturæ carnis colore similis; semper spicua & obscura quasi nubecula perfusus; magnitudine nunc majori, nunc minori. Varia ejus sunt genera, colores si spectes. Reperiuntur in *Sardinia*, *Armenia*, *Persia*, *Germania*, *Insulis Feroensibus*.

XI. AMETHYSTUS, (ab ἀμεθύσις & μεθύσις, *inebrio*; vel quod usque ad vini ex pallido rubentis colorem accedens, in violam definat: vel quod Magorum vanitas resistere ebrietati eum olim promiserit.) Hebraicè *Achlama*, Chaldaice *Enegle*, Anglice *Amethyst*. Lapillus est violacei coloris, ex rubri & cœrulei mixtura orti, fulgore non omnino igneo, sed deficiente seu languido. Differentia tamen aliqua in colore observatur: & ubi ad albedinem accedit, *Amethystus Albus*, the white-Amethyst dicitur. Reliquis præferuntur, quibus in purpura refulget roseus color. Reperiuntur in variis locis *Indiæ* utriusque, *Arabie*, *Armenia*, *Cypria*; imo in *Germania*, *Bohemia*, *Misnia*, sed molliores & viliores. Præstantes in *Hispania* vidit nobilis ille juvenis D. Franc. Willoughbens, ὁ μαχαεττις, è monte quodam in oppidi *Vici* dicti vicinia sita, copiose effossos: quemadmodum ipse testatum reliquit in *Itinerar. sui* pag. 469. ubi totum explicuit artificium quo primum è subnigricantis terræ venis eruuntur, & deinde poliuntur.

XII. CRYSTALLUS, (à Κρύος *gelu*, & σάμα, *contrabo*, quasi quid gelu concretum) *Crystal*. Gemma est mollis, transparent, aquam in glaciem congelatam referens; unde haud pauci ex glacie natam volant: quod tamen veritati minus consonum esse docet Experientia; cum igne non solvatur, nec aqueæ in ea partes igne consumantur. Quandoque colores alios assumit, tumque nomina etiam. Si Saphirinum, *Pseudosaphirus*; Smaragdinum, *Pseudosmaragdus* appellatur, & sola duritiæ veris differt. Chry-stalli ut plurimum hexagona nascuntur figura, quandoque pentagona, imo globosa & rotunda, sed tum duriores sunt vulgaribus, ac pro *Pseudadamante* habentur. Hujus sortis esse videtur *Crystalus* ille, qui è rupe S. *Vincentii* prope *Bristoliam* effoditur, *Bristow-stone* nominatus.

XIII. FLUORIS, (quia ignis calore, ut glacies à Sole, lique-
(Kk) scunt

scunt & *fluunt*, sic ab *Agricola* dicti) Anglice *Spars*. Qui variis coloribus insigniuntur, & diversis figuris concresecunt, gemmasque primo aspectu mentiuntur. Ex iis quandoque conficiuntur Colores pictoribus utiles: sed Metallurgi, dum metalla excoquantur, eos adhibent, ut facilius fundantur. Huc referunt nonnulli lapidem illum (non à Natura quidem, sed arte elaboratum) qui

XIV. *BEZOAR MINERALIS* dicitur, & Italice *Pietra D'avventura*, (quod à Chymico quodam Veneto casu inventus sit) Cujus substantia quasi vitrea est, coloris luteo rubentis, micis aureis repleta, quæ oculos mire perstringunt.

XV. *Lapis SERPENTINUS*, Lusitanis *la Piedra della Cobra*; partim naturalis in serpente concretus, quem Lusitani *Cobra de Capelas*, i. e. Colubrum pilosum vocant; partim artificialis, ex variis venenosorum animalium, potissimum hujus Colubri pilosi portionibus confectus: qui intoxicatis antidotum præstat, tempestive adhibitum; remedium fere toti Indiae, & Chinæ usitatum. Decujus virtutibus mira prædicat *Athanasius Kircher. China illustrata pag. 80.*

L A P I D U M pretiosorum Minorum Classis.

INTER Lapides MINORES, ob nobilitatem GEMMAS sensu strictiori vocatos, occurrunt

I. *ADAMAS*, (*ἀδάμας*, ab *α* privativo, & *δαμᾶν* five *δαμῶν*, *domo*, eo quod *indomabilis*, five in tantum durus, ut omnia metalla confringat, & ipse non confringatur ab ullo: licet quod de tanta ipsius duritie prædicarunt Veteres, vanum prorsus esse hodie compertum sit; nam & in scobem redigi, & facillime malleo confringi posse, quotidiana docet experientia) Hebraice *Shemer*, Anglice a *Diamond*, (forte ab Arabico *Diamah*, à *dim*, quod durare sonat.) Gemma est durissima sine colore, aquæ instar diaphana, applicatam tincturam ad se quasi rapiens, sibi que ita conjungens, ut micantes suos radios procul ejaculetur. Si alieno colore, albo, luteo, aut nigro infectus sit, id illi vitio est, ejusque pretium minuit. Licet *Plinius* plura Adamantum genera agnoscat, nobis tamen non nisi *unicum* innotuit, quod genuinum & verum sit: sed *Pseudadamantes* varii (*Bastard Diamonds*) qui à solo natali nomen & differentias invenerunt; cujusmodi sunt *Bohemici*, *Annabergici*, *Hungarici*, *Anglici*, tum *Bristollienses* nempe, tum *Cornubienses*, &c. Sed hi omnes molliores sunt, nec splendorem verorum attingunt, ideoque ad *Crystall*os rectius referendi sunt. *Peri* in *Bisnager*, provincia *India Occidentalis*, & in *Decan*, item ad fretum *Tanaim* in *Malacca*

Malacca, &c. inveniuntur. Mirum est quod scribit *Rubens*: Dominam *Heverensem* è *Luxemburgorum* familia, duos habuisse hæreditarios *Adamantes*, qui alios crebro producerent, ut eos qui statim temporibus intueretur, congenerem sibi prolem enixos fuisse palam judicaret. Mirabile dictu, constaret si certa fides; & magnum sane argumentum seminarias facultates lapidibus inesse, quibus in terræ gremio propagantur & sibi similes producant.

II. RUBINUS, (à rubro colore) ab Indis, *Tokes* & *Mancha*; à Persis & Arabibus *Jacut*, à nostratibus à *Kuby* dictus. Est gemma diaphana, rutilans, rubensque ad cœruleum parum inclinans, limam respuens, & ad sanguinis, Cocci, Laccæ Indicæ colorem propius accedens, quam Minii. Ratione splendoris & rubedinis quatuor ejus constitui solent generæ, quæ nomina etiam diversa sunt sortita, viz.

1. *Rubinus Verus*, qui ubi magnus est & radiantis splendoris, CARBUNCULUS, Græce *Ἀνθράξ* (quia carbonis instar accensi rutilat & micat,) & *Pyropus* (quasi ignitus lapis,) & *Appyrotus* (quia ab igne non patitur,) à *Carbuncle*, aut *great ant radiant Kuby*. De quo vide sis quæ ab immortalis *Boyleo* nostro in Epistola quadam ad prænobilem virum, D. *Robertum Morrey*, Equitem Auratum, de *Adamante* quodam in tenebris diutile lucente, & de *Carbunculo*, conscripta sunt, ad finem *lib. sui de Coloribus*. Hic *Rubinus verus*, ubi rudis & impolitus, apud nos à *Moche Kuby* nominatur.
2. *Rubicellus*, à *pale Kuby*; qui ex *Balassio* & *Spinello* colorem mixtum habet, quasi similis *Granatis Bohemicis*.
3. *Balassius*, à *Balass Kuby*; qui exiguam & languidam habet rubedinem.
4. *Spinellus*, à *Spinell Kuby*; qui mollior aliquanto vero *Rubino*, rubicundior *Balassio*, sed non adeo splendet ac verus *Rubinus*.

Præstantissimi *Rubini* in Insula *Zeilan* reperiuntur; ubi in rosea quadam matrice, quam *Balassiam* esse quidam arbitrantur, nascuntur. Reperiri nonnunquam *Ovi Gallinacei* magnitudine testantur historię, à *Purchasio* nostro, *lib. Peregrination. 1. cap. 4. pag. 104.* & à *Benvenuto Cellini nel arte del Gioiellare, lib. 1. pag. 10. tradita.*

III. GRANATUS, Gallis *Vermeille* (quod *Minii* rubedine flagret) Danis, Germanis, Anglis, *Granat*. Qui inter *Rubinos* etiam à quibusdam recensetur. Est autem Gemma dura & flavedine obscure rubens, instar ignis aut *Minii* nativi, tincturam suam in igne non remittens. Ratione loci ubi invenitur, in *Orientalem*

(Kk2)

lem

lem & *Occidentalem* dividitur. *Orientalis* ex *India*, *Cambaia*, *Æthiopia* adfertur. *Occidentales* colorum gradibus differunt; reliquis vero præferuntur *Bohemici*, ob tincturæ præstantiam. Reperiuntur quoque in *Norwegia* dodecalaterum, sed impuriore, vena *Talci* plerumque infecti, colore ad nigredinem tendentes, ut eo primum genus *Orientalium* æmulari videantur, natura quandoque politi.

IV. HYACINTHUS, (ab Hyacinthino colore) *the Hyacinth* aut *Jacinth*; qui ejusdem census est cum superioribus, colore rutilo & ex flavedine rubenti. Cum varios etiam habet coloris sui gradus, eorum respectu variaz ejus constituuntur species. Sunt, qui instar *Minii* nativi & sanguinis biliosi rutilent: sunt qui colore *Croceo* flavescant; sunt qui *Succinum flavum* æmulentur, qui viliores sunt; qui *album Succinum* referant, qui vilissimi habentur. Dantur tam *Orientales*, ex *India* allati; quam *Occidentales*, ex *Silesia*, *Bohemia*, aliisque *Germanie* locis petiti. *Plinii Hyacinthus* hodie inter *Amethyistos* recensetur; ut Veterum *Amethyistus* pro *Granato* accipitur. Apud nos in *Anglia*, in agro *Eboracensi* quandoque effodiuntur *Hyacinthi*, sed impuri.

V. SAPHIRUS, *Σάπυρος* (appellatio est ab Oriente; nam similiter *Hebraei* dicitur *Saphir*; uti *Vossio* videtur, à loco, qui forte fuerit ejusdem nominis,) *Plinio Cyanus*, (à colore,) *the Saphir*. Gemma est cœruleo colore pellucida, diaphana, dura, omni carens rubedine *Amethyestina*. Quidam albicat, & à *Plinio Femina* vocatur, à nostris Gemmariis *Pale-Saphir*: quidam coloris est saturate cœrulei, *Mas* eidem *Plinio*, & nobis *Eleo-Saphir* dictus: quidam omni prorsus colore destituuntur, Anglice *White-Saphirs* nominati, & pro Adamantibus quandoque substituti, sed longe his & duritie & splendore inferiores. Alias dividi solent in *Orientales*, ex variis *India* regionibus allatos: & *Occidentales*, in confinio *Silesie* & *Bohemie* in torrentibus, & in prato minore *Isere* inventos. Tinctura & color Saphiri ab eo igne auferri potest, ut Adamantem mentiatur. Quidam pro *Oleo Saphiri* (quod contra venena commendatur) vendunt quippiam ex floribus *Cammille* cum *Sale Ammoniaco* destillatum; à quibus cavendum.

VI. SMARAGDUS, *Σμάραγδος* & *μαράγδος* sine σ, quo *Menander* utitur apud *Athen. lib. 3.* (nempe ut dicitur *μαράγδω* & *μαράγδω*, luceo, splendo: ab illo est *Smaragdus*, ab hoc *Maragdus*. Nam *Ovidius*,

In folio Phœbus clart: lucente Smaragdis.

à nonnullis, *Prasinus* (à colore viridi,) ab aliis *Neronianus* & *Domitianus*; Arabibus *Zamarut*, nobis *Emeraude*, aut *Emerald*. Qui lapillus

pillus est grato virore oculorum aciem ita demulcens, ut omnium viridiorum amœnitatem superet; pellucidus, diaphanus, plane viridis. *Plinius* ejus genera duodecim recenset. Hodie in *Ori-entalem* & *Occidentalem* dispeſcitur: ille præſtantiffimus, duriffimus, viriditate oculos uberrime fatians. Hic rursus duplex est; *Europæus*, qui in *Cypro*, *Britannia* (in agro *Eboracenſi*) aliisque locis invenitur: & *Peruanus*, qui licet viriditate excellat, tamen ut *Orientalis* non ita radiat, & nubeculis ut plurimum fœdatur. Mira sunt, quæ de *Smaragdorum* magnitudine apud *Autores* leguntur. *Ol Wormius* se *Genue* vidisse ſcribit integrum *Catinum* ex *Smaragdo*, qui in diametro pedem circiter habebat, qui æſtimari ob amplitudinem nequibat. Partum id fuit antiquitus ex victoria *Syriaca*, & ad publicum *Civitatis* ornamentum *D. Laurentio* consecratum.

VII. *CHRYSOLITHUS*, (à χρύσος & λίθος, quasi *aureus Lapis*; quia aureo colore translucet) the *Chrysolite*. Qui *Gemma* est viridis, colore *Smaragdo* dilutior, utpote cui nonnihil flavedinis adjunctum est; diaphana, quandoque per viridem aureum fulgentem habens, & tum *Chrysopatius* à quibusdam indigitatur. Quod si noctu, igne admoto, vehementer splendeat; *Chrysolampis* *Plinii* est. Non adeo durus est, quin limam sentiat. Quandoque, sed rarissime, in tantam excrescit magnitudinem, ut inde statuæ confici possint. *Arſinoe* namque *Ptolomæi Philadelphi* Uxori statua quatuor cubitorum ex hoc lapide (qui *Veterum* est *Topasius*) in delubro sacrata fuit.

VIII. *TOPASTUS*, (ab *Insula* quadam in *Mari Rubro*, quæ & *Paz* dicebatur, & *Opaz* & *Topaz*; ita derivante *Plinio*, lib. 6. cap. 29.) the *Topaz*, aut *Topas*. *Topasium* *Neotericorum*, *Veterum Chrysolithum* esse, doctè demonstratur tum ab *Anselmo Boetio*, tum à *D. Job. de Laet*. Duo ejus genera statuunt; alterum *Oriente*, quod instar auri obryzi five purissimi rutilat: alterum *Europæum*, quod *Cryſtalli* instar molle est, cum aureo colore, vel parum vel multum nigricante. Hujus generis quosdam esse scribunt, qui tam parum flavedinis habent, ut, nisi nigredine, à *Chryſtallis* distingui non possint; atque in *Bohemia* passim inveniri.

IX. *TURCOIS*, *Turcosa*, *Turchina* vel *Turchesia* (à *Turcis*, à quibus ad nos adferri solet:) Anglice a *Turcots*. Quæ *Gemma* est opaca, ex viridi, albo & coeruleo quasi composita, viride æs colore exacte referens. Sunt *Oriente*, in *Persia* nigris lapidibus adnascens, quarum quædam colorem semper servant, *Turcots-stones* of the old Rock dictæ; aliæ paulatim viridescunt, ac viliores proinde habentur: vel *Occidentales*, quales in *Germania*, *Bohemia*, *Hispania*, *Insulis Feroensibus* colliguntur. Lege *Itinerar. D. Mandellſſo*. Tantæ magnitudinis *Turchesia* in *Thesauris Magni Ducis Hetruriae*,
(Ll) visitur

visitur ut juglandem æquet; cui *Jul. Caesaris* effigies insculpta est.

X. *BUFONIUS Lapis*, Germanis *Stettenstein*, (quia vulgo creditum est, eum ab annosis *Bufonibus* eructari; quod experientia falsum esse norunt sagaciores) Anglice *the Toad Stone*. Qui lapillus est, raro unguem digiti superans, coloris ut plurimum grisei, ad rubedinem quandoque inclinans oculi modo convexus, quandoque oblongus, quandoque rotundus, altera parte planus aut parum concavus. Nascitur fungi ad morem in saxis & petris; non vero in capitibus *Bufonum*.

XI. *OPALUS* seu *Opalin*, Græce *ὀπαλός*, (quem *Isidorus* nomen ex patria obtinuisse vult, quia eum sola parturit India: sed de causa nominis quod affert, verisimilius esset, si locus ejus nominis ullus esset in India.) olim *Paderos*, quasi puerorum amor (quod amorem conciliare olim à superstitionis crederetur, vel ob eximiam pulcritudinem,) Italis *Girasole* vel *Scambio*; Germanis *ein Beese*; popularibus nostris *an Opal*. Gemma sane elegantissima, omnes ferme colores exhibens. Ex radiorum enim luminosorum refractionibus variis, cœruleum, purpureum, viridem, flavum, rubrum, lacteum, ac nigrum interdum, intuentium oculis ingerit. Unde *Plinius*, "Inest Opalo, inquit, Carbunculi tenuior ignis, "Amethysti purpura fulgens, Smaragdi virens mare, & cuncta "pariter incredibili mistura lucentia. Hincque fit, ut à quibusdam inter omnes gemmas palma ei deferatur; tum quod arte nulla adulterari possit. Ejus quatuor constituuntur genera.

1. *Primum* Diaphanum est, omnes colores Iridis exhibens; hocque præstantissimum.

2. *Secundum* ex nigredine igneum Carbunculi fulgorem emittit.

3. *Tertium* in corpore flavescente varios repræsentat colores, quietos tamen, nec fulgore vivos, & nonnunquam lacteo etiam quasi languentes.

4. *Ultimum* cum primo æque diaphanum est, sed parum cœrulei, aut flavi coloris in se habet, & luci oppositum, si vertatur, in extremo cardine lucere, propter luminis reflexionem, videtur. Hoc omnium ignobilissimum censetur, ideoque *Pseudo-Opalus* *Basard-Opal* dicitur.

Præstantissimi Opali in *India* inveniuntur; viliores in *Cypro*, *Ægypto*, *Hungaria*: Nullibi vero frequentiores quam in *Insulis Feroensibus*. Nascuntur omnes in lapide molli, venis nigris, flavis, fuscis distincto.

XII. *BERRILLUS*, sive *Beryllus*, *βήρυλλος* (nomen ab *Oriente* accepimus, teste *Isidoro*, lib. 16. cap. 7. qui *Beryllus* inquit, in *India* gignitur, gentis sua lingua nomen habens:) Anglice *the Beryll*. Ultimus in rationali *Aaronis* Lapillus. Circa ejus descriptionem variant Autores. Communis tamen opinio huic gemmæ tribuit virorem

virorem marinum. Ex *India* venit & *Phenicia*; ubi *Ophitæ* venis innascitur, ut *Dionysius Poeta* testatur hoc versiculo.

Φύεται ἐν οὐρεσὶν ὀφιδίου ἐνδοδὶ πλάγης.

Nascitur is venas intra fulgentis Ophita,

uti vertit *Raphael Volaterranus*, lib. 27. cap. de *Gemmis*.

XIII. O C U L U S M U N D I, nonnullis *Lapis mutabilis* (quod aquæ frigidæ impositus, colorem mutet, planeque flavus & perspicuus reddatur; sed inde extractus in pristinum statum redeat) quem *Musæi Calceolarij Autor Cerutus* Opali speciem quandam existimat. *Onychem* colore cinereo quodammodo refert; & Opali modo quadantenus perspicua est, lucique applicata in candore luteum quid continet. Hujus generis Ego unum vidi, à nobilissimo Viro, Philosphiæque experimentalis assertore felicissimo, D. *Roberto Boylea* SOCIETATI REGIÆ ostensum. Qui aquæ frigidæ & purissimæ immersus, exiguo temporis spatio, proprio quasi exutus colore, alium induebat, ex albo nimirum flavescentem, & (quod majorem excitabat admirationem) ferme translucidum: ex aqua vero extractus, deposito colore illo, quem in aqua contraxerat, proprium denuo exhibuit intuentibus. Cujus experimenti occasione, ex eruditis spectatoribus nonnulli ingenia sua ad investigandum, unde tanta tamque admiranda coloris mutatio in isto lapillo contingeret, serio exercebant, variasque in medium proferebant conjecturas; quarum aliquæ forsan impofterum lucem videbunt. Interim lectione dignissima existimo, quæ non multis retro abhinc annis super hoc Lapide commentatus est *Clariss. Vir, D. Job. de Laet. lib. 1. de Gemmis & Lapid. cap. 13.* Extat etiam in Societatis Regiæ archivis, hujus gemmæ amplior historia, à D. D. *Jonath. Goddard* (quem humanis jam exemptum serio doleo) conscripta.

XIV. O C U L U S C A R R I, *Italæ Occio di Gatta*, ab Hispanis *Ternasole*, ab Indis *Holtzitziltetl*, à Portugallis *Ojo di Gatto*, nobis the *Cata-eye* dictus, (quia illius animalis oculum probe refert:) Cujus variæ species sunt. Præcipuam autem sic describit modo laudatus *Job. de Laet.*: “Gemma hæc inquit, si invertatur, in altera semper parte candidior & lucidior aparet. Constare enim “duobus coloribus videtur; lacteo pene & fusco, in medio veluti “divortio quodam separatis, qui utrinque obscurius translucent, “ita tamen ut alteruter color magis lumen admittat. Inspicienti “hanc Gemmam desuper, dextra pars candida videtur, quomodo “docunque verteris. Imo si bene advertas, linea satis lata candida in medio apparet, & utraque latera fusca: ita ut certo certius sit,

(L 12)

hanc

“ hanc coloris varietatem à lumine illi accedere, &c. Magnam horum copiam in *Tototepec* Indiæ Occidentalis *Provincia* reperiri; eosque exiguos esse, & præ nimia abundantia viles, scribit *Franc. Ximenes lib. 4. cap. 18.*

XV. O C U L U S B E L I, (ob eximiam speciem *Belo*, Sacratissimo Assyriorum Deo, olim dicatus; unde nomen,) exiguus lapillus, hemisphæricus, in cujus centro pupilla nigricat, quam ambit latus circulus, Margaritæ instar splendens, tunicam oculi corneam referens; hinc sequitur alter circulus, tenuis, altopurpureus, quem excipit ejusdem magnitudinis flavus, ex quibus duobus Iris quasi constituitur; reliquum corporis fulvo est colore. Eadem gemma videtur cum *Gesneri Lycophalmo*, qui similiter quatuor constat coloribus, ita positus, ut *Lupi* oculum probe referat.

Ad pedem hujus Classis apponi possunt

M A R G A R I T Æ, (*Μαργαρίτης*, feu, uti *Eustathius* deducit, à *μαίρειν*, splendere; seu à *μαργαρον* quomodo à *Pausania in Arcad. & in Epigramm.* vocatur: *μαργαρον* vero est ab Hebræo fonte; nam *Jes. 17. ver. 6.* est *Gargerim*, quod in translatione sua *Junius & Tremellius* vertère *baccas*) aliis *Perle*, & cum majores sunt, *Uniones* (quod nulli duo indiscreti reperiantur,) *Perle*. Quarum nobiliores in sinu *Persico*, & in *India*, in primis ad Promontorium *Commorin*, & Insulam *Zeilan* reperiuntur, *Orientales* dictæ: *Occidentales* vero, quæ ignobiliores sunt, variis in locis *Europæ*; etiam in *Anglia*, *Scotia*, *Dania*, *Norwegia*. Apud nos in *Ostreis* maxima ex parte, ut & in *Mytilis* (sed impuriore) inveniuntur. *Margaritæ* vitia temporis progressu contrahunt, & quasi senescunt, cum flavedinem induunt; sed pristino splendori & candori restituntur, detracta superiore cuticula spiritu Vitrioli: verum quia aliquid earum detrahit magnitudini & pretio, alii pulvere *Alabastris*, *Corallii albi*, *Vitrioli albi*, & *Tartari albi* eas mundant & restitunt. Quidam *Columbis* devorandas præbent; quidam *Oryza* & *Sale* fricant. Maculas tollunt *Gemmarii* rore *Maiali*, in foliis *Lactucæ* collecto, si in eo per diem macerentur.

L A P I S B E Z O A R, (vel à *Persico Pazar*, quod *Hircum* illum notat, cujus ex ventriculo desumitur: vel ab Hebraico & Chaldaico *Beluzaar*, quod dominum veneni significat; eo quod præstans sit in domandis venenis,) *Bezar-stone*. Lapis est mollis, ex variis crustis coagmentatus, in animalis cujusdam, *Capræ sylvestris* speciem habentis, ventriculo genitus, figura varia, oblonga, orbiculari, modo compressa, modo rotundiore & renem referente; colore nunc nigricante, nunc subcinereo, nunc flavescente; ut plurimum vero est pullus, spadiceus, ex viridi nigricans; in superficie

perficie lenis & blandus, in meditullio concavus, vel festucam, vel plantæ fibras, vel aliud quid continens. Duo ejus dantur Genera, viz.

1. *Orientalis*, qui ex *India Orientali*, *Persia*, *Ægypto*, *China*, *Cathai*, & vicinis regionibus adfertur: de quo optimè commentati sunt *Carol. Clusius ad lib. 1. Garcia, cap. 44.* & *Joh. Nirembergius in Hist. Ind.*
2. *Occidentalis*, qui ex *America* & *Peruvia*; & minoris pretii habetur.

Veri Lapidis Bezoardici notæ hæc statuuntur. Si ex Capricervis Orientalibus, in montanis pascua habentibus, sit depromptus; unde Perficus præfertur Malacensi: qui ex nigro seu varo colore viridescit, cujusque pulvis subviridis est: qui, ablata crusta superiore, inferiorem habet æquè splendentem ac politum: qui in meditullio concavus, aut arenam lapidis substantiæ similem habet: qui aqua aut vino liquescit, nihil continens arenosi; si calce viva, aqua admixta, unctus, paulo post flavescat. Quidam chartam Creta fricant, deinde supra Cretam lapidem; & si frictionis linea viridis appareat, genuinum esse censent. Quidam acu ignita lapidem perforant; si fumum de se spargat, adulterinum credunt. Certius tamen veri indicium non datur, quam si venenum animali exhibeatur, & mox oblato lapidis pulvere incolumis evadat. Mirum est, quod *Ol. Wormius* se observasse scribit, "Oculis meis, inquit, vidi Lapidem Bezoardicum insignem, *Ovi Gallinacei* magnitudine, manibus ab homine maligno gestatum, & leviter saltem tactum, rupta exteriori tunica, in frustra diffiliisse, magna adstantium admiratione. Ipsos Indos hunc lapidem solerter adulterare, docet *Manardus, tractat. de Lapide Bezoardico*. In *Brasilia* conficitur artificiosè ex Resina, fructu Crumacino, radice *Dralzene*, *Contrajerua* Lusitanis dicta: sed in superficie flavescit, intus cinerei est coloris. Huic merito substituit *Jac. Bontius (lib. 1. Medicin. Indor.)* lapidem PORCINUM. Sive *Malacensem*. Qui in Apro inventus, quantum forma ac colore Bezoartico inferior est, tantum virtutibus & usu eum exsuperat. Quoties enim liquori alicui per horam solummodo immaceratur, toties eandem vim illi communicat: idque cum tam exiguo ponderis decremento, ut vix animadvertas ipsum imminui à frequenti infusione. Liquor autem ipsius licet aliquantulum amaricet; ingratus tamen nequaquam est, daturque facillimè potui, delicatis corporibus, ac teneræ puerorum ætati; convenitque maximopere febri malignæ, morbo Comitiali, ac variolis, cum ob sudorem quem elicit, tum quod malignitati adversetur. Vide *Tulpii Observat. Med. lib. 1. c. 51.*

(M m)

Lapis

Lapis **CERVINUS**, qui in canthis oculorum *Cervi* concrefcit, ex oculorum fordibus & fudore in cavitate quadam exigua collectis diuque detentis. Subalbus eft fuperficie, intus cinereus; & perraro pifi minoris magnitudinem fuperat. Viribus cum Bezoar vero certare aiunt. Et de *Lapidum* Generibus hæc fufficiant.

METALLORUM Divifio Generalis.

RECENSITIS primi & fecundi generis Foffilibus, reftat *Tertium*, quod **METALLA** complectitur. Sub quo nomine comprehendimus tam ipfa Metalla propriè fic dicta, quam Metallis Affinia, five ea in fodinis prope Metalla reperiantur, five in Metallorum feperationibus, fufionibus, & præparationibus ab iis fe-gregentur.

METALLUM, *μέταλλον* (quafi *μᾶτα ἄλλα*, vel quia inventa fint poft alia ad vitæ ufum neceffaria, ut *Eufthio* vifum eft: vel, ut *Plinio*, quòd ubique unum inventum eft, non procul inveniat & aliud.) ftrictiori fenfu acceptum, eft corpus perfectè miftum, non vivens, fed viventi æmulum; à Deo in venis creatum, ex terra subtiliffima & halitibus pinguibus ex terra & aqua, per calorem miftis, ut inde Sulphureum & Mercuriale femen fiat, ex quo Metalla generari poffunt: quæ accedente Salino principio concrefcunt & indies incrementum fumunt, donec pura & perfectæ reddantur, igne fufilia, icthuque in longum & latum ductilia.

Dividuntur in genere in *Vera*, quæ rurfum vel *Perfecta* funt, vel *Imperfecta*; & *Spuria*, quæ in aliquibus ad Metallum veri naturam requifitis deficiunt. De quibus in fpecie.

Metallorum PERFECTORUM Classis.

PERFECTA Metalla dicuntur, quæ fubftantia & accidentibus funt abfoluta, & ita fuis principiis temperata, ut ignis examina fine ullo detrimento fuftinere poffint, late diffendi ac dilatari, & facilè Mercurio conjungi. Huiufmodi funt

I. Au-

I. AURUM, (vel à veteri verbo, *aura*, quod *splendorem* notat; unde illud *Virgilii*, *Auri per ramos aura resulsit*: vel à Græco *αἰσῖν*, *custodire*; quia præcipuè custoditur:) *Gold*. Quod est Metallorum omnium purissimum, perfectissimum, è Mercurio purissimo, perfectissimè excocto, & Sulphure rubro, præstantissimo & fixissimo exactè mistis & unitis constans: omnia ignis & aquarum fortium examina sustinens; ponderosissimum, maximè ductile, fulvo colore rutilans. Dividitur in

1. *Αυρον* i. e. *ignem non expertum*, aliis *Obryzum* (seu, quasi *αἰσιν*, nitens; nam *αἰσιν* est *nitescere*: seu quasi *Ophirium*, ab *Ophir*, unde Salomoni, aliisque regibus Hebræis aurum advehebatur:) quod aut è terra effoditur, aut lavatur in rivulis, aut in animalibus reperitur. Quod è *terra effoditur*, aut sincerum & solidum est, aut scintillis lucentibus tinctum; quale est, quod lapidi Lazuli adhæret, aut lapidi fissili. In venis propriis, vel saxis splendore candidis inest, vel pyriti proprio, vel pyriti ferri, quandoque in glebis, quandoque in arenis reperitur & colligitur. Quod *lavatur ex rivulis* & aquis, quandoque formam granorum & massularum habet; quandoque ex nigris lapillis excoquitur, in quibus modò scintillarum, modo bractearum instar micat. In *Animalibus*, Piscibus nempe, *Truttis* & *Aurisequis*, inveniri quoque volunt.

2. *Αυρον*, sive ab *Argento separatum*; quod nonnulli volunt *Purificatum* dici, *Crown-Gold*, *Fine-Gold*, aut *Angel-Gold*.

3. *Argentosum*, seu *λευκον*, à calore candido appellatum; quale in *Pannonia* reperitur, quandoque in Pyrite ferri, quandoque in proprio saxo. Mirum quod refert *Alexander Neapolitanus*, *Gen. dierum. lib. 4.* se à fide dignis autoribus comperisse, in citeriore Germania intra Danubium vites existere, quæ claviculos & plerumque candicantia folia ex puro auro germinant, quæ Regibus & summis Ducibus dono datæ sunt. Quod confirmatur à *Sennerto*. Apud nos in *Anglia* Aurum eruitur ex *Stanno*, sed haud magna quantitate.

II. ARGENTUM, (à Græco *ἀργυρος*; quod *ἀντὶ τοῦ ἀργυῖ*, à candore derivant, quia est percandidum:) *Silber*. Quod Metallum pariter perfectum est, Auro proximum, ex Mercurio & Sulphure fermè fixis constans, instar Auri ductile, pondere tamen eo, ut & plumbo, levius, ignis vim sentiens, & in eo nonnihil de sua substantia amittens. Dividitur in *Naturale*, quod purum putum est, & ita in venis repertum: & *Arte purgatum*, quod igne excoctum est, & ab omni materia aliena fornacum ope separatum.

(L I 2)

Prins

Prius vel effoditur ex terra, & tum variis figuris præditum apparet, Ramosum nempe, Furcatum, Acuminatum, Crispatum, Asperum, Bracteatum, Capillare, &c. Quorum exempla aliquot in locupletissimo SOCIETATIS REGIÆ Rerum Naturalium Thesauro extant. Vel in fluminibus reperitur per montes & fodinas decurrentibus, ex quibus aliquid abradunt, quod deinde colligitur; sed hoc raro & paucis admodum in locis. Vel rude est, Metallis & aliis rebus permixtum; & tum *Silver Ore* dicitur. Hoc differentias quasdam ratione Colorum admittit; de quibus consulari *Agricola*. Hujus generis Argentum nos in *Britannia* habemus, ex mineris *Cambrobritannicis* depromptum; ex minera stannea majori quantitate, ex plumbea minori.

Metallorum IMPERFECTORUM Classis.

Metalla IMPERFECTA habentur, quorum principia non ita matura, bene excocta, fixa aut pura sunt; unde in ignis examine multum iis decedit, multum in Scorias, Vitra, Lapides, aliaque impura corpora vertitur. Hæc vel *Dura* sunt, quæ prius igniuntur, quàm funduntur: vel *Mollia*, quæ è contrario funduntur, antequam igniuntur.

Prioris Generis sunt

Æs, (unde sic dicatur, minus evidens est. Nam alii derivant ab Hebræo *Esch*, quod ignem sonat, ob splendorem: unde *micantia æra*, & *ære renidente*, dixit *Maro*. Alii à Græco *ἄρης*, quod *ferum* notare videtur; unde antiquus rectus *aires* & κατὰ συνηθὴν *æs*, ut à plebes plebs: quod vocabulum pro ære sumebatur, cum *ærea arma* solum obtinerent.) Græcè χαλκόν; Latinorum quibusdam *Cuprum* (à nobilioribus ejus venis in *Cypro* olim inventis.) Anglicè *Coper*. Quod Metallum est imperfectum, durum, ex plurimo Sulphure rubeo, impuro & paucio Mercurio, nondum maturis & fixis genitum, colore rubicundo. Magnam cum Argento affinitatem habet, cui ut plurimum in mineris conjungitur; ita tamen ut faciliè ab eo per ignem separari possit. Hujus tria dantur Genera, viz.

1. *Nativum*,

1. *Nativum*, quod vel *purum putam* est, à Natura sola in terræ visceribus perfectum; quale in fodinis ærariis & argentariis reperitur; effoditur etiam varia figura, stiriarum scilicet, virgularum, globulorum, massulæ, &c. Vel *Rude* (*Brassæ* Dicitur dictum) in Pyrite, aut minera ista existens, & ut inde extrahatur excoctione indigens. Quod ratione coloris, consistentiæ, bonitatis & cocturæ, differentias varias sortitur. E Pyrite enim ut plurimum eruitur, aut Lapide scissili.
2. *Arte depuratum*, ab Argento & scoriis omnibus liberatum; quod coloris est purpurei, & sanguinei ad flavedinem tendentis, in laminas fufum. Aliud æris depurati genus est, quod in superficie nigricat.
3. *Artificiale & Compositum*, quod duplex est. (1.) *Orichalcum*, ορείχαλκον (i. e. æs montanum, ex ὄρος & χαλκός.) ex ære liquato & Cadmia; quam imbibit, confectum, Anglicè *Brass*. Quo autem modo, discas ab *Agricola lib. 9. cap. 1.* Hoc æris genus durum est, malleo tractabile, & in tenues laminas ductile; quæ felle tinctæ aurum referunt, & à *Plinio Coronarium* vocatur, quia Histrones coronis ex eo factis utebantur. (2.) *Album Æs*, quod Argentum ita æmulatur, ut flavum Aurum, à Græcis λευδαργύρεον dictum. Arte conficitur modo à priori haud diverso, nisi quod loco Cadmiæ sumant Magnetem, aut Talcum. Alii cum Arsenico & Nitro idem præstant.

II. **FERRUM**, (seu quod *ferra*, id est semina frugum, terræ condant, ut *Isidorus lib. 16. cap. 20.* ait: seu à *feriendo*, quod cætera eo *feriantur*, hoc est domentur; ut *Perottus* censet: seu à *feritate*; unde *Lucretius*,

*Hæc validas saxi radices, & fera ferri
Corpora constituunt.*

Græcis Σίδηρος; Angl. Iron. Quod duritie insigne est, ex paucis Mercurio & plurimo Sulphure constans fixo, diu ignitionem sustinens & tardè fusile, rubiginem contrahens facilè, colore livido albicante. Duum est Genus, viz.

1. *Nativum*, quod in fodinis purum reperitur, vel granorum, vel massæ instar.

2. *Excoctum*, quod in officinis ferrariis è minera conficitur, idque vario modo pro diversitate ipsius minere. Ex ferro sæpius li-

N n

quefacto

quefacto & repurgato fit *σόμωμα* Græcis, Latinis *Acies*, Anglis *Steel*: quod etiam quibusdam in locis à Natura procreatur, tumque *Chalybs* nominatur, à *Chalybibus*, Pontica seu Scythica natione, ad fluvium Thermodontem, quam id genus ferri durissimi mittere ait *Maro*, 1 *Georgic*. Utrumque genus, præsertim si aëri exponatur, seu alioquin humectetur, facile vitium contrahit, quod *Ferruginem* seu *Rabiginem*, *Nust* dicimus: à quo tamen diu præservatur, si Minio, Gypso, Bitumine, Pice liquida, vel Oleo à Sale defœcato obducatur. Reliqua de ferro vide sis apud *Ulyssem Aldrovandum*, *Musæi Metallic. lib. 1. p. 135*. Nullibi gentium uberius reperitur hocce tam necessarium Metallum, quam in *Anglia*: ubi ipsum distinguunt Ferrarii in *Coltsel*, quod asperum & porosum est, ideoque magis fragile; & *Ketsel*, quod optimum censetur: & *Scoriam* ejus *Slagg* vocant.

Posterioris est

1. **PLUMBUM** (vel quasi *Pilumbum*, à *pila* quod ex eo primum pilis factis maris altitudo tentata fuerit, ut *Isidoro* placuit *lib. 16. cap. 21*. vel à *πλός*, *niger*, ut *nigri* appellatio conveniat *plumbo nigro*: vel à *πλός*, *lutum*, quia multum habet terrestre, unde & Belgis *Loet*, à *Lutum*.) Græce *μόλυβδος*, Angl. *Lead*. Quod distinguitur in

1. *Candidum*, alias *Stannum*: nobis *Tin* & *Pewter* dictum: Quod est Metallum imperfectum, molle, album, ex Mercurio copioso, minus fixo, & Sulphure albo impuro constans, Plumbo difficilius fusionem admittens, rubiginem vix contrahens, tinniens. Quanquam sui coloris in fodinis non reperiatur; purum tamen lapillis quibusdam, quos Germani *Zwitter* vocant, nos *Tin Stone*, & *Shoad*, adhæret; hique Lapilli modo nigri, modo flavi, modo candidi sunt, quandoque, sed perraro, etiam pellucidi. Purum quandoque angulos habet quatuor, quandoque quinque, sex; quandoque faviginem refert, quandoque botrum. Impurum vero & mixtum quandoque lapidi candidissimo adnascitur, permistis fluoribus coloris argentei: quandoque lapidi nigro, quod ubi sterile est, *Spuma Lupi* nominatur.

2. *Nigrum*, Græcis *μόλυβδος* proprie, *Common Lead*, & *Slagg Lead*. Hoc molle est; lividum, ponderosum, ignem diu non sustinens, tractantium manus nigredine inficiens, ex multo Mercurio crudo, & Sulphure impuro & foetido genitum. Sunt, qui velint, in humidis locis sepultum crescere, & pondere augeri: ut & imbribus

bribus in teſtis plumbeis. Magis mirum verò, quod in fornace uſum pulvis ejus pondere augeatur, ſed rurſum ſuſum & in plumbum redactum minuat. Vel Nativum effoditur, vel ex lapide excoquitur.

Utriuſque, Generis inſignem habemus copiam in *Anglia*. Ubi *Stannum* à Metallurgis diſtinguitur in tria genera, *Pyran* ſcilicet, *Pundick*, & *Black Tin*.

Metallis A F F I N I U M Classis.

Metallis AFFINIA dicuntur ea, quæ magnam quidem habent cum veris Metallis affinitatem, ſi ortum & generationis modum ac locum reſpicias; quibuſdam tamen proprietatibus ab iſdem differunt, nempe non ductilia aut malleabilia ſunt, ſed frangibilia, friabilia aut fluida. Cujus ſortis cenſentur

I. BISMUTHUM, Cæſalpino *Marchaſita Argentea*; Germanis *Biſmut* & *Conſerſett*; nobis *Tin-Clas* dictum. Quod ſui generis Metallum videtur, ab utroque Plumbo colore & duritie differens; nitens quandoque Argenti colore, interdum purpureo diluto; quoad figuram, Stybio ſeu Antimonio haud abſimile; Stellatum Antimoni Regulum exacte referens. Minera unde conſtat, ſimilis eſt Galenæ, ſed manus inſicit, quod Galena non facit. Reperitur & ſolidum, quod ſectionem admittit, nec diſſilit, ut Galena. In *Anglia* & *Miſnia* invenitur in venis Argentariis. *Metallarii* Plumbo candido admiſcent, ut majorem & ſplendorem & duritiem ei concilient, utque liquefactum melius decurrat. Conſciunt quoque ex eo varii generis vaſa, quæ Argentum colore tenuis æmulentur. *Begninus* in ſuo *Tyrocinio Chymico*, ex eo ſacum elaborat, ad cutim dealbandam.

II. ANTIMONIUM, quibuſdam, *Stimmi*, *Sibium*; Veteribus, *Diſcoride* teſte, *Platyophthalmon*; Plinio *Larbaſſon* & *Alabaſtrum*; nobis *Antimony* & *Sibium*. Quod conſtare videtur ſubſtantia minerali combuſtibili, & Mercurio fuliginoso, ex terreſtri quadam materia coagulato. Ejus minera, ut aliorum Metallorum, in montibus reperitur, indeque variis operationibus extrahitur. In *Italia* in tractu *Sinenſi* ejus fodinæ ſunt; In *Ungaria* optimum eruitur; item in *Germania*, *Bohemia* & alibi. *Uſus* ejus magnus eſt apud *Stannurgos*, *Speculorum Chalybeatorum confectores*, campanarum,

rum, glòborum bellicorum, typorumque Typographicorum fufores. *Chymici* quoque ex eo varia conficiunt Medicamenta; Vitrum fcilicet, Regulum, Sulphur, Flores, Tin&uram, Olea, Pulveres, sexcenta alia. In *Anglia* ex mineris plumbeis eruitur.

III. ARGENTUM VIVUM, Græcis ὕδραργυρος, id est Argentum aqueum seu fluidum; Theophrasto ἀργυρον χυτὶν; Aristoteli ἀργυρον κινητὸν; Quick-Silber & Mercury. Quod est liquor mineralis, ex aqua metallica viscida, & terra sulphurea constans, spirituosus, volatilis, ad contactum frigidus, sed vi calida præditus, ponderosus, coloris argentei, instar aquæ fluidus, sed manus non madefaciens. Est vero vel

1. *Nativum* & fossile; quod in propriis venis reperitur, aut etiam in vena *Schisti* seu *Hematitidis*.
2. *Factitium*, ex *Minio* seu *Cinnabari* nativo elaboratum. Hoc autem *Minium* vel purum est, quale in *Hassia* prope *Marpurgum* è fodinis plumbeis extrahitur: vel Lapidibus permiscetur, quandoque in lapide *scissili* cinereo, bractearum modo, concretum; quandoque in lapide *Metallico* candidissimo.

Ufus ejus apud Artifices permagnus est; eo *Aurifices* ad vasa deauranda, & Aurum ab Argento separandum, ad speculorum confectiorem, ad Aurum moliendum, & infinita alia utuntur. *Chymici* eo carere nequeunt, quibus pro Panchresto interservit. Unde variis modis *Mercurium* suum mangonizant; præcipitando, calcinando, sublimando, figendo, in oleum, aquam, pulverem, spiritum, & nescio quid non eum redigendo.

Præter hæc tria, (quæ ad Metallorum naturam propius accedunt, ideoque à quibusdam ad Metallorum improprie sic dictorum classem referuntur) dantur & *alia Metallis Affinia*; utpote quæ vel in venis Metallicis inveniuntur, & quandoque in se quidpiam veri Metallum continent; vel ex impuris Metallis, dum purgantur, aut etiam puris ipsis, dum corrumpuntur, fiunt. Hujusmodi alia *Naturalia* sunt, alia *Arte* elaborata.

Naturalia vocamus, quæ in fodinis inveniuntur, sine Artis ope ab ipsamet Natura jam confecta. Ut,

I. GALENA, (forte à γαλεῖν, *splendere*; quod instar Argenti venæ splendeat,) ex qua metalla excoquantur; vel Plumbum solum, & tum *Plumbago* proprie dicitur, Anglice *Lead-Ore*; vel & Plum-

Plumbum & Argentum, & tunc *Galena* audit. Hæc duplex est,

1. *Nativa* seu fossilis, Germanicè *Glans* dicta; cujus variæ species sunt, ab *Agricola* & *Ol. Wormio* luculenter descriptæ.
2. *Factitia*, quæ fit fornacum ope. Nam Auri & Argenti fornacibus adhærere solet, & hoc differt à *Nativa*, quod in pulverem etiam comminuta, Emplastrisque ita addita, fundi & liquari nequeat, *Nativa* verò faciliè. Quamobrem usum habet in Metallis fundendis. *Dioscorides* Emplastris minimè mordentibus miscet: & *Galenus* vim *Lythargyro* similem ei adscribit.

II. CADMIA, (à *Cadmo Tyrio*, qui Auri metalla, eorumque fusi-
sram invenisse dicitur; ita *Agricola de Metal. lib. 1. cap. 41*) quæ
triplex est, viz.

1. *Fossilis*, alias *Lapis Calaminaris*, Anglicè *Calamite*. Quæ sub-
lutei coloris est, lapidis mollioris, aut terræ durioris natu-
ram referens, & cremata fumum luteum præbens. Quæ de
caussa ea utuntur ad *Æs* colore aureo tingendum, ut fiat *Ori-
thalcum*. Reperitur in inferiori *Germania*, inter *Coloniæ Agrip-
piniam* & *Aquisgranum*; item in ferrariis *Saverlandiæ* & alibi.
2. *Metallica*, Plinio *Lapis Aërosus*, & nobis similiter *Wass-
kone*, aut *Wass-Stein*; quia ex eo fiat *Æs*, quamvis non solum
Æs, sed & Argentum, imo utrumque quandoque in eo repe-
ritur. Variis figuris concrevit; est enim alia *Uvæ* similis,
alia testæ, alia crustacea; colore nigro, fusco, aut cinereo.
Vi erodendi tam valida pollet, ut sæpe nudas fossorum manus
& pedes erodat: omni animantium generi venenum est lethale;
unde vulgo ea mures, sorices, glires, muscas, &c. interfici-
unt. *Chymici* ex ea corpus nigrum, fuscum aut cinereum sub-
limant, quod *sublimatam* vocant *Cadmiam*. Apud nos ex mon-
tibus *Mendipensibus* copiose eruitur.
3. *Fornacum*, de qua insequentibus.

III. CHRYSOCOLLA, (quasi *Auri Gluten*, quod ad Aurum glu-
tinandum ejus sit usus,) Germanis *Stein-grun*, *Stisser-grun*, *Berch-
grun*; Aurifabris nostris *Waxce*, aut *Gold-Soder*. Quæ duplex
est, viz.

1. *Nativa*, quæ ab ipsa gignitur Natura in fibris & cavernis, &
reperitur quandoque arenæ similis, quandoque materia Me-
tallica ei adhæret. Effoditur jam in *Hungaria*, *Bohemia*, *Gold-
berga* in *Silesia*, & alibi. Hæc semper viridis est; alia ad satie-
tatem

tatem, & quo magis ad Smaragdi accedit viriditatem, eo melior æstimatur: alia dilutè viret, quæ vilissima: alia medio modo se habet.

1. *Fasitia*, quæ conficitur velex Nativæ dura, tingiturque lutea herba, ob id Herbacea & *ὀρεσίνη* dicta, quæ Nativæ preciosior habetur, cujus præparationem tradit *Plinius lib. 33. cap. 5.* In usum Pictorum (qui eam *Verditer* vocant) potissimum cedit. Vel ex Cypria ærugine, urina pueri impuberis, & Nitro.

IV. *Spodos Subterranea*, aliàs *Spodium*, nomine à *Mauris* translatus; *Soot of Brass*. Quam fieri vult *Agricola*, cum ignis, quo Metallici duritiem saxorum rumpunt in cryptis, cuniculis, puteis; aut occulta terræ incendia urunt vel Cadmiam, vel Pyritem, vel Plumbum, vel aliud quid simile. *Serapio*, qui ejus primus meminit, tres species proponit, albam, viridem, luteam rubore aspersam. Exsiccat, abstergit quandoque sine morfu, quandoque vero adeo exedit, ut si in cutim scabiolam aut exulceratam incidat, ad ossa usque carnes erodat, sine aliquo insigni dolore; quod de *Albergia* refert *Agricola*.

V. *Pyrites* (ita dictus, vel quod ex eo ignis excutitur; vel quod ignei sit coloris) Arabibus *Marcasita* & *Zeg nigrum*; aliis *Lapis Luminis*, & *Marcasita Cuperosa*; item *Lapis Aerarius*, (quod in *Aëris* fodinis copiose invenitur,) *Firestone*, & *Sparthaste*, & *Cuperstone*. Purus lapis non est, sed aut Metallum, aut alterius cujusdam materiæ quippiam in se continet. Species ejus variae recensentur: viz. *Pyrites* (1,) *Argentei coloris*; (2,) *Aurei coloris*, majoribus constans granis; (3,) *Aureus Tessellatus*, ex variarum figurarum politis constans tessulis, nunc majoribus, nunc minoribus, maxima ex parte quadratis; (4,) *Aureus Granulatus*, granis constans inæqualibus, angularibus, aureis, quibus quiddam cœrulei est admixtum; (5,) *Ex auro & Argento mistus*, granis majoribus; (6,) *Cinereus*, cum Marmoris albi & grisei frustulis interpersis; (7,) *Varius*, solidiori constans materia, in quo cernere licet flavedinem Auri, candorem Argenti, rubedinem *Aëris*, nigredinem Ferri, purpureum præterea, cœlestinum, aliosque colores tanta varietate inter se mistos, ut lusum Naturæ in coloribus miscendis mirari satis non queamus. Horum omnium generum *Pyrites* apud nos in *Anglia*, maxime in littore Orientali, copiose inveniuntur.

VI. *Saxa Metallaria*, ex quibus Metalla excoquantur; in specie (1,) *Fissile*, Germanis *ter stücker*, nobis *Slate* dictum; coloris cœrulei, aliquando nigrius, aliquando albidius. (2,) *Quartzum*,

zum, cui Auri scintillæ quandoque adhærent. (3,) *Spatum*, Angl. *Spat*, quod politius & durius est cæteris, inde nonnullis *Marmor Metallare* vocatum, & *Silber-Spat*. (4,) *Corneum*, *Pernitios*; aut *Pernit-Spat*; quod durissimum, colorem cornu referens, & partibus constans adeo continuatis, ut unam ab altera discernere quis nequeat. (5,) *Arenosum*, *Sandstone*, ex quibus, ubi conspicuæ sunt magnitudinis, *Molæ* (*Mill-stones*) fiunt.

VII. *MICA*, Corpus Metallicum; Argento simile, quod in Marmoribus & Saxis Arenosis lucet, ut & in lapidibus, sed ex iis separari nequit: nostrates *Glimmer* & *Cat-Silber* vocant.

Artificialia, five quæ ex enumeratis Ars elicit, dum priora tractat & perficit, sunt

I. *CORRULUM*, *the Blew salt of Silber*. Quod ex Argento fit duplici modo, ab *Agricola de nat. Fossil. lib. 9. cap. 17.* descritto.

II. *ÆRUGO*, *Æs Viride*, *Verdigrise*; quæ ex *Ære* & *Aceto* præparatur: & est vel

1. *Rasilla* (quia ab *ære*, *Aceti* vapore per aliquot dies infecto, abraditur.) Græcis in specie *ἰσχυρὸν* nominata.

2. *Vermicularis* (quia ad similitudinem Vermiculorum coacta est,) vel *Fossilis*, quæ sponte adnascitur lapidi *Æratio*, vel *Artificialis*; quæ fit ex *Ære*, *Aceto* acerrimo, *Alumine* & *Sale*, addita quandoque *Urina*. Modum pluribus declarat *Agricola*. Hæc à quibusdam nominatur *Solecia*.

3. *Santerna*, quibusdam *Corysocola Faltitia*, *Artificial Bojar*, aut *Goldsater*. Quæ conficitur, cum in Mortariis ex *Ære* *Cyprio*, infunditur *Urina* pueri, & pistillo ex eodem *ære* facto circumagitur. Ex his *Æruginis* speciebus, sola *Rasilla* jam in usu est. Præter usum quem Pictoribus præstat, in arte Medica locum *Æris* usui supplet; sed acrior & efficacior est.

III. *FERRUGO*, *the Rust of Iron*; quæ variis modis conficitur; optime vero cum *Scobs Chalybis puriss.* (*filings of Steel*) *aceto* acerrimo immergitur, ut acetum supermineat quatuor digitis: tum flosejus ascendit & olei modo *aceto* innatat; hic per interval- la colligitur & exsiccatur ad *Usum Medicos*.

IV. *CROCUS MARTIS*, qui variis etiam perficitur modis; vel per Reverberationem, vel per vaporum ex rebus & liquoribus erodentibus exhalationem; de quibus consule *Sennertum Institut. Medic. lib. 5. part. 3. Sect. 3. cap. 15.*

V. CERUSSA, Græcis *ῥιμύθιον*, *Ceruss*, aut *White-lead*: Quæ est Plumbi rubigo, & paratur eodem fermè modo, quo *Ærugo*; laminis Plumbi nigri super vaporem Aceti Appensis, donec plane fuerint corrosæ. Vim habet refrigerandi, exterius applicata, & candorem faciei conciliat: sed intra admissa, lethalis est. Datur etiam *Cerussa Cinerea*, quam quidam *Cinerem Plumbarium* vocant; quæ fit, cum Cerussa trita in ollam novam conjicitur, & rudiculis continenter movetur, donec cineris colorem acquisiverit; tumque exempta refrigeratur.

VI. MINIMUM, *Cinnabaris*, *Σάνδρα*, aliis *φύρον*, (ab Hebraico *Phuk*, quod *Stibium* notat; unde Latinum *Fucus*) Plinio *Sandice*; Vitruvio *Sandaracha*; Angl. *Cinnaber*, aut *Red-Lead*. Ex Cerussa fit in patina super ignem locata & usta, quæ rudicula continue agitur, donec colorem Minii acquisiverit. Pictores ad colorem rubrum inducendum eo utuntur: in Medicina quoque ejus usus est haud rarus.

VII. BIANCA *Alexandrina*, seu *Album* Hispaniæ, Spanis *Paint for Ladies*. Ita ex Plumbo albo seu Stanno conficitur, ut Cerussa ex Plumbo nigro. Usus præcipuus est ad fæminarum fucos; cutim enim dealbat & candidam reddit.

VIII. FLOS ÆRIS, *Brass-flower*. Constat ex minutis Æris granulis, Milii specie, à reliquo ejus corpore resultantibus, cum fervens Æsaqua extinguitur. Græcis *ἀνθρ. χαλκῷ* vocatur. Optimus censetur, qui facile teri potest in pulverem rufescentem, & modice splendentem. *Collyriis* mistus palpebrarum asperitates & fici tollit.

IX. SQUAMA ÆRIS, Græce *λεπίς*, *Brass-scales* aut *Cinders*. Malleorum nempe ictibus decutitur, ubi æs elaboratur. Optima censetur crassa, æris modo rubens; quæ cum Aceto aspergitur, æruginem ducit. Viribus & usibus cum Flore convenit. Hodie *Medici* Æruginè contenti sunt, & reliqua raro in usum admittunt.

X. SQUAMA FERRI & CHALYBIS, *Smiths Cinders*: quæ pari modo ictibus excutitur ferro & chalybe candenti. Plinius *Στόμωμα* vocat. Majorem obtinet adstrictionem, quàm Squama Æris, & ad contumacia ulcera vim habet insignem.

XI. SCORIA, Græcis *Σκωρία*, *Recrementum*; Germanicè *Slacken*; nobis *Dross*. Quod purgamentum est venæ metallicæ, in fornace excoctæ; & cum Metallum in catinum defluerit, de eo detrahitur. Supernatat hæc Metallo olei modo, tenax & lenta quamdiu fusa est; frige facta autem congelatur, & fragilis redditur, ut vitrum. Fit ex venis Auri, Argenti, Æris, Ferri, Plumbi utriusque: & Metallarii eadem utuntur ad venas agrestiores citius fundendas.

XII. LAPI-

XII. LAPIDIS ORBS, qui post scorias extrahuntur ex catino, siue sub ipsis sit Metallum, siue non, plerumque aliquid Metalli in se continent.

XIII. DIPHYRGES, quasi *bi tostum*, corpus Metallicum; Germanis *Butter-ofenbruch*, quoniam in fundo fornacum reperiri solet; the *scuff or refuse of Metals remaining in the bottom of the melting-pans*. Quatuor ejus constituuntur genera, quæ omnia constant lapide Aëroso torrefacto, cremato aut excocto. Ulceribus rebellibus accommodatum præbet medicamentum.

XIV. VITRUM, Glas; quod ad scorias referunt plerique, ob substantiæ & fusionis similitudinem; & quia cum fustum est, trahitur instar visci, refrigeratum autem fragile redditur. Hujus Recrementum, Fal Vitri, Glas-gall, aut *Sandstein* dicitur: quod Artifices ad Argenti scobem, cum ex ea massam conflare volunt, addunt, ut citius igne liquecat.

XV. CADMIA FORNACUM, quæ fit ex Pyrite & Cadmia Metallica fossili. Ejus quatuor inveniuntur species, quas optime descripsit Ol. Wormius, *Musæi sui pag. 134.*

XVI. POMPHOLYX, (ἀ πομφολυγῆν, *ad modum bullæ tumere*; quia dum excoquitur, in bullas tumet,) quæ differt à Cadmia, eo quod non in solidum corpus condensetur, sed tenuis farinæ instar fornacum parietibus adhæreat. Fit autem ex eadem prorsus materia; cum Æs ex lapidis partibus excoquitur torrefactis, aut cum separatum ab Argento, in sui generis formam perficitur; tum favilla sursum fertur & evolat in superiorem domicilii partem, adhærens ejus parietibus & tecti laqueario; quæ primum in bullas ut aqua tumet, mox majore accedente incremento laparum penicillis assimilatur, quandoque ærei coloris, quandoque cinerea, qualis vulgo in officinis prostat. Hoc pacto sponte sublimatur; sed quomodo cum cura & de industria præparetur fusiùs vide apud *Agricolam*. Usus ejus præcipuus est in Cancrosis & Malignis Ulceribus: additur tamen nonnumquam Collyriis, quæ oculorum fluxionibus, pustulisque *φλυκταινῶν* dictis adhibentur.

XVII. SPONGOS *Fadus*, quibusdam *Cinerula*; Germanis *Buttenbruch*; quæ eo tantum à Pompholyge differt, quod gravior sit, cinerea, aut lutea, partim adhærens fornacum lateribus, partim decidens in solum, unde aut de lateribus abraditur, aut in terra convertitur. Easdem quoque quas Pompholyx vires obtinet, sed non adeo tenuium est partium.

XVIII. LITHARGYROS, *Lapis Argenti*; Latinis *Spuma Argenti*; rectius, iudice *Agricola*, *Spuma* aut *lapis Plumbi*; quia ex eo, non verò ex Argento conficitur: Germanis *Glett* aut *Silber-glett*; Anglis *Litharge*, aut *Silver-glett*. Fit ex Plumbo diutius in fornacibus cocto, donec convertatur in substantiam quandam olei mo-

do liquidam, quæ frige facta concrefcit in fimilitudinem Spumæ. Hoc autem contingit, cum Argentum Plumbo miftum, purgatur in fecundis fornacibus; unde nomen fuum contraxit. Modi autem, quibus fiat, plurimi funt; omnes ex *Agricola* difcendi. Duum generum eft; coloribus faltem differentiam conftituentibus. Una *Chryfitis*, quæ fulva eft; aurei quafi coloris, *Litharge of Gold* proinde dicta: altera *Argyritis*, candida, ad Argenti colorem accedens, eaque de caufa *Litharge of Silver* nominata, quæ præfertur Chryfiti. In modo concretionis etiam differentia quædam obfervatur; aut enim folida eft, Græcis *Stereotida*; aut Inflata, *Pneomene* dicta. Commendatur in primis ad Intertrigines, exiccando enim cutim reftituit.

XIX. PLUMBAGO, Græcis *Μολύβδαινα*, à *Plumbo* appellati-
one fumpta. Fit enim ex Plumbo: fed non unius coloris eft, fu-
prema quippe ejus pars ad Lithargyrium accedit, infima cinereum,
media ex utrifque mifta. Suprema reliquis præfertur. Vim habet
Spumæ Argenti, aut Recremento Plumbi fimilem. Si ad manus
non fit, *Lithargyros* ejus loco fubftitui commodè poteft. Sed ni-
mis jam multa, pro inftituto noftro, de Foffilibus.

XX. Coronidis tamen loco, ut Pictoribus & Statuariis (five
πλαῖται funt, five *γυφογράοι*, five *λιθογράοι*, five ex ligno defecto-
res: horum quippe omnium rem perfpexit habere intereft:) ar-
canum, quo inter Chymica nil reconditius, patefaciendo, qua-
dantenus gratificarer; addere libuit Aurum Musicum, quod a-
liis *Mufivum*, vulgo *Mofaicum* dicitur; forte ex eo, quod fimilitu-
dinem quandam habere videatur cum eo Auri factitii genere, quod
Veteres Mufarii utebantur in operibus fuis Mufivis, hoc eft, pa-
vimentis & lacunaribus; quæ ex variis lapillis teffellulatis five qua-
dratis, in pifcium, quadrupedum, Satyrorum, aliarumque re-
rum effigies emendate & graphicoteris difpofitis & coagmentatis
conftabant: quorum hodie etiam nonnulla, fed temporis injurias
perpeffa, fupersunt exempla. Unum oftenditur juxta *Cumas* Italiæ,
in antro *Sibyllæ* dicto: Alterum Romæ, inter *Neronis* palatii aurei
reliquias. Nos etiam ejusmodi opere Mufivo fuperbimus; eo ni-
mirum, quo Nobiliffimum illud *Edvardi Confefforis* monumentum
Sepulchrale, in magnificentiffimo templo Weltmonafterienfi ex-
tans, elegantiffime exornatur. Sed, nè longius ab inftituto di-
grediar, *Aurum* hoc *Muficum* hujusmodi artificio præparatur.

& *Stanni* illius generis, quod Stannariis noftreis *Black Tin* voca-
tur, libram unam. In catino liquefiat; illique, dum adhuc in
fufione eft, fenfim addantur primò *Mercurii* crudi libræ duæ, de-
inde *Salis Ammoniaci* libra una, & poft paucula temporis momen-
ta, *Sulphuris* communis tantundem: fpatula lignea levitèr agitan-
do, ut arctius confociantur. Tum ab igne remota, terantur fimul
super

super laminam marmoream, & in pulverem tenuissimum ac lævissimum laboriose redigantur. Qui in vas fictile vel vitreum, sublimationi accommodatum, & capite cæco, (ut vocant Chymici) in cuius tamen vertice foramen exiguum, nempe apicis digiti minimi capax, factum est, instructum, immissus in fornace sublimatoria collocetur: & succensis carbonibus urgeatur, donec bona mixturæ pars vaporum specie exhalaverit: interim prospiciendo, ne dictum foramen exhalationum agmine plane obstruatur. Cesante fumo, subtrahatur ignis, & postquam omnia sponte refrixerint, auferatur caput. His rite peractis, collo vasis circumcirca, annuli in modum, adhærentem videbis florem quendam aurei coloris, & butyri instar mollem: qui exemptus: & à Mercurii crudi una ascendentibus particulis quibuscunque separatus, est verum *Aurum Musicum*. Quo πλασσαι potissimum utuntur, ut ex gypso argillave effictis Magnatum statuis colorem *Æris* vel *Orichalci* æmulum inducant.

Quod ut melius præsentent, statuas primo oblinunt pigmento quodam, ex *Umbriae* & *Ochrae luteae* partibus æqualibus, lævigatione in pollinem redactis, oleoque puro probe contemperatis, confecto: eique jam pene exsiccat & alterum deinde superinungunt, quod ex *Auri Musivi* polline, & pinguiori oleo *seminum Lini*, radiis solaribus prius clarificato, commixtis, & in marmore diuturna circumactione contritis, constat. Si vero *Cupri* colorem Paradigmatis suis Gypseis inducere constituent, tunc priori pigmento admiscunt dimidiam proportionem *Ochrae rubrae*, cum *Cinnabari* vel *Minii* paulillo. Sin *Æris* jam veterascentis atque ad viriditatem in superficie inclinantis color (qualem in æneis antiquorum statuis, & vetustioribus tormentis bellicis cernimus) gratior videatur: tum *Ochrae rubrae*, & *Minii* loco, *Æris viridis* tantillum substituunt. Hocque pacto alterutrum è dictis Metallis tam affabre mentiuntur, ut sic coloratas statuas, non ex Gypso Argillave in proplasmate siccata, sed ex solido ære vel Orichalco arte fusoria effictas esse, haud immerito crederes. Hanc Colorationem (qua uulla alia aut oculis magis grata, aut aëris injuriis obnoxia, eis, qui in arte plastica versantur, hætenus innotuit,) nostrates *Βρυντίν* vocant.

F I N I S.

APPENDICULA

DE

Colorum differentiis & nominibus,

Deque

Pilorum Plumarumque Coloribus.

Qq

CONFIDENTIAL

1 2 3

Page 10 of 10

○ 五

... 500 ...

50

A P P E N D I C U L A

D E

Colorum differentiis & nominibus ;

Deque

Pilorum Plumarumque coloribus.

B R E V I A R I U M A P P E N D I C U L Æ

S E C T. I.

1. **G**eneralis colorum genealogia. 2. Unde fit, ut tanta sit colorum varietas. 3. Quare perarduum sit, aut omnes enumerare colorum species, aut suum cuique nomen assignare. 4. Esse Autoris in hac appendicula consilium, non omnes, sed præcipuos tantum, & quibus Antiqui distincta imposuere nomina, colores percensere. 5. Rejicitur vulgaris colorum in primarios & secundarios divisio: & 6. Rectior ejus in locum substituitur. 7. Albi coloris ratio formalis, & graduales differentia. 8. Nigri generatio & species. 9. Flavi natura & tribules. 10. Origo Rubri, ejusque familia. 11. Cærulei prosapia & tribus. 12. Compositorum colorum primordia. 13. Viridis parentes ac discrimina. 14. Purpurei genera. 15. Griseus cum affinibus suis censetur: & 16. Fuscus cum suis. 17. Badius, ejusque congenes. 18. Conclusio Sectionis primæ.

S E C T.

1. **Q**ui colores à natura pilis denegentur. 2. Quantum sit similitudinis pilas inter & plantas. 3. Quantumque diffimilitudinis. 4. Referuntur pili ad classem Epiphytœn. 5. Unde, à quo, & quomodo pili generentur. 6. Pilorum in congenitos & postgenitos divisionem homini potius competere, quam brutis. 7. In brutis color pilorum fere sequitur cuticulæ colorem; præsertim in Scurulatis. 8. Quinam colores pilis conveniant: eorumque series. 9. Cur quatuor elegantissimi colores, viridis nempe, cæruleus, purpureus, & sanguineus, pilorum naturæ disconveniant. 10. Cur isti colores tamen avium plumis familiares sint. ¶

Oropæ-

S E C T I O I.

1. **G**Ratissimum illud naturæ phænomenon, quod *Colorem* vocamus, & in cujus propemodum infinita varietate mundi hujus adspectabilis pulcritudo potissimum consistit, à Platone (quem omnis & Græca & Latina vetustas Homerum & Oceanum Philosophorum jure meritoque appellavit) in genere ita definitur, in *Menone*, χρῶμα ἢ χρῶς ἐστὶν, inquit, ἀπορροή σχημάτων ὅ-
 ψει σύμμετρος καὶ αἰσθητός: *Color est defluxio quædam de figuris rerum oculis consentanea & exposita.* Et rectissime quidem; saltem si per ἀπορροήν σχημάτων, solius *luminis* de objecto visibili defluxio intelligatur. Non enim ex ipso corpore opaco, quod intuemur, ulla istiusmodi effluvia, quæ ipsius figuram visui repæresentent, ejaculantur; quemadmodum *Epicurus* ejusque sectatores precario statuere: sed solum *luminis* in illud incidentis, & ab ejusdem superficie physica, post determinatam quandam perturbationem seu modificationem, resilientis in oculi pupillam radii, nervi optici delicatissimas fibrillas in retinæ tunicæ expansionem mire contextas, blande atque congruenter feriendo commovendoque, sensorium afficiunt; motu illo, quem sic imprefferunt, per tensum nervi funiculum, introrsum ad principis facultatis tribunal in cerebri meditullio erectum, continuo delato.

2. Sicut vero corpuscula illa, seu corpusculorum molecularæ, ex quibus hujus vel illius objecti visibilis superficies constat, sui magnitudine, figura, ordine, contextura, & nonnunquam etiam motu variant: ita pariter & in eam impingentis luminis radiorum cum refractionem tum reflexionem variari, necessum est; & per consequens æque necessarium, ut motus quoque in sensorium impressus, pro varia ipsum excitantis luminis modificatione, diversificetur.

3. Ex ista ergo luminis refractionum reflexionumque varietate, quæ superficierum in rebus visui expositis varietati semper respondet, ideoque numero incomprehensibilis est; ingens illa, quam in amœnissimo Mundi hujus theatro cernimus & admiramur, diversitas colorum videtur resultare. Hincque plura sunt (*Favorini* apud *Agellium Noct. Atticar. lib. 2. cap. 6.* loquentis verba recito) "in sensibus oculorum, quam in verbis vocibusque colorum discrimina" nec minus arduum videtur, varias eorum differentias & gradus ad calculos redigere, quam cum *Archimede* numerum definire
 (R r) arena-

arenarum globi hujus Terraquei molem constituentium. Hinc etiam factum est, ut vel inter præstantissimos naturæ consultos, de colorum distinctione ac propriis nominibus, quibus singuli in unoquoque eorum genere distinctim observati, à cæteris omnibus dignosci debeant, disputantes tanta exorjatur opinionum dissentio, ut plane ἀδύνατον sit eas ad concordiam revocare, & quis color hoc vel illo nomine demum intelligendus veniat, determinare parandum; maxime ubi plura synonyma rebus, quoad apparentiam quidem affinis, revera tamen (vel ipsomet sensu judice) ab invicem discrepantibus adhuc spissiore confusiois umbram fecerint. Adhæc, adeo nobis incerti sunt uniuscujusque vel ex præcipuorum numero coloris termini seu limites, ut per pauci ex illis reperiantur, quos ita verbis liceat definire, ut vel *Apelles* ipse aut *Parthasius*, ex descriptione data, eos vivis coloribus exprimere sciat.

4. Non est igitur, *Cordate Lector*, quod à nobis hoc in loco, aut accuratam expectes χρωματολογίαν; aut eorum qui in uniuscujusque ex palmariis coloribus latitudine occurrunt, graduum scalam desideres. Hanc enim summa cum laude immortalis noster *Glossenius* dudum jam administravit provinciam, in opere suo docto Jupiter & laborioso *de Ventr. & Intestinis* cap. 9. Et nostro equidem sufficere instituto, si in tanta colorum immensitate, eos præcipue ad genera sua, hisque subordinatas species retulero, quos, ut cæteris conspectiores, antiqui dignos existimavere, qui definitionis ergo propriis nominibus insignirentur. Id quippe mihi superest negotii ad opusculi hujus complementum, ut varias colorum differentias & nomina, quorum supra, in Animalibus præsertim ac Fossilibus ad ipsius naturæ veritatem describendis, fui mentionem facere coactus, Anglico idiomate aggrediar interpretari: hocque in juventutis, nostræ potissimum, harum rerum studiose gratiam; ne scilicet nomenclatorum & Lexicographorum vulgarium erroribus implicari, uspiam de vero animi mei sensu deflectant, qui ob Latini sermonis inscitiam, ambigua & sæpe infida istorum oracula consulere adducuntur. Horum itaque in Latio peregrinitati ut, quantum par est, subsidium præstam; Ονομαστικὸν χρωματικὸν paucissimis comprehensum, appendicis loco, subjungam.

Cæterum, ut rationes quibus, velut fundamentis, genuinæ colorum *differentia*, quas in medium allaturi sumus, superexistuntur, facilius intelligantur, æquum est & conveniens, ut paucula ad earum & claritatem & sanctionem conducantia præmittamus.

5. Observandum igitur, colores omnes à vulgo Philosophorum haud satis recte in *primarios* distinguere, & *secundarios* ex primariorum varia commistione resultantes. Nam, ut solertissime pro more suo observat *Cl. Glossenius*, unumquemque è *secundariis* live

Cut

(ut ab elegantissimo *Tardino*, de *Pis animal.* cap. 3. & aliis dicuntur) *intermedios*, pallidum scilicet, rufum, flavum & rubrum, tam ab albedine quam à nigredine, non gradu tantum, sed etiam specie, differre certissimum est. Etenim à maxime diluta nigredine, quæ vix discerni possit ab albedine pura, possumus gradatim plus nigredinis admiscendo minus albedinis, pertransire omnes gradus inter albedinem & nigredinem assignabiles, denumque ad ipsa confinia coloris absolute nigri pervenire; & interim non percurrere dictos intermedios colores specie distinctos; quod impossibile foret, si ii ex. mæta albedinis & nigredinis mixtura emergent. Supponitur enim hic, omnes gradus mixtura simplicis albedinis cum simplici nigredine percurri; & consequenter necesse est, ut omnes intermedii colores ex illis solis conflati una percurrantur. Verum vel exinde, quod (sive sensim diluendo nigredinem, sive albedinem intendendo) ex sola mixtura istorum duorum, quos *primarios* vocant, nunquam pervenire possimus ad flavedinem, aut rubedinem, aut fortasse ad veram cœruleum colorem; manifestum est, eos ex sola albedine ac nigredine commixtis non constare; sed aliunde exoriri.

Undenam? inquires. Indubie, mediis illi colores suam quisque de proprio adferunt tincturam, quam nec albedo nec nigredo è suo penu sufficere queunt. Si amplius adhuc quæres, quid intelligi per illam *tincturam* velimus; respondemus cum *Glissono*, modificationem quandam luminis, sed diversi plane generis ab illis modificationibus, quæ albedini & nigredini competunt. Qualis vero sit ista luminis *modificatio*, unde huiusmodi exurgat tinctura; idem excellentissimus *Autor* disertissimis his explicuit verbis. “ Duobus, inquit, modis hæc modificatio fit, vel reflexione, vel infractione. Quamvis enim albedo & nigredo à corpore tantum opaco, & per viam reflexionis emanare possint; intermedii tamen colores, nempe obliqui modo memorati, non tantum ab opaco corpore reflecti, sed & per infractionem luminis à corpore diaphano produci queunt: ut coloribus iridis, prismaticis, sique ex lumine transmissio per vitrum coloratum factis, constet. Sed hæc ex iis, quæ de singulorum colorum ratione ac genesi mox dicenda venient, uberiorem accipient lucem. Interim ex jam dictis luce meridiana clarius est, intermedios colores non ex varia extremorum confusione ortum suum ducere; & consequenter illos ab his non tantum gradu, sed & specie discrepare.

6. Diruto hunc ad modum vulgaris colorum divisionis in primarios & secundarios fundamento; æquum est, ut magis firmum ejus loco jaciamus. Supponimus ergo, è coloribus aliis esse *simplices*, alios *compositos*: & simplicium dari unanimo quinque species; scilicet, *nigrum*, *flavum*, *rubrum*, & *cœruleum*; horumque singulos, pro variis intensiois ac remissionis gradibus, diversificari. Suppo-

Supponimus etiam, *compositorum* adeo immensam existere sylvam, ut intellectus noster ipsa eorum multitudine obruatur, tantum abest, ut assignare suum cuique nomen distinctum valeat. Quoad varios autem simplicium *gradus*, eos certis suis finibus circumscripsit, & in *Scalas* quasdam ita digessit solertissimum *Glissonii* ingenium, ut ad certam significationem determinentur. Ad ipsum itaque plura de abstrusissimo hoc theoremate scire cupientem remittimus lectorem.

Jam vero hisce διδασκαλίαις χάριν præmissis, ad promissum Ονομαστικῆ χρωματικῆ compendium accedimus.

7. In SIMPLICIUM colorum classe, summum sibi locum vendicat ALBUS: qui semper à lumine sine tinctura reflexo, simulque quoquoersum disperio & vigorato exoritur. Ubicunque enim hi tres reflexionis modi in cujusvis corporis superficie concurrunt, ibi lumen inde reflexum sub albi specie oculis repræsentatur. Color hic *Latinis* etiam candens, candidus, albens dicitur; *Græcis* λευκός, ἀργός, φαλῆρός; *Angli* white, ab Anglo-saxon. Prit, quod dealbare significat. Ad hunc vero spectant

1. Niveus, χιόνεος, Snow-white.
2. Lacteus, γαλακτικός, γαλερός, Milk-white.
3. Eburneus, ἐλεφαντίνος, Ivory-white.
4. Marmoreus, alabastrinus, μαρμαρίος, Marble-white.
5. Argenteus, ἀργύρεος, Silver-white.
6. Fulgidus, fulgens, resplendens, λαμπρός, Pearl-colour.
7. Crystallinus, κρυσταλλίνος, Crystalline.
8. Pallidus, remisse albus, ὠχρός, κλωρός, ἄχρος, Pale, aut faint-white.
9. Aqueus, ὕδαρινός, Watery-white.
10. Albidus, albulus, exalbidus, subalbidus, candidulus, subcandidus, ὑπόλευκος, whitish, aut tending to white.
11. Canus, πολιός, λευκάνθης, φορκός, Hoarie; ab Anglo-sax. þaf, canus; vel forte à Græc. ὠρίος, tempestivus.

8. Alter extremorum est NIGER; cui ortum dat lumen ita reflexum, ut coerceatur simul & hebetetur, five (quod idem est) haud exigua ex parte in objecti superficie absorbeatur: hæ namq; luminis modificationes simul contingentes nigrum colorem semper producant. Dicitur apud populares meos Black, ab Anglo-sax. blac, atramentum. Hujus præcipuæ species five graduales differentię sunt

1. An-

1. Anthracinus, melaneus, μέλας & μέλαινα, **Cole-black.**
2. Piceus, πικρῶδης, **pitchy black.**
3. Coracinus, (ἀκούραξ, corvus) **Raven-black.**
4. Æthiopicus, **Negro-black.**
5. Fuliginus, fuliginosus, λιγνυῶδης, **Sooty-black.**
6. Nigellus, nigricans, subnigricans, ὑπομέλας, **Blackish, aut tending to black.**
7. Pullus (non, ut Perotto placuit, à pullis avium, qui fere isto colore nasci vulgo quidem, sed falso perhibentur; non à pulvere, ut in *Ætio* suo scribit *Jovianus Pontanus*; neque, ut *Cæsar Scaliger in Exercitat.* 325. censet, à purus; quia color hic αὐτοφυής est ac natus, qualis plurimum color penularum, unde infima Romanorum plebs, quæ pro toga penulam gestabat, pullata dici solet: sed, si *Vossium* audimus, à πέλος, five πέλος five πέλας, vel etiam πέλειος (omnibus enim hisce modis hæc vox scripta invenitur) s. in u converso. Est autem πέλος idem quod μέλας, niger; teste *Suida* & *Etymolog.*) **black-brown, such as the colour of the wool of Black Sheep.**
8. Tertio venit loco colorum simplicium ΜΑΥΡΟΝ, primus, nempe FLAVUS: qui non quoquoque lumen dispergit, ut albus; sed oblique recedens ab albedine nigredinem versus, modice ac suaviter dilatat radios lucis, & aurea quasi illecebrosa oculum ad intueundum invitat. Dicitur etiam fulvus, fulvidus, silaceus, ξανθός, πυρρός, **bright yellow** (ab Anglo-sax. geolu, vel gealle, quod *fel* indicat: aut à Græc. γαλεῖν, splendere, ut *Martinius* deflectit) à quo gradatim differre censentur
 1. Luteus, χλωρός, ὀχρῆς, **yellow like the yolk of an egg.**
 2. Aureus, aureolus, χρυσεός, ἐπίχρυσος, **Gold-colour.**
 3. Croceus, crocinus, κερκιδής, κρόκινος, **Saffron-yellow.**
 4. Æneus, χάλκεος, χαλκείος, **Copper-yellow.**
 5. Melinus, μέλινος, **yellow as honey.**
 6. Ravus (Antiquis idem quod flavus, sed proprie de maturi jam frumenti colore dicebatur; indeque Græce χαρπός, quasi καρπός, fructus) qui tamen flavo & casto medius videtur. Gallice *tane, tanne*, **from Tanners' ouste, which is of that colour**, unde nostrum **tawny**.
 7. Byssinus, βύσσινος, **yellow like raw silk.**
 8. Buxeus, πυξίνος, **Box-colour.**
 9. Citrinus, **Orange-colour.**
 10. Limoneus, **Limon-colour.**
 11. Xerampelinus, ξηραμπέλινος (à ξηρός aridus & ἀμπέλινος, viteus) qualem in arefactis vitium foliis videre est; Gallice, *fent*

feu' a mort, the colour of bine leafs.

12. Leoninus, λεόντιος, λεοντώδης, **Lion-colour.**

13. Electricus, ἡλεκτρικός, **Amber-yellow.**

14. Paleus, ἄχυρος, **Straw-colour.**

15. Luteolus, subflavus, ὑπόχλωρος, **yellowish**, aut **inclining to yellow.**

16. Ex albo flavescens, *Isabella*, **white with an eye of yellow.**

10. Quartus locus debetur mediis secundo, viz. **RUBRO.** Qui ex lumine pariter exsurgit, ita tamen reflexo, ut radii minus quam in flavo dispersi, & obliqua remissione quodammodo exasperati, oculum quasi atterant quidem. sed & fulgente simul vibratione oblectent. Unde fit ut color hic, maxime ubi intensus est, nonnihil ferociae præ se ferre videatur. Summo in gradu constitutus, & splendoris quidpiam evibrans, *Coccineus* dicitur, & *Phenicem*, itemque *Puniceus*; Anglis, **Scarlet**, à Gall. *escarlate*, Hisp. *esarlata*; Ital. *Scarlato*; Teuton. **Scharlack**: & ubi dibaphus est, **Scarlet in grain**, such perhaps as our best **Bow-dy**. Hujusmodi fuisse veterum purpureum arbitror. Ex remissioribus Rubri gradibus dimanare creduntur

1. Miniacus, *Vitrurio* μιτρώδης, **vermilion-red.**

2. Spadix, spadiceus (ἀπὸ τοῦ σπᾶν, hoc est *avellere*; ut proprie spadix sit ramus palmæ cum fructu ab arbore avulsus, qui coloris est ad puniceum prope accedentis) **Stammel** aut **light red.**

3. Rutilans (unde fortassis, κατ' ἀποχρῆν, fit Belgicum **root** vel **rood, red**) *πυρραί*, flammeus, (nisi fallor.) **flame-colour.**

4. Purpurissus, πορφύρεος, **Spanish red**, such wherewith **Ladies paint their cheeks and lips.**

5. Carneus, Σαρκεός, **flesh-colour**, Ital. *carnadino*, *incarnadino*. Est nempe color ex rubro albescens, carnis recens excoctæ æmulus: unde apud nostrates etiam **Carnation** audit.

6. Caryophylleus, **pink-colour**. **Pinks** vero ita nominantur à Gall. *pince*, flores scilicet Tunicis seu Caryophylli sylvestris.

7. Roseus, *Aurora*, & **blush-colour.**

8. Perficus, **peach-bloom-colour.**

9. Rufus, rufus, ξανθός, πυρεός, **Red with an eye of yellow.**

10. Rubicundus; ῥυθραῖος, sandyx, sandaracinus, sandarachinus (à sandaracha vel sandaraca, arsenicum rubrum, quod ab

ab auripigmento solo colore videtur differre; quia vel colore est saturate rubro, instar cinnabaris; vel minus rufum & sublutum) **ruddy**, **Poppy-red**, **Cherrie-colour**.

11. Sanguineus, sanguinolentus, αἱματώδης, **Blood-red**.
12. Burrhus, πυρρός, **deep crimson** (à Franco-Gall. *chermison*) Ital. *chermesi*, *chermisino*, *cremesino*; Hisp. *charmifino*: omnia ex *Chermes*, ilex coccigera, cujus glans κόκκῳ βαφικῇ seu granum insectorium inde dicitur, quod hujusmodi tincturam exhibeat. *Chermes* autem est Arabicæ originis; de qua consule *Salmasium not. Plin. in Solin. pag. 1214*.
13. Robus, robeus, **deepest** aut **darkest red**: de quo legi meretur *Vossius in Etymolog. L. L. voce robur*.
14. Rubinigemmæ colorem cum splendore æmulans, **Ruby-red**, qualem videre est in pomi granati cellulis recens apertis.
15. Mustelinus, γαλεώδης, γαλεοειδής, **Weasel-red**.
16. Rubellus, subrubeus, rubicundulus, ὑπερυθρός, **redish**, aut **tending to red**.

11. Agmen claudit simplicium placidissimus ille color, quem Latini **Cœruleum** vocant (à cœlo, quia firmamentum hujus esse coloris, sudo aere, videtur) Græci *κυάνεον* (à *σαπφείρε* lapidis, qui & *κυανός* dicitur, similitudine) Angli **Blew** (ab Anglo-sax. *bleo*, cui apprime respondent Teuton. & Belg. *blaw* vel *blaw*, ac Gallic. *bleu*) **sky-colour**, & **azure** (à Gallic. *azur*, quod est à lapide lazulo) & **ultramarine**. Ad peramœni hujus coloris in cujuscunque corporis opaci superficie (paulo aliter enim in cœruleo prismatice se res habet) productionem requiritur, ut lumen ita modificetur, ut ejus radii ab objecti superficie reflexi, obliqua quadam seu indirecta quidem, sed minori tamen quam quæ in genesi nigredinis contingit, infractione seu remissione modice reprimantur. Hujusmodi enim modificatione fit, ut pauci tantummodo radii ab objecti superficie resilientes, grato & ad nigredinem indirecte inclinante colore oculum demulceant. Huic affines sunt

1. Scyricum (à *Scyro* insula, ubi olim is color magno in pretio fuit) color ex Sinopede ac Sandyce mistus, quo minium adulteratur; observante *Plinio. lib. 35. cap. 6*. Angl. **Gentianella blew**.
2. Glastinus (à *glasto* seu *isatide*, nostratibus **woad**; Anglo-sax. *was*; Belg. **weed** dicto: cujus succo Britannæ mulieres totum corpus, in quibusdam sacris, obleverunt; & de quo consulendus est *Salmasius in Solinum pag. 254*.) **watched**, aut **light blew**.
3. Luridus, μελαίχλωρος, βασκάνος, **faint**-aut **pale blew**.

4. Ve-

4. Venetus, *Βενετός* (à quo Venetæ factioni in ludis Circensibus nomen, & qui Venetæ genti olim in usu erat vestibus, sed ab Alexandria primum deductus: nam de Auctore ita *Isidorus lib. 19. cap. 17.* Venetum colorem temperare, primum Alexandria docuit) *Callæicus*, *καλλαιῖος* (à galloꝝ palca, quæ Græce *καλλαιον* dicitur) & *γαλαῖζον*, pro *καλλαιζον*, & in γ converſo: item *Cymatilis* (ἀπὸ τῶν κυμάτων, à fluctibus) & *viridis marinus*: Angl. a light *Sea-green*. De hac tinctura vide ſis quæ *Joan. Gerr. Vossius in Cymation* dixit.
5. Turcoiſinus, à Turcoiſio lapide, *Turcois bleu*, qui prope abeſt à Scyrico.
6. Cæſius, *γλαυκός*, *blew with an eye of gray*.
7. Subcæruleus, lividulus, *ὑποκυάνεος*, *paleſt bleu*.
8. Indicus, *blew inclining to purple, called by our weſtern Clothiers Beauty*.
9. Violaceus, *ἰανθίνος*, *violet-colour*.
10. Hyacinthinus, *ὑακινθίνος*, *blew more inclining to purple*.
11. Lividus *πλιδνός*, *πῆλιος*, *darkeſt aut blackiſh bleu*.

12. Venimus nunc ad alteram colorum claſſem, à nobis in eorum generali bipartitione præſtitutam; COMPOSITOꝝ ſcilicet, qui ex varia modo dictoꝝ quinque ſimplicium contemperatio-
ne, horumque diverſis gradibus inter ſe compositis atque decom-
positis exſurgant, quorumque (uti jam ſubinnuimus) major eſt
varietas, quam quæ hactenus fuerit à quopiam vel ex iis qui de co-
loribus ex profeſſo ſcripſerunt, ad rationem & calculos reducta.
Verum tamen minime dubitandum eſt, quin ſit ſua cuique iſtoꝝ
peculiaris quædam modificatio luminis, utpote ex quo omnes &
ſinguli exoriantur. Quænam autem ſingulis competat, infinitum
eſſet determinare; maxime cum certo certius ſit, ad eundem
colorem, licet ad ſimplicium familiam ſpectet, plures modos lu-
minis coincidere in eadem ſuperficie requiri. Et nobis equidem,
pro inſtituti huius noſtri modulo, ſatis fuerit in genere indicare;
utcumque variæ ſint luminis modificationes, quæ ad tot diſtinctas
colorum ſpecies efficiendum requirantur: poſſe tamen omnes ad
tria illa, quæ ſupra deſcripſimus, genera commode revocari. Re-
lictæ itaque *Phyſico-mathematicis* iſta *χρωματολογίας* parte, ad il-
lud nos quod reliquum eſt penſi noſtri, abſolvendum ſine ulteriori
circuitu accedamus.

Ex colorum *Compoſitoꝝ* cenſu, alii *minus*, alii *magis* compo-
ſiti ſunt, & utrique ſuas quoque habent familias.

13. In minus compoſitis, primatum obtinet *Viridis* (à *vi-
ro*, quod à *vi* ſeu *vigore* deſectitur: quia ut plurimum virent plan-
tæ,

tæ, quæ necdum aruerunt, sed in suo sunt vigore) *χλωρός, ἐν-
χλωρός*. Angl. **Green** (ab Anglo-sax. *græne*, vel Belg. **Groen**, for-
te à verbo **to grow**, quia scilicet crescentium hic est color) quem
flavus & cæruleus contemperati efficiunt, quique licet dilatare ra-
dium visivum sui flavedine nitatur, per cæruleum tamen ita coera-
cetur, ut gratissima specie objectum oculo repræsentet. Hujus
præcipuæ species five gradus sunt

1. Thalassinus, thalassius, **deep sea-green**: tanto à supra
memorato colore *Veneto* distans, quanto color maris in lito-
re differt ab ejusdem colore in profundo. Hic quippe, ex ma-
jore radiorum solarium refractione fundum versus, color a-
liquanto fit obscurior: paucis tantum radiis ab aquæ superfi-
cie in oculum resilientibus; quemadmodum demonstravit *Car-
tesius Meter. cap. 9. num. 11.*
2. Prasinus, *πράσινος*, id est **porraceus**; est enim color viridis
ad similitudinem *porri*, quod Græce *πράσον* vocant; **Leek,
green** In ludis Circensibus sæpe fit mentio prasinæ factionis,
prasini ornatus, prasini agitatoris, &c. quibus quid signifi-
cetur, indicat *Juvenal. Sat. 11.* & fusc *Onuphrius Panvinus de
ludis Circensibus.*
3. Orobitinus (ab *ὀροβός*, ervum) **Green, like betches,**
aut **that sort of puls, which the Herbalists call the
bitter betch, and the Spaniards Tervo, & Tervos.**
4. Herbeus, herbidus, gramineus, viridans, **Grass-green.**
5. Smaragdinus, *Σμαράγδινος*. (à smaragdo lapide pretioso)
Emerald-green; qui præ cæteris omnibus hujus familiæ re-
splendet.
6. Psittaceus, **Poppin-jay-green**; such as the green of par-
rats, which in old English were call'd **Pope jays**, qua-
si **priests-jays**. De quo etymo vide *Skinnerum* in vocibus
Pope & jay.
7. Saligneus, *οἰσύνος*. (ab *οἰσύα*, salix) & *ἰνίος*. (ab *ἰντα*,
ejusdem significationis) **Willow-green.**
8. Vitreus, *ύάλινος, ύαλοειδής*, **Glass-green**: qui qua ratio-
ne fit à colore *Veneto* distinguendus, luculenter ex veterum
monumentis ostendit *Cland. Salmasius in not. ad Æl. Lamprid.
Heliogabalum.*
9. Subviridis, *ὑπόχλωρος*, **Greenish**, aut **tending to green**,
with a faint mixture of yellow: qualem cernere est in
plumis *Pluvialis* flavo-virescentis, Angl. **the whistling plo-
ver.**

14. *Secundum* assignamus locum **PURPUREO**, qui in genere Græce πορφυρεός, Angl. **Purple** dicitur; quique ex caeruleo & rubro potissimum videtur constari. Non simplex est, sed vel

1. Ostrinus, Tyrius, blatteus, **Purple royal**. Quomodo color hic fiat, ejusque non unum esse genus, optime omnium docuit *Vitruvius lib. 7. c. 13*. Ipsam ergo adi.
2. Dibaphus, **Purple in grain**.
3. Molochinus (à καλόχην, malva) **Pale purple, such as we see in the flowers of Pallowes**. Hic mihi videtur verus Antiquorum color Phoeniceus; dilutior aliquanto quam ostrinus. Vide sis *Fossiam* in voce *Phœniceus*.
4. Amethystinus, **Amethyst-purple**.
5. Livido-purpureus, *Grie de Lion*.

15. *Tertio* loco poni meretur **GRISÆUS**, cinereus, cineraceus, γρισηός, γρισηός, **Ash-colour, Gray** (ab Anglo-sax. Græg,) Teuton. **Gray**; Belg. **Grays**; Franco-Gall. *Grâ*. Cui affines sunt

1. Ferreus, σιδηρεός, **Iron-gray**, qui equorum proprius est.
2. Scutulatus, maculatus, μεμολυμαμένος, σπιλωτός, **Dapple-gray** (id est variegatus, seu color unus altero intermixtus: forte ab *Apple*, quasi dicitur, iuxta pomi curtispenduli, maculis variegatus: nam eodem sensu, eademque ratione, hic color Gallis *pommele* dicitur; observante *Skimero* in *Etymolog. Angl.*
3. Leucophaeus, **Light-gray**.
4. Columbinus, **Dove-colour**.
5. Gruinus, **Crane-colour**.
6. Phasianus, **the colour of a Pheasant**.
7. Elbidus, color albo & nigro medius, **Snaddell-gray**.

16. *Quarto* succedit **FUSCUS** (ita dictus, vel quod in isto colore φῶς σκιαται, id est lux immbretur; ut *Scaliger* censet 325. *Exercitat. Sect. 17*. vel, ut *Fossio* aridet, simpliciter αἴμα τὸ φῶς σκιν, quod *Hippocrati* est *usulare*; quia quæ usulantur, ex albis fusca redduntur) φαιός, **Brown** (ab Anglo-sax. & Franco-Gall. *Brun*) Belg. **Bruyn**; Ital. *Bruno*; subniger, & subaquilus, hand longe à *pelle* Romanorum recedens. Hujus tribui accensentur

1. Ferrugineus, σιδηροειδής (à Ferrugine, id est Ferri rubigine, quæ Græce ῥοσιδηρὸν est) **Rust colour, aut the colour of rusty Iron**.

2. Baticus

2. Bæticus (à *Batica* Hispaniæ regione. *Anton. Tylesius*. libello suo de *Coloribus*, ita docet colorem pullum vocari, propterea quod in *Batica* coloris ejus lanæ tingantur.) **Spanish brown, little less dusky than the Black-brown of black-Sheep.**
3. Hiberus, ex nigro & rubro mixtus, **Murrey** (vel à colore *Maurorum* obscuro: vel, ut *Covarruvius* divinat, ab Hisp. *mora*; morum; quasi dicas, color *mori*, qui est è rubro innigrum declinans) Gall. *moree*, *morel.* & *moreau*; Ital. *morello*; Hisp. *morado*.
4. Castaneus, **Chestnut-colour.**
5. Murinus, **Mouse-colour.**
6. Subfuscus, subaquilus, **Dunn**; cujus vocis origo vel ipsomet colore obscurior est.

17. Hanc minus compositorum colorum classem terminat **Badius** (ἀπὸ τῶν βαιῶν, id est à ramis palmarum, qui eo colore insigniuntur.) **Bay** (à Gall. *Bay.*) Invenitur apud *Homerum* Βάδης, nomen equi Achillis; quem alii velocem, alii maculosum, nescio quam recte expouunt. *Skinn.* Hujus commatis censentur

1. Helvus, helvulus, inter album & fulvum; **Sorrel**: à Gallic. *Saur*, *Saure*, & *Soret*, Ital. *Sauro*, & *Saurello*: omnia ut conjectare fas est, à Latin. *Sature*, est enim saturus color.
2. Gilvus, figlinus, **Witch-colour.**
3. Milvinus, **Mite-colour**

18. Hæcque quidem summula est tam *simplicium* quam *minus compositorum* colorum, quos in præsentia possumus in memoriam revocare. Superfunt adhuc, qui ex multiplici *utroque* confusione ortum suum trahant: quique proinde sint numero propemodum infiniti. Hos autem intactos propterea relinquimus omnes; cum quod eorum perpauci propriis dignoscantur nominibus, sive apud Latinos; sive apud populares nostros inveniendis: tum quod eosdem figillatim per periphrasin descriptum ire, seculi opus foret; nobis præsertim, qui tam in Latii Sermone, quam in arte pingendi hospites finis & peregrini. ¶

Sicr.

S E C T. I I.

De Pilorum, Plumarumque coloribus.

RESTAT ut ostendam, atque aliquando perorem, quas ex modo enumeratis colorum speciebus natura quadrupedum pilis præsertim concefferit, quasque plumis avium: quandoquidem non omnes eam promiscue atque ex æquo utrisque indulgisse, experientia quotidiana compertum est.

Quantum igitur ad pilos attinet; notissimum est, colores esse nonnullos, *viridem* nempe, *cæruleum*, *sanguineum*, & *purpureum*, quos natura omnium, quotquot hætenus nobis conspiciere licuit, Brutorum pilis sine ulla exceptione denegasse videatur. Hujus vero rei ratio ut melius inquiratur; æquum est & conveniens, paucula de natura & generatione pilorum præstruamus.

2. Primo itaque loco sciendum, *pilos* quidem, quibus quadrupeda fere omnia, & exornantur, & adversus quamcunque aeris inclementiam muniuntur; & quibus ipsemet etiam Homo, universalis Animalium dominus, qua venuustatis, qua majestatis ac verecundiæ quoque gratia, decoratur; quam proxime accedere ad naturam *vegetabilium*: hocque vel ex eo satis constare, quod ex radicibus suis exsurgentes, ex plantarum more, vivant, nutriantur, longitudine augeantur, temporisque progressu pariter confescentes, tandem emoriantur, sponteque decidunt.

3. Hos inter & illas tamen haud simplex interesse videtur discrimen. Nam (1) pili *spon*te natorum numero accensendi sunt; plantis autem ortus est ex *semine vitali* in terræ gremium coniecto. (2) Hæ humo enatæ, alimento aluntur à se ipsis tantum per radices attracto: illi autem cuti animalium innati, succo quodam peculiari, partim ab ipsis allecto, partim è corporis cui inhærent partibus excreto, & versus radices suas protruso nutriuntur. (3) Plantæ jam ad statum maturitatis provectæ, non solum folia & flores, sed fructusque ac semina ferunt: pili nec folia emittunt unquam, & perpetua sterilitate dampnantur; ut neque feri queant, neque transplantari. (4) Plantis concessum est, per immensam colorum varietatem expatiari: dum ea multifariæ pulcritudinis prærogativa denegatur pilis.

4. Qui nihilominus admodum sunt affines *Epiphitis*. Sicut enim hæc sibi alimentum hauriunt è succis plantarum, quibus superexcrecunt; ita pariter & illi è succis animalis, cui innascuntur, alimoniam excipiunt: nec aliud quid utrinque observare est discriminis,

criminis, nisi quod Epiphyta ut plurimum plantis unde efflorescunt, inopiam succi alibilis, demumque exitium afferant; à pilis autem è contra haud exiguum exsurgat emolumenti ac utilitatis partibus, è quibus emergant.

5. Constant indubie ex materia quadam *Spermatica* quidem, sed ob sui abundantiam & adustionem *excrementitia*, ideoque à vere spermaticis corporis partibus, quarum ad nutritionem afferebatur, rejecta: quæ ad cutim demum propulsa, ibidemque retenta, quasi ovum quoddam conficit, vimque suam spermaticam exferendo, epiphyton sui generis efformat: Quod primum radices agit, mox consimilem per eas ad se prolestat succum, deinde intus augetur, tandemque in teretem tornatam figuram, erumpit in lucem, quemadmodum sata solent è terra facere sibi viam egerminando. Habent itaque & pili primordia sua ex ovo, & animula vegetativa præditi, à plastica ejus virtute tum efformantur, tum recremento quadantenus spermatico sustentantur, ita ut in tabidis etiam & demortuis crescant, interdum alumno suo diu superstites.

6. Dividuntur quidem in *Συγγενείς*, seu *congenitos* sive nativos, qui scilicet ante animalis nativitatem erumpunt, quales in homine sunt capitis pili, proprie capilli dicti, superciliarum & palpebrarum: & *Ἀπογενεῖς*, id est *postgenitos* sive supervenientes, qui extra uterum nascuntur, quales homini ad justam ætatem adulto, hoc est, quando in puero semen generari incipit, & in virgine mensibus via datur, superveniunt in pube, sub alis, intra nares auresque, in pectore, femoribus, tibiis, brachiis, & postremo in mento virili, nonnunquam etiam in muliebri. At vero isthæc pilorum divisio vix locum habet in *brutis*, si *capros* excipias, qui senectutis confinia jam ingressi, barbam alunt hirsutam; & ex volucrum genere perpaucos mares, *gallum* scilicet *Indicum*, & *gruem Japonensem*, qui ad generationem jam maturi cirros quosdam emittunt, alter ad inferiorem colli partem, alter in capite retro utramque aurem. Ratio autem, cur non omnibus brutis, sicut homini & capris, pili adventitii concedantur, forte est, divinante incomparabili *Glissonio*, quia corpora eorum ab origine pilis universim investiantur, qui totam materiam pilis generandis aptam in sui alimoniam exhauriunt. Mares enim è brutis, ubi ad coitum evadunt maturi, quanquam imberbes persistunt, pilos tamen in universa cute hispidiores & rigidiores gerunt, qui barbæ materiam abliguriunt.

7. *Color* pilorum in brutis ut plurimum æmulatur colorem cuticulæ iis subjæctæ; quemadmodum clare cernitur in porcorum maculatorum pellibus, quæ, de rasæ pilis, pariter variegatæ subtus apparent: in hominibus vero non admodum varius, sequi regionis, circumfusi aeris, humoris in corpore prædominantis temperiem,

(U u)

ætata-

ætatemque, &c. creditur. Non omnes autem colores (ut modo dictum est) pilis competunt, sed pauci omnino, quos jam strictim mihi libet percensere.

8. Ex coloribus quos naturæ indulgentia pilis animalium familiariter concessisse videatur, *extremi* omnino duo sunt, albus nimirum & niger: *medii* vero vix septenarium numerum excedunt, viz. pallidus, cinereus, flavus, rufus, ruber, castaneus, & fuscus. De singulis ex ordine paucula dicam.

1. *Albus* pilorum color duplex est, *puerorum* nempe & *senum*. Haud exiguum enim discrimen alterum ab altero distinguit. Quippe (1°) in *pueris*, pilorum albedo tam longe distat ab albedine intensa & pura, ut semper plus minusve *fuscum* versus inclinet, & aliquando *flavi* mixtura contemperetur: in *senibus* autem prope nivea est, & nonnihil *transparentia* simul exhibet; quod canis proprium est. (2°) In *pueris* color *floridus* est atque venustus: in *senibus*, *languidus*, & nonnihil præ se ferens horridæ austeritatis. (3°) Ut aspectu, ita & *causarum* ratione differunt. *Puerorum* pili succo aluntur miti, ducti, lubrico, & spiritibus pleno; unde roscida quadam pinguedine obliti, oculos grato nitore pascunt: *senem* contra alimento macro, acido, austero, aspero, spiritibusque fere orbatō sustentantur; ideoque pinguedine destituti, & exarescentes, non terminant vilum, sed plurimos ex incidentibus luminis radiis per se transire permittentes, quodammodo diaphani evadunt. Magno igitur errore tenentur, qui albos puerorum capillos cum senum canitie confundunt.
2. Haud multum ab albo recedit *pallidus* color pilorum; utpote qui paulo plus vel ad *subflavum*, vel ad *fuscum*, vel ad *atrumque* accedat. Causæ itaque ejus non aliunde petendæ sunt, quam à conspiratione *causarum*, unde duo ex istis coloribus, vel saltem omnes seorsum exoriantur.
3. Pallido immediate succedit *flavus* (saltem in remissione illo gradu, qui *subflavum* constituat) qui in pilis nonnihil sibi admixtum habens fusci, proinde adeo inumbratur, ut vel sensus judicio, sit illa, quam infectores in lanam conjiciunt, flavedine obscurior. Hunc excipit
4. *Rufus*, qui ex contemperatione quadam pallidæ flavedinis cum remissa rubedine & pauxillo fusci coloris emergit: differtque propterea gradu duntaxat à rubro, sed specie à flavo.
5. Similiter *Rubicundus* color pilis incidens; quique longe alius est à rubro tinctorum, ortum suum ducit ex iisdem coloribus, sed intensioribus.

6. *Castaneus*

6. *Castaneus*, fusco quam rubro vicinior, multum de illo, de hoc tantillum participat; quo rubri tantillo conspiciue discriminatur à *fusco*,
7. Qui ex albo & nigro, sed multo magis ex hoc, quam ex illo mixtus est, quique idcirco plus nigri gradatim admiscendo, ad perfectam usque nigredinem intendi potest; vel sensim diminuendo nigrum, ad albedinem revocari. Atque hæc quidem de pilorum familiaribus coloribus summatim dicta sunt.

9. Proximum est ut exquiramus, cur iidem pili ab quorundam aliorum colorum, viridis nimirum, cærulei, purpureique, & sanguinei infectura, quasi lege naturæ, arceantur. Perdifficilis sane locus, & à *Cardano*, à *Scaligero*, ab aliis vexatus; à nemine autem (quod sciamus) ante curiosissimum nostrum *Glissonium* satis probabili ratione explicatus. Audiamus igitur, quid is de isto tam abstruso problemate sentiat. Pili vero, inquit, quod "ex materia nec aquea, nec cruda, sed satis cocta, pingui, & ut plurimum nonnihil adusta, generentur alanturque, quodque illa materia ab origine spermatica sit & alba, cum in pilos vi simplicis coctionis, aut etiam vi adustionis insumatur, vel albedinem aliqualem retinet, vel ulterius elaborata comitem sibi adsciscit colorem pallidum, cinereum, flavum, rufum, rubrum; castaneum, fuscum, vel nigrum. Etenim hi colores ex materia alba, prout intensius vel remissius percoquitur, ordine proposito resultant: scilicet, si coctio debilior sit, albedo retinetur, sin paulo intensior, pallor vel flavedo superinducitur, sin adhuc intensior, rufus vel ruber; denique si adustio notabilis concurrat, castaneus, fuscus, aut etiam niger emergit. Nullus vero locus cæruleo, & consequenter nec viridi hic relinquitur; ut nec sanguineo, nec purpureo. Nam si puliculam albam ad ignem simplicis elixatione diu decoxeris, præcurret istos fere omnes colores pilis attributos: non autem pertinet vel ad cæruleum, vel viridem, vel sanguineum, vel purpureum. Quæ difficultatis propositæ solutio adeo naturæ legibus, cum quibus ea in graduali succorum altitium concoctione uti solet, tum quas in productione colorum observat, congrua videtur & consentanea; ut, meo quidem iudicio, non sit, quod aliam ullam quæsitum eamus. Certissimum est enim, & variari pilorum contexturam, pro varia dispositione succi illius quo nutriuntur; & colores pariter, pro superficie in quas radii lucis impingunt, & à quibus iidem hoc vel illo modo infringuntur aut reflectuntur, constitutione diversa, necessario diversificari: nec minus certum, etiam omnes succos alimentares, prout intensiorem vel remissiorem concoctionis & adustionis gradum subeunt, ita ab albedine plus minusve nigredinem versus

versus recedere. Ad solvendum itaque hunc nodum, quid amplius, quid solertius, imo vero quid planius possitis expectare?

10. Cur ergo, *inquies*, Avium *plumis* (quæ pari forsitan jure locum sibi vendicant quoque in catalogo Epiphytæ) illud natura indulgit privilegium, ut pulcherrimis istis coloribus tam venuste illustrarentur? Dicam equidem libere, sed Laconismo simul studens, quid ab eodem perspicacissimo *Glissonio* de hoc ænigmate didicerim. Avium plumæ, cum suis pennis & caulibus, quos utrinque tam splendido, ipsorumque Regum vestes pretiosas æmulante, cultu adornant; nec simplici coctione alimenti, nec uniformi organizatione, ut pili, contentæ; longe subtilius & operosius naturæ artificium, & ad conformationem, & ad nutritionem suam requirunt. Succi enim quo exornatæ speciosissimis hisce coloribus plumæ aluntur, priusquam ad ipsas perveniant plumas, nec-esse habent, sive per cornu pennæ, sive per ejusdem medullam, sive per utrumque percolari: alia namque via, qua nutrimentum illis afferatur, invenitur nulla. Haud mirum igitur, si post tam accuratam tamque operosam colaturam, plumæ variegatis nitidissimisque coloribus imbuantur. Nam quemadmodum flores, ob strictiorem colaturam per extremum caulis nodum, multiplici colorum varietate atque elegantia herbaceas partes excellunt: ita & plumæ (pennarum quodammodo flores) per densissimum quasi cribrum trajectæ, pilos omni varietatis ac venustatis genere antecellunt. Et ut de florum coloribus vix accurata ratio in tanta eorum varietate potest expectari: ita neque de coloribus plumarum speranda; nisi vitrum *microscopicum* ad visus auxilium in singulis contemplandis advocetur. Hujus enim ope fieri forsitan potest, ut variæ plumarum contexturæ ac Schematismi oculo detecti, ita intuscantur, ut inde demum certiore augurio divinare liceat, à qua contextura iste color vel ille speciatim emergat dependeatque. Id quod *Hookius* noster, subtilissimi vir ingenii, idemque insignis Mathematicus præstare aggressus est, in sua *Micrographia* ante decenium in lucem emissæ: quo lectorem plura de colorum in plumis varietate rescire avidum candide remitto; ipse jam tandem longo scribendi labore defatigatus. Liceat itaque mihi, abjecto in præsentia calamo, aliquandiu respirare à studiis, otioque moderato ingenij vigorem revocare. ¶

F I N I S.

A D D E N D A

In Exercitat. de *Animal. Quadruped. de Insect.*
& de *Serpentibus.*

Pag. 6. lin. 33. post hæc verba (*the honey tripe, quasi gustui gratissimum*) adde (*vel verisimiliter, quod tunica ejus interior in plicas quasdam corrugatur, quæ mutua sese ad angulos rectos intersecantes, favorem cellulas quodammodo representant.*)

Pag. 8. lin. 27. verbo (*Buffle*) immediate subjungantur (*forte à Danico Byffel; Gallice, Beuffle, & Buffle; Italice, Buffalo.*)

Pag. 11. lin. 17. immediate post (*ventriculo inveniatur*) adde (*alii rectius scribunt Bad-zahr, id est Persice Bad-zahr, ventus veneni, nempe dissipator veneni: & nonnunquam per contractionem, Pazahr.*)

Pag. 15. lin. 2. verbo (*prostermit*) subnecte (*vel majore cum verisimilitudine à Persico Chirs, quod Ursum significat, quodque forsitan à nonnullis Hirs vel Hurs pronunciatum, tandem in Urs degeneravit.*)

Pag. 16. lin. 30. post (*Orang. Outang.*) adde (*id est lingua Malaccensi seu Malageni, Homo Sylvæstris.*)

Pag. 19. lin. 33. post verbum (*Porcupine*) adde (*à Gallico Porc-épic vel Pors-épik, id est porcum spinosum.*)

Pag. 20. lin. 9. post (*fitcham*) adde (*Dicitur quoque Putorius:*) & post (*Polcat*) adde (*quasi dicas, Catus Polonicus, quia scilicet Polonia his maxime abundat:*) & post (*fitcham*) adde (*à Gallico Fissau, quod idem indicat: Arabice dicitur Nems, de quo vide sis Erpenii Notas ad Lockmanni Fabulas.*)

Pag. 43. lin. 32. post (*fen-guats dicuntur*) insere (*Mares natura distinxit à feminis, cum plumula quadam elegantissima fronti adnata, tum corporis gracilitate.*)

In Exercitat. de *Fossilibus.*

Pag. 18. lin. 24. post (*Germania hodie reperitur*) adde (*Alii rectius desectunt Basaltes, ab Hebr. Chald. & Syriac. Barzel, quod etiam ferrum exprimit.*)

Pag. 27. lin. 30. post (*Azure*) adde (*Persice dicitur Laziverd; unde ex Europæis, alii literam l. pro articulo male accipientes, l' Azure*
(W w)

ture scribunt; alii, commutato r. in l. Lazul dicunt.)

Pag. 35. lin. 18. post (*Acblama*, Chaldaice *En-egla*) adde (i. d. *oculus vituli*.)

Pag. 36. lin. 27. post (*quod durare sonat*) adnecte (*vel potius à Genitivo Adamantis; omiſſa. a. additoque i. post d.*)

Pag. 38. lin. ult. verbis (*Emirauld* aut *Emrâld*) adjunge (*à Gallico Efmeraut; quod eſt à Perſico Zumurrud, ſive, ut pronunciaripotest, Smurrut.*)

Pag. 40. lin. antepenult. post (*Beryll.*) adde (*ab Arabico Bel-lur, tranſpoſitiſ l. & r.*)

Pag. 51. lin. 19. post (*Saverlandiæ & alibi*) adde (*& apud nos è montibus Mendipenſibus copioſe eruitur.*)

Pag. 57. lin. ult. ad finem adde (*à Perſico Brunzj, i. e. Cuprum; quia quaſi cupro tegit.*)

II. DELEND A.

Pag. 64. lin. 18. dele, & *nares*.

In Exercit. de Piſcibus, pag. 4. lin. 3. dele, *τάριχ*.

In Exercit. de Foſſilibus pag. 51. lin. 29. dele, *Apud nòs ex montibus Mendipenſibus copioſe eruitur.*

III. CORRIGENDA.

In Epiſt. Dedicator.

Pag. 3. lin. 26. lege, *hic à nobis tacta*: & lin. penult. lege, *in merto*.
pag. 4. lin. 7. lege, *Sollicitas nuptas*.

In Præfat. ad Lectorem.

Pag. 3. lin. 3. lege, *penitum inſpiciendi*. pag. 5. lin. 12. lege, *aſſisteret*:

In Exercit. de Animal. Quadruped.

Pag. 1. lin. 26. lege, *ſive totum animo complectamur*. pag. 11. lin. 32. lege, *ad ſubularum ſimilitudinem*. pag. 12. lin. penult. lege, *Hagjin*.
pag. 14. lin. 25. lege, *Daſypus Pinus*: & lin. antepenult. lege, *Tigris*: & penult. *Tigre* pag. 18. lin. 1. lege, *moleſtanda*. pag. 19. l. 6. lege, *ἀπτόμυς*: & l. 14. lege, *birudinis majoris modo*. p. 23. l. 13. lege, *ad paſtam redigunt*.

In

In Exercit. de Insectis.

Pag. 51. l. 16. lege, *sagax, laboriosum*. p. 52. l. 35. lege, *canibus infestissimum*. p. 53. l. 22. lege, *Schwenckfeld*. p. 57. l. 4. lege, *Millepes*. p. 59. l. 9. lege, *Asphodelo*: & l. 3. lege, *admirandam historiam*.

In Exercit. de Avibus

Pag. 66. l. 30. lege, *an Symmysta*. p. 70. l. 13. lege, *à Latinis Aquila*. p. 73. l. 14. lege, *British Falcon*. p. 75. l. 27. lege, *Medula torquata*. p. 106. l. 15. lege, *Perfida fraudatrix*: & l. 29. lege, *pervenire possit*. p. 109. l. 9. lege, *parum aberat, quin ea lingue &c.*

In Exercit. de Piscibus

Pag. 2. l. 7. lege, *Mustela*: & l. 22. lege, *& Centrina*. p. 3. l. 25. lege, *Rondeletio Asellus veterum*. p. 4. l. 9. lege, *ad Thamisi ca piuntur*. p. 5. l. 10. lege, *ὀπόμενα*. p. 8. l. 21. lege, *Mustela terrestri*. p. 11. l. 20. lege, *nisi pinnula caudæ apprehensis*. p. 15. l. 32. lege, *idem forte, quem &c.* p. 26. l. 14. lege, *Cynoglossum*. p. 28. l. 27. lege, *tabe præcordia*. p. 33. l. 25. lege, *verum quoties secni*. p. 45. l. 4. lege, *lingua nostra*.

In Mantifs. Anatomica

Pag. 71. l. 13. lege, *Anatomia Comparativa*. p. 79. l. 6. lege, *Ductus Communis*. p. 84. l. 32. lege, *& robustam*.

In Exercit. de Fossilibus

Pag. 19. l. 31. lege, *ex monte Sinai in Arabia Petraea sito &c.* p. 22. l. 13. lege, *Knareborough*. p. 35. l. 18. lege, *Chaldaice En-egla, id est oculus vituli*. p. 43. l. 29. lege, *radice Drakenæ, Contrayerva*. p. 46. l. 11. lege, *ex minera flamma, minori quantitate; è plumbea majori*. p. 49. l. 24. lege, *quæ Argentum colore tenus æmulentur, vulgo Alchymie dicta*. p. 57. l. penult. lege, *aut aeris injuriis minus obnoxia*.

INDEX

I N D E X

Q U A D R U P E D U M

A		D	
A lces	Pag. 12	D Abuh Arabum	Pag. 15
A nimal foetidum	31	D ama	11
A per	13	D anta	31
A ries	9	D asypus Pinuus	14
A rmadillo five <i>Tatin</i>	18	D orcas five <i>Capreolus</i>	12
A sinus	4	D romedarius	13
A sinus Monoceros Indicus	ibid.		
A uricula nigra five <i>Siyâh-Ghâf</i>	21		
B		E	
B abion		E chinus terrestris	19
B abirouffa		E brailiensis five <i>Tatin</i>	
B ifon	16	E julator	31
B onafus	14	E lephantus	4
B os	8	E quus	5
B ubalus	ibid.		
B uffelus	ibid.		
B ufo	ibid.		
C		F	
C abim	27	F elis	20
C amelus	31	F elis Zibethi	ibid.
C amelopardus five <i>Giraffa</i>	12	F lirus five <i>Oryx</i>	11
C anis	13	F uro five <i>Putorius</i>	20
C appa	26		
C aper	31		
C apra Bezaartica	9		
C apra Moschi	11		
C apreolus, Dorcas	10		
C astor	12		
C atus five <i>Felis</i>	18		
C audiverbera five <i>Cordylus</i>	20		
C hamæleon	29		
C ercopithecus	28		
C ervus	16		
C ervo-camelus	11		
C oach	13		
C rocodilus	31		
C uniculus	29		
C ynocephalus	23		
	16		
		G	
		G azella	10
		G enetta	20
		G iraffa	13
		G lis	25
		G ulo	15
		H	
		H ermellanus	20
		H innus	4
		H innulus	11
		H ippopotamus	14
		H ircus	9
		H ircus Bezaarticus	11
		H eyrat five <i>Taxus American.</i>	18
		H yftrix	19

(X x)

Ibex

Index Quadrupedum.

I		S		
I Bex		Pag. 10 S Alamandra	Pag. 28	
Ichneumon		19 S Satyrtis Indicus	16	
Ignavus five <i>Senembi</i>		17 Scincus terrestris	28	
L		Sciurus	24	
L Acerta		Senembi five <i>Ignavum</i>	17	
L Leæna		Siyah-Ghush five <i>Auricula nigra</i>	21	
Leo		28 Simia	16	
Leopardus		14 Sorex	25	
Lepus		<i>ibid.</i> Stellio	28	
Lupus		<i>ibid.</i> Succarath	31	
Lutra		23 Suhak Scytharum	11	
Lynx		15 Sus	13	
M		18		
M Apach five <i>Felis Americ.</i>		14	T	
Maripetum animal		T Alpa	25	
Martes		Tarandus	12	
Monoceros		15 Tatus five <i>Echinus Brasil.</i>		
Mulus		31 Tamandua-guaca Brasil.	17	
Mures		20 Tapirouffu five <i>Danta</i>	31	
Mus Alpinus, Marmota		5 Tatu five <i>Armadillo</i>	18	
Mustela		4 Tattus	8	
Mustela Zebellina		25 Taxus	18	
O		19 Taxus Suillus	13	
O Nager		20 Testudo terrestris	30	
Oryx five <i>Flirns</i>		<i>ibid.</i> marina	<i>ibid.</i>	
Oves		Tigris	14	
B		Tlacaxolotl	31	
P Anthera		Tragelaphus	12	
Papio five <i>Babio</i>		4		
Pardus		11	V	
Peva		8	V Acça	8
Porcus Guineensis		V Verres	13	
Porcellus indicus		Vervex	8	
Putorius five <i>Furo</i>		14 Vitulus	<i>ibid.</i>	
Pygargus		16 Vitulus marinus in pist.	48	
R		14 Viverra	20	
R Ana		31 Upalim	17	
Rangifer		14 Ursus	14	
Rhinoceros		24 Urus	8	
Rupicapra		20 Vulpes	15	
		12 Vulpi congeneres	<i>ibid.</i>	
		27	Z	
		12 Z Ebra Indica	4	
		<i>ib.</i> Z ibethi animal	20	
		9		

II. I N.

I I.

INDEX SERPENTIVM.

A		H	
A Contias	Pag. 33	H Emorrhous	Pag. 32
Ammodites	32	Hydrus five <i>Natrix</i>	35
Amphisbæna	33	Hydrus marinus	<i>ibid.</i>
Anguis Æsculapii	<i>ibid.</i>		
Aspis	32	I	
		B Biboca	34
		M	
B Asiliscus	34	M Ater Formicarum	35
Boas Serpens	35		
Boccinga	34		
Boiguacu	<i>ibid.</i>		
		N	
C Aninana	35	N Atrix Torquata, Rubetaria	35
Caprimulgus anguis	<i>ibid.</i>	Norwegicus, serpens	<i>ibid.</i>
Cæcilia five <i>Typhlops</i>	33		
Ceraftes	32		
Cenchrus	33	S	
		S Eps	32
D		Scytale	<i>ibid.</i>
D Ipsas	32	Scolopendra marina.	35
Dryinus	33		
		V	
E		V Ipera.	32
E Laps	33		

I I I.

INSECTORVM.

A		Pag.	
A Carus	Pag. 58	A filus	40
Æschnæ	42	Attelabus	44
Anthrenus	53	Attelabus Arachnoides	61
Anthrenus aquaticus	60	Aureliæ five <i>Chrysalides</i> .	40
Apis	36		
Araneus	54	B	
Ascarides	59	B Ibio	41
Asellus terrestris	57	Blatta	49
marinus	62	Bombylius	39
		Bombyx	40
		Bruchus	

Index Insectorum.

Bruchus	Pag.			
Buprestes	44		L	
	48			
		L		Pag.
		Acerta aquatica		60
		Lendes		52
C	45	Libellæ five <i>Perla</i>		39
Canthari	47	Ligniperda terrestris		58
Cantharides	46	aquatica		61
Cervus volans	40	Limax		60
Chrysalis five <i>Aurelia</i>	60	Locustæ terrestres		44
Cicada aquatica	48	Locusta aquatica		60
Cicindela	40	Lumbrici terrestres		59
Cimex	42	aquatici		63
Ciniphes	60			
Corylus	58		M	
Coffi	38			
Crabrones	48	M		
Cucuja	43	Antis, Locusta Italica		45
Culex, ejusque species	58	Merdivora musca		42
Curculio		Muscæ aquaticæ		42
		terrestres		41
		Millepedes five <i>Aselli</i>		54
		Molendinaria Blatta		49
			N	
		N		
		Noctiluca five <i>Cicindela</i>		48
		Notonecsta		60
			O	

Redu-

Index Infectorum.

R

R Eduvius
R Ricinus
Rh Rhinoceros

\$

SCarabæus, ejusque genera
Scolopendra terrestris
 marina
Scorpio alatus
 terrestris
Seta aquatica
Seticaudæ
Sphondyle, five *Verticillus*
Squillæ
Staphylinus
Stellæ marinæ
Syrones, Cyrones

Pag. 31 **T** Abanus
 ibid. **T** Talpa Ferrantis Imperati
 46 **T** Tarantula
T Taurus volans
T Tenthredo
T Teredines
 46 **T** Termites
 57 **T** Thermo-cantharus
 62 **T** Thripes
 50 **T** Tineæ
 54 **T** Tinea aquatica
 63 **T** Tipulæ
 43 **T** Trimerus

T

Paṭ.
41
53
54
46
39
58
58
60
58
62
ibid.
60
41

V

62 **V**ermes
51 **V**espa

IV.

A V I U M.

A

A Canthis five *Carduelis*
Accipiter
Æfalo five *Smerillan*
Alauda pratensis
arboorea
galerita
marina
Alcedo vocalis
Alchata
Aluco
Anas palmipes
campestris
Anser
Anser Bassianus
Anser Chilenfis
Anthus
Apos Indica five *Mannocodia*
Aquila
Ardea vulgaris
stellaris
Ardeola

pag.
 87 Arquata five *Carlinus*
 71 Asilus
 72 Asio five *Otis*
 88 Asio five *Scops*
ibid. Attagen
ibid. Attricapilla five *Rubicola*
ibid. Avofella five *Spinzago*
 111 Aurivittes five *Carduelis*
 83 Aura five *Gallinassa*
 78
 104 B
 83)
 103 B Arge Gallorum
 100 B Boscas mergens
 119 fistularis
 97 erythrocephalus
 116 Penslope
 70 Branta seu *Bernicla*
 109 Bubones
 110 Buteo five *Triorchis*
ibid.

B

B Arge Gallorum
 Bolcas mergens
 fistularis
 erythrocephalus
 Penelope
 Branta seu *Bernicla*
 Bubones
 Buteo five *Triorchis*

pag.
111
95
77
ibid.
81
97
102
87
117

111
106
ibid.
ibid.
ibid.
103
77
72

(Y y)

Cerulean

Index Avium.

C

C Ætuleo	
Chalidris seu <i>Chovâlier</i>	
Canarius Passer	
Cannevarola	
Capella	
Capricalca Scotica	
Caprimulgus	
Carduelis	
Catarrhaeta	
Caryocatactes	
Ceoan five <i>Avis nivea</i>	
Cepphus	
Certhia	
Charadrios	
Calandra	
Chloris	
Chloropos Gallinula	
Ciconia	
Cinctus	
Circus	
Citrinella	
Coccothraustes vulgaris	
Indica	
Columbæ	
Collurio	
Colymbi	
Coracias Aristotelis	
Cornix	
Corvus major	
minor	
marinus	
Cotta Anglorum	
Coturnix	
Crex	
Cuculus	
Cuntur	
Curruca, Hypolaïs	
Cygnus	
Cynchramus	

D

D Aje	
Diomedea Avis five <i>Grus</i>	
Dodo Lusitanorum	

E

Pag.		Pag.
94	E Greta Gallorum	110
112	Embryza	87
87	Emeu five <i>Cassware</i>	79
97	Erythropus seu <i>Ralla aquatica</i>	112
113	Erythracus seu <i>Rubecula</i>	97

F

104	F Alcinellus	73
78	Falco	<i>ibid.</i>
87	Fedoa	112
100	Ficedula	88
92	Flamengo five <i>Phœnicopterus</i>	108
117	Fringilla	88
100	Fulica	107
93		
114		

G

<i>ibid.</i>	G Allus Gallinaceus	84
112	Indicus	81
108	Gallina Africana	83
113	Guineensis	112
72	aquatica	112
88	Corylorum	81
91	Lanigera	84
92	Gallinula Erythropus aquatica	112
84	Ochra aquatica	<i>ibid.</i>
72	Gallinago major	112
101	minor	<i>ibid.</i>
75	Gallinula serica	112
<i>ibid.</i>	Gallo-Pavo	81
<i>ibid.</i>	Glaucius Boscas	106
<i>ibid.</i>	Gambetta Italarum	112
107	Garagay	117
84	Garletta Italarum	110
111	Garrulus Bohemicus	76
73	Indicus	<i>ibid.</i>
118	Gavia	100
95	Graculus vulgaris	75
103	Palmipes	101
84	Grigallus	81
	Grus vulgaris	114
	Balcarica	<i>ibid.</i>
	Japonensis	<i>ibid.</i>
116	Guara five <i>Arquata Coccinea</i> Brasil.	109
114	Guit Guit	116
117	Gyrfalco	73

Hamantoo

Index Avium.

H

Hæmantopus
Halcyon
Harle five *Scheldrachne*
Helorius
Hirundo
Hoachtzin
Horion
Hypolais five *Carruca*
Hypotriorchis, *Subbusco*

I

Ibis
Ispida
Junco
Jynx five *Torquilla*

L

Lagopus Perdix
Lanarius
Lanius five *Collurio*
Larus
Ligurinus
Limosa Venetorum
Linaria
Loxia, Curvirostra
Luscinia
Luscinola
Lutea seu *Citrinella*

M

Maja
Manucodiata
Merganser
Mergus
Merops
Merula
Merula aquatica
Milvus
Mimus
Monedula
Montifringilla
Morfex
Morinellus
Motacilla
Muscipetæ

N

Pag.
111 **N**isus
ibid. Noctua
102 Nycticorax
110

O

Pag.
117 **O**chra Gallinula
95 Oedicoemus
72 Oenanthe five *Culo bianco*
Oenas five *Vinago*
Onocrotalus seu *Pollicanna*
Ortygometra
108 Offifragus
111 Otis, alias *Bistarda*
113
93

P

Pag.
83 **P**alumbes Torquatus
83 Rupicola
72 Cavernalis
ib. Paradisca Avis, Manucodiata
100 *ib.* Pafus Carbonarius
87 Monialis
110 Palustris, Schœniclos
88 Caudatus, Mourier
76 Cristatus
ib. Passer Domesticus
97 Maculatus
ib. Montanus
88 Sylvestris
Torquatus
Arundineus
Puffinus in jugland. deg.
116 Brachyrus
ib. Stultus Bononiensis
110 Troglodites
ib. Canarius
94 Indici, &c.
90 Pavones
113 Pelicanus, seu Onocrotalus
72 Penelope, Boscas
76 Perdix vulgaris
79 Græca
88 Ruffa
102 Cinerea
111 Damascena Aldrovandi
96 Alba, Lagopus, petrosa Aldr.
97 Indica
ib.

Phalacro-

Index Avium.

	Pag.		Pag.
Phalacrocorax	100	S	
Phasianus sylvestris	81	S Acer Accipiter, Falco	73
marinus	105	S Scheldracus	102
Phœnicopterus	108	Scolopax seu Gallinago maj. min.	112
Phœnicurus five <i>Ruticilla</i>	97	Scops	77
Pica vulgaris	73	Serinus	87
Caudata Indica	76	Spinus seu <i>Ligurinus</i>	<i>ib.</i>
Glandaria	<i>ibid.</i>	Spipolæ	96
Ampelides Aldrovand.	<i>ibid.</i>	Stoparolæ	<i>ib.</i>
Garrula Indica	<i>ibid.</i>	Stella	83
Brafiliensis,	<i>ibid.</i>	Strix	78
Curvirostra five <i>Laxia</i>	<i>ibid.</i>	Struthio	79
Rhinoceros	77	Struthio-Camelus	<i>ib.</i>
Marina	76	Sturnus	90
Picus Martius var. min. maj.	93	Subbuteo five <i>Hypotriorchis</i>	72
viridis	<i>ib.</i>		
murarius	<i>ib.</i>	T	
luteus, Cyanopus	<i>ib.</i>	T Entzon tototl	117
cinereus, &c.	<i>ib.</i>	Tinnunculus	72
Pluvialis cinerea	113	Tlauquechul	119
flavo-virescens	<i>ib.</i>	Totanus	112
major Aldrovandi	<i>ib.</i>	Tritonus	117
Polyglotta	117	Tominejo	118
Porphyrion	110	Trichas	90
Porzana Italarum	112	Triorchis five <i>Buteo</i>	72
Pittaci	73	Trochilus	102
Puffinus	107	Trynga	112
Pugnax Avis	110	Tucana	118
Pyrhula	97	Tuputa	116
Pyrocorax	75	Turdus vulgaris	89
		Viscivorus	<i>ib.</i>
Q		Illas	90
Q Uapachtototl seu <i>Ridibunda</i>	117	Turtures	85
Q Quetzaltototl	<i>ibid.</i>		
Q Querquedula	106	V	
		V Anellus	113
R		V Vespertilio	80
R Allus Anglorum	83	Ulula	78
Italarum	107	Upupa	98
Regulus	95	Uria	101
Rhinoceros, Tragopenda Plinii	77	Urogallus, Tetrax	81
Rousserolle	111	Vulpanfer	103
Rubecula	97	Vultur	71
Rubicilla	<i>ibid.</i>		
Rubetra	97	Z	
Ruticilla seu Phœnicurus	<i>ibid.</i>	X Ochitototl	117
Rusticula	112	X Xochitenacatl.	116
		Yandeu	

Index Piscium.

Y
Y Andeu five Jandou.

V. P I S C I U M.

A

A Bramus
Acarnanes
Aculeatus pisciculus
Acus
Adonis, Exocoetus
Alauda
Albula
Albula lacustris
Alburnus seu *Blica*
Albus *Salviani*
Alofa marina
fluviatilis, *Clupea*
Alpheites
Anguilla
Anguilla de arena
Anthias, Callionymus
Antacæus
Aper Rondeletii
Apua
Araneus
Asellus major
minor seu *Callarias*
niger
barbatus
varius, *Mosna major*
Gobergus
fuscus
Veterum *Rondeletii* *Asa*
Asper pisciculus
Aftacus marinus
fluviatilis
Atherina
Atrilus Padi
Aurata
Auris marina

B

B Alenæ
Balani

Barbo seu *Barbus*
Barbotta Galorum
Behemoth Jobi
Bezola
Blennus
Blica seu *Alburnus*
Boops
Buccinum
Bobulca Bellonii

Page.

37
40
50
44
23
44
26
60
39

C

43
22 **C** Amarus, *Aftacus*
41 Canadella
16 Cancro
15 Canicula, *Galeus piscis*
16 Cancellus
44 Canis Carcharias
ibid. Cantharus
42 Capricus
44 Capito Anadromus
31 fluviatilis
41 Carpio, *Chare*
15 Carpus
34 Cataphractus
27 Catulus
15 Centrine
49 Cepola
5 Cernua fluviatilis
24 Cete
29 Catorum Dux
2 Chamæ
3 Channe, *Hiatula*
ib. Chare, *Carpio*
ib. Chromis
ib. Citharus
ib. Clavatus Cyprinus
ib. Cochleæ
ib. Cobites aculeata
39 barbatula
33 Colias
56 Conchylum
25 Conger
39 Conchæ
22 Coracinus
63 Corax *Rondeletii*
Corvulus
Corvus Niloticus
46 Crustacea
63 Cuculus marinus

55
ibid.

56
33
58
7
23
32
ib.
37
44
32
33
8
8

39

46

6

65

14

44

22

26

43

61

38

ibid.

28

61

6

63

15

29

15

37

92

20

(Z x)

Cynædus,

Index Piscium.

Cynædus, Alphestus	Pag.	Hephetus	Pag.
Cyprinus	15	Hippurus	24
Cyprinus latus, Abramus	43	Hippopotamus	5
	ibid.	Hirundines	30
		Holoiteon	19
D		Huso, <i>Antacena</i> Eliani	36
D Elphinus	47	Hystrix	34
Dentex five <i>Synodon</i>	22		62
Dentalia	63		
Draco marinus	27		
Dracunculus	ibid.	I Chthyocolla	40
		Julis	14
E			
E Chinus marinus	62		
Encrasicholus	24	L Acertus, <i>Colias</i>	28
Entalia	63	L Lamia	12
Eperlanus marinus	34	Lampetra marina	34
fluviatilis, <i>Viola</i>	42	fluviatilis	40
Erythrinus, <i>Rubellio</i>	22	Latus piscis	31
Exocætus, <i>Adonis</i>	19	Lavaretus	44
		Lavaronus	25
F		Lepades	63
F Aber	10	Lepras	13
Farra	44	Lepus marinus	51
Fiatola	23	Leuciscus	37
Fundulus	38	Liparis	4
		Locusta marina	54
G		Lota Gallorum	43
G Alades conchæ	65	Loligo	51
Galeus Rhodius	33	Lucius	42
Galerita	10	Lumpus Anglorum	12
Galeus lævis, <i>Mustela</i>	8	Lupus	21
Gibbosus piscis	13	Lupus marinus	31
Gladius, Xiphias	6	Lÿra	21
Glanis	40		
Glaucus <i>Rondeletii</i>	8	M Altha	8
<i>Bellonii</i>	15	M Manati Indorum	49
Gobio marinus	ibid.	Mater Perlarum	64
fluviatilis	38	Melanurus	15
capitatus	ibid.	Merula marina	14
Gobites barbatus, Lota	24	fluviatilis	43
Gutturosus piscis.	10	Milvus <i>Rondeletii</i>	29
		Milvus, Bonito	19
H		Milvus, <i>Lucerna</i>	ib.
H Aleces, Harengus	14	Mola	9
Hepatus	14	Mæna	25
		Molvæ major & minor	3
		Monoceros Clusii	5

Index Piscium.

Mormyrus	Pag.	23	Pholades	Pag.	67
Muco sive <i>Orbis Britannicus</i>		35	Phoxinus squamosus		39
Mugil		32	lævis		40
Mullus barbatus		17	Phycis		14
imberbis		18	Phyfeter		47
asper		ib.	Pigus		45
Murex		60	Pinnæ		67
Muræna		6	Piscis Gutturofus		44
Musculi		66	Pisciculus aculeatus		41
Mustela fluviatilis		40	Polypus		50
Mustela lævis		ib.	Pompilus		6
Myrus, <i>Serpens rubescens</i>		7	Porcus marinus		47
Myfticetus, Dux Cetorum		6	Pristis		ib.
Mytuli		66	Pungitius		41
			Purpura		59
			Puftes		47
	N				
Nafus		38		R	
Nautilus		59			
Nerites		61	R Aiarum genera		10
	O		Rana palustris		87
			piscatrix		11
O Phidion		7	Remora, Echipeis		6
Orbis Piscis		35	Reversus Indicus squamosus		5
Orca		47	anguilliformis		7
Orfus Germanorum		37	Rhomboides		65
Orphus		22	Rhombus squamosus		26
Ostraceon			lævis		30
Ostrea		66	Rosmarus, <i>Walrus</i>		49
Oxyrinchos		37	Rubellius		ib.
	P		Rutilus fluviatilis		39
P Agurus		57	Ruminax, <i>Scarus</i>		13
Pallerus		43		S	
Pafferes		26			
Patella			S Almo		31
Pastinaca marina		10	Salmerinus		40
Passer lævis		29	Salmonetta		36
Pavo <i>Salviani</i>		13	Salpa		23
Pecten Romanorum		23	Sandeel Anglorum		27
Pectines		66	Sarachus		45
Penicilli		63	Sarda		25
Perca marina		14	Sargus		22
Perca fluviatilis major		41	Saurus		28
minor		42	Scarus, <i>Ruminax</i>		13
Petimbua		16	Sciæna, Umbra		15
Phagrus		21	Scolopax		5
Phocæna		48	Scolopendra cetacea		48
Phoca		ib.	Scomber		27
Pholis		44	Scorpio marinus		23
				Scorpidæ	

Index Piscium.

	Pag.		Pag.
Scorpidæ	23	Torpedo	9
Scorpæna	ib.	Trachurus	24
Schilus	45	Trochi	61
Schrollus	42	Tru ta marina	
Sepia	51	fluvia·ilis	36
Serpens marinus	6	lacustris	44
Norwegicus	ib.	Thunnus	6
Silurus	40	Turbines	61
Simia marina	9	Turdus	13
Smaris	26		
Soleæ	ib.	V	
Solen	67		
Sparus	23	V Arius, <i>Phoxinus levis</i>	39
Sphyræna	15	Viola, Eperlanus	52
Squatina	12	Vitulus marinus	48
Squatino-raia	ib.	Umbla	43
Squillæ	56	Umbra fluviatilis	37
Stromateus	23	Unicornu marinum	47
Sturio	32	Uranoscopus	27
Synagris	22	Walrus, Mors	49
Synodon, <i>Dentex</i>	ib.	Vulpecula marina	8

T

X

T Enia
 Tellinæ
Thymallus
Thymus
Tinca marina
 fluviatilis

7 **X** Iphias, gladius

6

36 **Z**

3 **Z** Iga
43 Zygaena

31
9

V I.

F O S S I L I U M.

A

A Chates
 Adamas
Æs
Ærugo
Actites lapis
Agaricus mineralis
Alabastrum
Album Hispanicum
Alcyonius lapis
Alektorius lap.
Alumen, ejusque variae species
Ambra, Succinum

Pag.		Pag.
34	Amethystus	35
36	Amianthus	23
46	Ammoniacus Sal	7
53	Ammonites lap.	22
31	Ampelites lap.	14
4	Antifcorbutica terra	6
18	Antimonium, Stibium	49
2	Aphronitrum	8
21	Arabica terra Sigillata	6
25	Arenarium Saxum	16
9	Argentum	45
14	Argentum vivum	50
		Argilla

Index Fossilium.

Argilla
Argyrolithos
Arsenicum
Assius lap.
Asterias
Astroites
Auripigmentum
Aurum
Aurum Muficum
Axungia Lunæ

B

B Alaffius Rubinus
Basaltes marmor
Beli oculus
Belemnites lap.
Beryllus
Bezaar lap.
Bezaar Minerale
Bianchæ Alexandrina
Bismuthum
Birumen
Bitumen Judaicum
Bolus Armena
Bononienfis lap.
Borax
Boringholmica terra
Brontias lap.
Bucardites lap.
Bufonius lap.

C

C Admia fossilis
Cadmia fornacum
Calamita alba
Calcarium saxum
Chalcedonius lapilli
Calculus Humanus
Camehuja gemma
Carbunculus
Carpionum lap.
Ceraunias
Cervinus lap.
Ceruffa
Chalazia veterum
Chalcitis
Chalybs
Chelidonium lap.

Pag.		Pag.
1	Chia terra	4
55	Chryfocolla	51
12	Chryfolithos	39
21	Colonetta	29
28	Conchites lap.	31
ib.	Cœruleum	53
12	Coracinus lap.	24
49	Corneolus	38
56	Cornu fossile	23
5	Cornu Ammonis	32
	Cornu Arietis	ibid.
	Cos	17
	Creta	2
37	Creta Argentaria	3
18	Cryftallus	35
42	Crocus Martis	53
29	Crucis lapis	29
40	Cuprum	46
43	Cyftelithos	23
36		
54		
49		
13	D Iphryges	55
14		
3		
20		
9		
4	E Mbuscatum marmor	19
30	Entrochos lap.	29
31	Etlachiana terra	5
40		

D

E

F

31	F El vitri	8
55	Feroenſis terra	4
26	Ferrum	47
20	Ferrugo	53
34	Fiffile ſaxum	16
25	Flœrentinum marmor	19
34	Eloſ Aëris	54
37	Fluentis Aetnæ coagulum	21
24	Fluores	35
30	Fulmineus lap.	39
44	Fungites lap.	31
35		
11	G Agates lap.	14
47	Galena	50
25	Garatronium marmor	19
	(Aaa)	Gleba

Index Fossilium.

Gleba Boyleana
Gratunopolitana
Glossopetra
Goltbergensis terra
Granatus
Gypsum

H

Hematites lap.
Halinitrum
Hammites
Helenæ Sanctæ terra
Heliotropus
Hyacinthus
Hysterolithos

I

Iaspis
Islebianum saxum

L

Lac Lunæ
Lapis Judaicus
Lapis Cæruleus Anglicus
Lapis Armenus
Lapis Lazuli
Lapis Lipis
Lapidis Orbes
Lemnia terra sigillata
rubra
Lignicenis terra
Livonica terra sigill.
Lithargyros
Lithanthrax
Limosum saxum
Limacis lap.
Ludus Paracelsi

M

Magnes
Malachites lap.
Maltha
Marga Saxatilis incarnata
Margaritæ
Marmorum variæ species
Melanteria

Pag.
3 Melitenfis terra
ib. Metallum quid?
28 Mica
5 Minium
37 Misy
20 Molaris lap.
Morochtus
Mumia

N

27
9
22 Naphtha
5 Nephriticus lap.
33 Nigrica fabrilis
38 Nitrum
32 Norwegica terra

O

32 O Bryzum
16 Obsidianum marmor
Ochræ species variæ
Oculus Beli
Oculus Cati
Oculi Cancrorum
4 Oculus mundi
29 Onyx
28 Opalus
27 Ophites marmor
ib. Orichalcum
28 Ostracites
55 Osteocolla

P

ib. 6
ib. 55 PARIUM marmor
Pectinites lapis
14 Percarum lap.
16 Petroleum
25 Phengites marmor
17 Pissasphaltum
Pila Rupicapra
Pix fossilis
Plumbum
26 Plumbago
33 Puigites terra
14 Pompholyx
4 Porphyrites marmor
42 Porus
17 Præfius lap.
13 Priapus lap.

Pag.
4
44
53
54
11
17
30
14

13
33
2
8
5

45
18
2
42
41
25
41
34
40
18
47
31
22

32
ibid.
24
13
20
14
25
14
48
56
3
55
20
21
33
32

Pumex

Index Fossilium.

Pumex
Purpurea terra
Puteolanus pulvis
Pyrimachus lap.
Pyrites

Quartzum

R Ifagallum
R Rubinus
R Rubicellus
R Rubrica

SAl commun.
Ammoniacus.
Gemmæ
Alkali
Petræ

Samia terra

Sandaracha

Santerna

Sapphirus

Sardonyx

Saxorum genera

Saxa Metallaria

Skeleton Serpentis

Schistos lap.

Schiftus lap.

Scoria

Selenites

Scravitianum marmor

Serpentinus lap.

Sessana terra

Silefiaca terra figillata

Silex

Smaragdus

Smectis Anglica

Smyris

Pag.
 21 Sory
 6 Spatum
 3 Spinellus Rubinus
 17 Spodos subterranea
 52 factitia
 Squama Æris
 52 Ferri
 Spongiæ lap.
 Stalactites
 13 Stalagmites
 37 Stannum
 16. Stella Judaica
 2 Stenomarga
 Stibium
 Strigonia terra
 Succinum
 7 Suillum faxum
 16. Sulphura

I

3 T Alcum
13 T Terræ variæ

53 Tincar

38 Topazius

34 Tophus

16 Tophus juvenci

52 Trípela

31. *Toccaviensis bolus*

17 Trochites lap.

24 Tuberonum lap.

54 Turcois

v

6 **7 Erdello**

6 **V** **Violaceum saxum**

16 Vitrum

38 Vitriolum, ejusque species

2 Umbilicus marinus

27

F I N I S.

